

94.
Oswald Weigel
Antiquariat & Auctions-Institut
Leipzig, Königstr. 1.


P
B 45.3



Rec'd Dec. 1894

Exempl. 2 Rp. 8 β.
Bandet - 16 β.

Ds 2 Rp. 24 β.



MATERIA MEDICA

E

REGNO VEGETABILI,

SISTENS

SIMPLICIA OFFICINALIA,
PARITER ATQUE
CULINARIA.

SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE,
EX AUTOPSIA & EXPERIENTIA,

FIDELITER DIGESSIT

PETRUS JONAS BERGIUS,

M. D. Hist. Nat. & Pharm. Professor Stockh., R. Colleg.
Med. Assessor, Acad. & Societ. scient. Imper. Petropol.,
Imp. N. Cur., R. Londin., Stockh., Upsal., Philadelph.,
Haarlem., Nidros., Helvet., Zell., Roterod., Zeeland.,
Berolin. Nat. Cur., & Lund. Membrum, ut &
Monspel. Corresp.

TOMUS II.

Cum privilegio S. R. M:tis Sveciæ, & Eleæt. Saxon.

STOCKHOLMIAE, Typis PETRI HESSELBERG 1778.

¶
¶
¶
¶
¶
Je ne vois de si difficile que de faire une bonne Histoire des Drogues, c'est, à dire de décrire non seulement tout ce qui compose la Matiere médecinaire, mais encore de faire la description des plantes, des animaux & des mineraux, d'où l'on les tire.
- - - Après cela je ne suis pas surpris, si ceux qui se melent d'écrire l'histoire des Drogues, font tant de beveües, & moi le premier. On ne rapporte que des faits incertains & des descriptions imparfaites.

PITTON de TOURNEFORT.

CLASSIS XIII.

CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.
ORDO
MONOGYNIA.

284. **C**APPARIS spinosa. LINN. *Sp. pl.* 720.

Mat. m. 259.

Capparis spinosa fructu minore, folio subrotundo. DUHAM. *Arbr.* 1. p. 119. t. 47.

Capparis. BLACKW. *Herb.* t. 417. DALECH. *Hist.* 155. DODON. *Pempt.* 734.

Culinis CAPPARIDIS Cortex, Flores conditi.

Locus. Europa australis. *Arbor.*

FORMA. sicc. *Cortex radicis convolutus, in frustis digitalibus, cinereus, subrugosus, annulis notatus transversalibus, parallelis, crassitie lineæ vel supra. Flores semierupti, calyce tetraphylo & corolla tetrapetala conniventibus, ovati, magnitudine feminis Pisii, virides, nebulosi. Stamina & Pistillum inclusa.*

PROPR. corticis: *Odor nullus; sapor amarus, acerbiusculus. Florum conditor. odor fragrans, non ingratus; sapor odori congruens, acescens,*

VIRTUS: *cort. tonica.*

USUS: *flor. culinaris.*

OBS. 1. *Infusum corticis aquosum colore infusi Thæx, sapore amaro; vitriolo martis non demutatum. Infusum florum limpidum, odore & sapore florum, vitriolo martis fuscescit.*

F f

OBS. 2.

OBS. 2. Flores nondum erupti condiuntur sale & acetato. Quo teneriores leguntur, eo firmiores fiunt conditi, sapidioresque. In culinis incoquuntur embammatis.

285. ACTÆA racemosa. LINN. Sp. pl. 722. M. m. 253.

Christophoriana americana procerior & longius spicata. DILLEN. Ettkam. p. 79. t. 67. f. 78.

Christophorianæ facie herba spicata. PLUK. Amalb. 54. t. 383. f. 3.

Pharm. ACTÆÆ Radix.

Locus. Florida, Canada. *Perennis.* Facile perfert nostrum clima.

FORMA. rec. *Radix* majuscula, lata, ramosa; ramis brevibus adscendentibus, fusco-terraginea, cincta annulis elevatis, remotis; inferiore parte instructa fibris plurimis descendentibus, filiformibus, crassitie pennæ anserinæ, inferne ramosis. *Parencyma radicis* albidum, carnosofirmum, post sectionem transversalem disco medullari; peripheria striis abruptis, radiantibus, annulum constitente; *fibrarum* vero signo stellæ notatum: radiis 4, obovatis, obtusis.

PROPR. rec. *radic.* *Odor* foetidiusculus; *sapor* amaricans. *Siccata* radix fortior, sapore & odore narcoticō.

VIRTUS: subvenenata.

USUS.

OBS. Planta hæc apud nos officinalis non est, nec a propria experientia certi quidquam de illa statuere possum. Cl. COLDEN (*) docet, radicem in forma cataplasmatis tumores scirrhosos solvere; additque, tinturam radicis propinatam ægroti cuidam maximam induxisse ægritudinem, cum sudoribus frigidis, sine tamen ulteriori malo. Radic. sicc. gran. 1, bis de die propinatum, initio emesin movisse, observavi.

286.

(*) Act. Upsal. a. 1743. p. 132.

286. CHELIDONIUM majus. LINN. *Sp. pl.* 723.
Mat. m. 252. MILL. *Figur.* t. 92. f. 1. *OEDER Icon.* t. 542. BLACKW. *Herb.* t. 91. KNIPH.
Bot. orig. cent. 8. ZANNICH. *Venez.* t. 212.
 DOD. *Pempt.* 48.

Pharm. *CHELIDONII MAJORIS* Radix,
 Herba.

Locus. Europa, locis subruderatis. *Perenne.*

FORMA. *rec.* *Radix cylindrica*, descendens, palmaris, fibrillosa, subramosa, superne bifida, exiis rubicunda, pelliculis nigricantibus, emortuis, laxe tecta; *parenchymate* subcarnoſo, luteo; transversaliter ſecto lacteſcente, centro medullari orbiculato, circumdato diſco corticali. *Caules* plures ex una radice, erecti, subtetragoni, ſcabridi, minutim pubescentes, inferne ſimplices, nudi, superne ramoso-dichotomi, foliosi. *Rami* diverſati, teretiusculi, subangulati, pubescentes. *Folia* pinnata, ſupra glabra, subtus villoſa: foliolis suboppositis, petiolatis, ovatis, obtuſis, venofis, lobatis: ſinubus obtuso-rotundatis; lobis obtuſis, obtufe ferratis; terminali foliolo obovato, e pinnis confluentibus nato, apice trifido; radicalia longius petiolata; ſuperiora ſeffilia, ramis oppofita. *Petiolelli* basi ſurſum ala triangulari. *Petoli* ad axillas pubescentes, subtus convexi, ſupra concavi, basi axilla lanati. *Axillæ* nodosæ. *Flores* umbellati. *Umbella* pedunculata, ſimplex, nuda, quadrifida. *CAL.* *Per.* diphyllum: foliolis ovatis, obtuſis, concavis, luteo-virideſcentibus, submembranaceis, glabris, deciduiſ. *COR.* 4-pe-tala, lutea: *petalis* ſeffilibus, obovatis, obtuſis, patenti-erectis. *STAM.* lutea. *Filam.* plurima, longitudine corollæ, tetragona, ſuperne ſenſim

crassiora. *Antb.* ovatæ, obtusæ, sulco utrinque longitudinali didymæ. *PIST.* *Germen* lineare, longitudine fere staminum, glabrum, tetragono-compressum; lateribus oppositis duplo latioribus. *Stylus* brevissimus. *Stigma* obtusum, emarginatum.

PROPR. *rec. radic.* *Odor* graviusculus; *sapor.* amarus, acris; *masticata* salivam croceo tingit; *herbæ odor* subgraviusculus; *sapor* leniter amaricans, acris. Tota planta, utpote rami, caules, petioli & foliorum nervi, lactescens; *læde* croceo, quod, cuti s. papyro illinitum, maculas croceas facit, aqua facile eluendas; vasculo exceptum hoc lac, siccescit, & abit in massam penitus fusco-nigricantem, intensius amaram. *Sicc.* planta magis amara, minus acris, ingrata, fau-
cibus inhæret.

VIRTUS herb. *rec.* acris, purgans; *sicc.* diuretica.

USUS. Hydrops, Cachexia, Herpes.

OBS. *Infusum* aquos. *herbæ sicc.* rubrum, odore subnauseoso, sapore amaricante, acriusculo; vitriolo martis fuscescit. *Infusum radicis sicc.* luteum, odore debili, sapore amaricante; vitriolo martis leviter fuscescit.

287. PAPAVER somniferum. LINN. *Sp. pl.* 726.

Mat. m. 250.

a). Papaver hortense semine nigro. BAUH. *Pin.* 170.

Papaver nigrum sativum. DODON. *Pempt.* 442.

BLACKW. *Herb. t.* 482.

β). Papaver hortense semine albo. BAUH. *Pin.* 170.

Papaver sativum alb. DOD. *Pempt.* 441.

Pharm.

Pharm. PAPAVERIS NIGRI Herba, Capi-
ta, Semina.

— — — *ALBI* Semina.

OPIUM crudum.

Locus. Europa australis, Oriens, in agris. *Annum.*

FORMA. *rec.* *Radix* alba, fusiformis, ramo-
sa, descendens. *Caulis* subbipedalis, erectus, te-
res, minutim angulatus, glaber, rore glauco
obductus, ramosus. *Rami* alterni, erecti, tere-
tes, vix angulati. *Folia* alterna, sessilia, ample-
xicaulia, spithamæa, ovato-oblonga, obtusa,
margine incisa s. grosse crenata, utrinque gla-
bra, supra viridescentia, subtus glauca, venosa,
venulis reticulata. *Pedunc.* terminales in ramis,
subsolitarii, elongati, erecti, hispidi, ceterum
nudi, uniflori. *CAL.* *Perianth.* diphillum: folio-
lis oppositis, ovatis, bifidis, concavis, glabris,
caducis. *COR.* 4-petala, saepius plena, petalis
obovatis, latis, apice rotundatis, venosis, colore
variantibus, saepius incarnatis, patentibus, subfessili-
bus, basi macula violacea, nitida. *STAM.* *Fit.* pluri-
ma, filiformia, longitudine fere pistilli. *Antb.* ob-
longæ. *PIST.* *Germen* magnum, globosum, viri-
descens, glabrum. *Stylus* nullus. *Stigma* maxi-
mum, latitudine germinis, peltatum, explanatum,
planum, cartilagineum, tenue, margine undi-
que inciso-10-fido: laciniis ovato-rotundatis, su-
perne serratis, supra notatum radiis linearibus
elevatis, adnatis, villosis, singulis laciniis stigma-
tis respondentibus singulis. *Capsula* (s. *caput*)
globosa, magnitudine fere Pruni fructus, glabra;
rore glauco-cærulescente tincta, coronata stigma-
te persistente, subdecemlocularis, apice sub sti-
gmate decemfariam hians: laciniis totidem ova-
to-obtusis, subrevolutis; dissepimentis utrinque

planis, dorso incrassatis, undique rugosis, ad centrum capsulae non attingentibus. *Semina* milrena, parvula, fusca, subrotundo-reniformia, punctis excavatis undique rugosa. *Albi* semina conformia, colore albo. *Opium crudum*: *gummi-resina* in frustis majoribus, ponderosa, aequalis, pura, extus rufo-fusca, subsplendens, fractura intus viridescens, vel nigricans, pro gradu siccitatis, opaca, plastica, digitis subadhærens.

PROPR. rec. herbæ: *Odor* debilius narcoticus, opio congruens. *Folia* odore sunt debiliore; rami fortiore; pedunculorum vero apices & capsulae juniores adhuc validiore. *Sapor* herbaceus. Pedunculorum apices & capsulae juniores, dum sauciantur, e corticali parte lac stillant album, cremori lactis simillimum; caulis tenerior, rami & costæ atque nervi foliorum lac fundunt dilutius. Capita ætate proiectiora parum lactescunt, matura autem nihil. Hoc lac (ex nostro Papaveri nigro), collectum & vasculis immissum, validius spirat Opium, dum recens; in ære siccatum abit in gummi-resinam rubicundam, subpellucidam, quæ, inter digitos tractata, plastica deprehenditur, digitis subadhæret, odore Opii remissiore; in candelæ flamma accensa flagrat: flamma vivida, lucida, fuliginosa, odore non narcotico, relicto carbone atro, subsplendente. *Opii orientalis odor* validus Papaveris; *sapor* nauseosus, amaricans, acris, calidiusculus. In ignis flamma accensum opium flagrat: flamma vivida, odore minime narcotico. Solvit digestione, vel etiam via frigida, si agitatur, in aqua, aceto, succo citri, vino, atque spiritu vini; sed semper multum non soluti remanet in fundo vasis; *Tinctura* fit lutea vel brunnea, pro

pro diverso pondere Opii adhibiti, narcotica, viribus cum opio conveniens. Aqua calida emollii potest opium crudum, & cum illa in pulpæ tenuioris formam redigi; sic subsequentे expressione a sordibus immixtis facile purgatur; quo facto denuo in consistentiam pristinam evaporatione redigi potest, atque tunc *Extractum thebaicum* dicitur. Opii crudi drachmæ 12 continent partis gummosæ drachm. 5, & resinosæ unc. 3, atque magnatis, neque in aqua nec in Spiritu vini solubilis, drachm. 3 (*).

VIRTUS: *herbæ & capit.* anodyna; *opii* anodyna (parca dosi), soporifera (majori dosi), anti-spasmodica, sistens, diaphoretica; nimia dosi narcotica, virosa, letalis.

USUS Opii: Agrypnia, Irritabilitas, Hysteria, Spasmus, Dolor, Profluvium, Tussis catarhalis, Abortus.

OBS. I. Infus. aquos. seminum Papav. nigr. subemulsivum; cum alchohole vini spissescit; a vitr. martis nil demutatur. Infusum capit. Papav. rubrum, odore fausto, sapore debili, subfatuo; vitr. martis subobscureum fit. *Extract.* Papaveris, ad placitum cl. THOM. ARNOT (**) paratum, valde æctivum est. Scilicet resecanda capita adulta, nondum vero matura, una cum summitatibus pedunculorum lactescentium, & in vase reponenda ad siccandum. Tum contundantur & coquuntur in aqua pura per 4 horas; colatura, expressione facta, subsidat per diem unum alterumve, & cum albumine ovi clarificetur; tandem vaporet in consistentiam melliginis. Deprehendit ARNOT, hoc extractum, dupla dosi datum, opio respondere, sed initius agere, nec stu-

(*) Cfr. ALSTON in *Medical Essays abridg.* vol. i. p. 141.

(**) *Medic. Essays* vol. 5. art. ii. Cfr. *Med. Eff. abridg.* p. 159.

porem, delirium, naufragiumque excitare. Ex capit. libr. 6 obtainuit Extr. libr. 1. Cl. GUETTARD (*) extraeti solidi unc. 4 ℥ paravit ex capit. papav. libr. 3, quod tam validum fuit, ut grana 2, propinata, 6 horarum somnum induxerint; sed granum 1 vix soporiferum fuit.

OBS. 2. Opium indiscriminatim ex utraque Papaveris somniferi varietate, alba nimurum & nigra, defumitur. Turcis, Arabibus, Persis & Indis maxime familiare pharmacon, usui diætetico præcipue dicatum. Hinc integri vastique agri Papavere conseruntur, eujus capita immatura, sauciata, lac stillant, quod, posteaquam siccatum est, *Opium* audit. Præstantissimum est opium album, *Mastac* dictum, albido, lutescens, purissimum, natum ex succo; e capitibus papaveris incisis profluente, & in aëre, super ipsa capita, sicciato, estque id cærissimum, & ab ipsis magnatibus in patria expetitum, unde raro ad nos fertur. Ex singulo capite papaverino vix ultra pauca grana Opii haberi possunt. *Tbebaceum* opium, nobis officinale, vulgatissimum in Oriente est, plebis usui imprimis inferviens. Paratur id sola confusione & expressione capitum Papaveris, subsequentे inspissatione spontanea in aëre libero. *Meconium* vero, quod ad nos nunquam venit, paratur vel e foliis Papaveris, vel e capitibus, a collectione opii albi superstibus, infusione in aqua calida, vel etiam ebullitione abrupta, subsequentे percolatione & inspissatione. Optimas *notas*, quibus Opium officinale melioris speciei in Oriente distingvitur, affert Du MONT (**); sc. quod erit colore obscure fusco, sapore amaro, odore tetro, valde inflammabile & combustibile; quando frustum frangitur, debet intus splendere, fere tanquam pīx nautica, & post solutionem debet dare tinturam brunneam. Atque ad hæc notas cum Tureæ, tum mercatores Europæi, in selectu faciendo se conformant. *OBS.*

(*) *Mémoir des sciences & arts*, p. 113. Cfr. ARNOT, *l. cit.*

(**) *L. c. tom. 4. p. 52.*

OBS. 3. Opium, *externe* cuti applicatum, agit stimulando & insimul sopiendo. Si diutius supra cutem manet, rubedinem vel vesiculas excitat, ubi nimurum cutis tenera est opiumque recens. Dolorem sedat, si loco dolenti imponitur, sed somnum insimul inducit; quod nec prisci ævi medicis ignotum fuit, siquidem DIOSCORIDES suppositoria ex opio dormire fecisse observavit. Inflammatoriis in morbis, sive deglutitum fuerit opium, seu extus applicatum, gangrænam excitare, asseverat cl. TISSOT (*). Opium, denudatis musculis abdominalibus, intestinis &c. siphone injectum, apud Ranas subito tollit omnem motum, & fere citius illas enecat quam vel decollatio, ut observavit ROB. WHYTT, qui curiosa experimenta in animalibus vivis cum opio instituit (**). Ex quibus, collatis cum aliis ab ALSTON (***) factis, patet, solutionem opii, si in anum, abdomen vulneratum, vel thoracem incisum injiciatur, vel etiam si per os largiore dosi sumatur & deglutiatur, partes omnes, quas tangit, totumque corpus sensatione, motuque privare, & immediate in partes affectas agere, muscularum denique vim motricem infringere sopiendo, h. e. irritabilitatem & sensibilitatem tollendo. Ex instillata Opii solutione ventriculo Ranæ nulla observabatur mutatio in consistentia & colore sanguinis rubri & seti; sed velocitas motus sanguinis per vasa ita diminuebatur, ut duplo tardius sanguis circularetur. Post horæ dimidium sensim increscet motus sanguinis. Opium, *interne* sumtum, in plerisque agit uti spirituosa; etenim nervos consopit, illosque ad irritacionem insensuales reddit, sensum sic doloris tollit, & animum exhilarat; præterea evacuationes restringit, dia-

F f 5

pho-

(*) Epist. ad HALLERUM de variolis, in cl. SANDIFORT Thesauro Differt. vol. 2. p. 5.

(**) Essays and observ. phys. and litter. v. 2. p. 289 - 316.

(***) Med. Essays abridg. v. 1. p. 148.

phoresin sublevat, siccitatem oris inducit, stuporem excitat, facit dormire cum rubore faciei, subseguente lasitudine, gravitate capitis, & siccitate faucium; sed pulsus retardat & pleniorum facit, quamdiu ejus aetio durat; relinquitur autem pulsus debilis, cum tristitia, post agentem caussam opii. *Dosis* opii apud nos est a quadrante grani ad dimidium, vel ad summum gran. i, urgentibus sic symptomatibus. Ceterum apud assuetos dosis in altum adscendere potest; sic multi Turcae, Persae &c. interdum sumunt opium ad drachm. i, immo ad unc. i, idque nycthemeri spatio. Apud illos, qui opio ita assueti sunt, agit opium alio fere modo ac apud nos; etenim non facit illos obdormire, nisi in majori dosi manducetur, sed inducit stuporem cum gravitate capitis, & semivigiles illos reddit. Prout dosis major minorve fuerit, illos exhilarat, inebriat, animosos facit in bello, agiles in currendo, aptos labori sustinendo, intrepidos in adversis, jocosos, subdeliros, subfuribundos. *Incommoda* ex abuso opii sunt: appetitus deperditus, corporis emaciatio, langvor, melancholia (in qua unicum solatium est opium), stupor, somnolentia, taciturnitas, memoriae abolitio, facultates intellectus labantes, senium praecox, mors prematura. Hydrope non generat opii abusus, prout communiter accidit ex abuso spirituorum.

OBS. 4. Usus Opii apud anteriores medicos frequensissimus fuit, nostro vero tempore multum decrevit. Sic nunc raro damus opium in febre variolarum secundaria, nec in ulla specie febris, nisi summa cum circumspicientia. In febribus criticis identidem turbat crisi, & in biliosis putridisque febribus, evacuationibus artificialibus obicem ponit, & congestionem ad caput promoveret. In omni inflammatione opium nocet, & podagricus dolor mitigatur quidem per nonnullas horas, sed repetitæ doses opii nonnisi cum damno ægripe-

plerumque propinuantur. Fuere qui maniam opio curare tentarunt, siquidem largas opii doses communiter ferunt maniaci; sed eventu ut plurimum sinistro, & nullam curam perfectam in eo casu ex opii usu provenisse novi. In spasmis vero & doloribus absque febre, in hysteria & irritabilitate generis nervosi, in colica nephritica, in abortu imminente, in diarrhoeis, aliisque evacuationibus profluentibus, saepe mira praestat opium. At in dysenteria cum restrictione dandum; mitigat quidem symptomata, sed absque stabilitate, & effectum evacuantium valde retardat. Certe pieraque dysenteriae, minori cum discriminé, remediis antimoniaibus sine opio curantur. Ceterum tusses catarrhales recentes opio, in prima quasi herba, intercipiuntur. Immo tusses etiam protractae opio levantur, &, ut bene monuit cl. S. TH. DE MEZA (*), tussis illa titillatoria, hora somni vesperi rediens, phthisi obnoxii imprimitis familiaris, opio eleganter sopitur, & eruptio phthiseos inde praecavetur, modo usus continuetur per 2 vel 3 septimanas, & vena fecetur, quando pectoris dolor molestus urget.

OBS. 5. Larvis insectorum devastatur saepe Papaver, quod, quoniam planta permultum narcotica est, a priori haud statueres; capita vero nunquam ab iis erosa observavi.

OBS. 6. Semina Papaveris minime narcotica sunt, idque exinde concludas, quod lac narcoticum non nisi e corticali parte capsulae stillat. Cruda eduntur innoxie a gallinis, & a Polonis, Italis, aliisque gentibus ad cibum adhibentur. Sunt qui, errore populari decepti, haec semina, uti anodyna, emulsionibus immiscent, sed absque effectu. Sem. Pap. alb. libra i expressione dat olei unc. 4. Hoc oleum mite est, & in frigore non cogitur, quare facile rancescit.

OBS. 7.

(*) Societ. med. Havn. collect. tom. 2. p. 309. sequ.

OBS. 7. De Papavere scripsit M. FR. LOCHNERUS (*), sed philologice. De Opio bene scripserunt plures, inter quos eminent cl. G. YOUNG (**) & B. L. TRALLES (***) . Inter compilatores primas tenet M. TILINGIUS (†), qui librum crassum corrasit de Opio, sola compilatione innixum. Quæ ipse adjicit, plerumque falsa sunt. Dicit e. gr. folia Sennæ per se vix purgare, nisi exæcta fuerint aliis purgantibus.

288. PAPAVER Rhoeas. LINN. *Sp. pl.* 726. *Mat.* m. 251. KNIPH. *Botan. orig. cent.* 5. LUDW. *Ectyp. p. 8. t. 17.*

Coquelicot. BULLIARD *Flor. paris.* t. 5.

Papaver rubrum. BLACKW. *Herb.* t. 2.

Papaver erraticum. DOD. *Pempt.* 444.

Pharm. PAPAVERIS RHOEADIS Flores.

Locus. Europa, in agris. *Annum.*

FORMA. rec. Flores longius pedunculati. *CAL.*

Perianth. diphylum: foliolis æqualibus, ovatis, obtusis, concavis, conniventibus, extus adspersis tuberculis setiferis, scabro-hispidis, corollam nondum eruptam includentibus, sub eruptione corollæ deciduis. *COR.* phœnica, pulcherrima, saepius plena. *Petala* semiorbiculata, obtuso-rotunda, sessilia, basi venosa, erecto-patentia. *STAM.* purpurascens. *Filam.* plurima, subulata, corolla longe breviora, erecta. *Antb.* lineares, truncatae, utrinque planæ, purpureæ, fulco longitudinali lu-

(*) *Meconopaignion s. Papaver ex omni antiquitate erutum.*
Norimb. 1719.

(**) *G. YOUNG Treatise on Opium.* Lond. 1753.

(***) *B. L. TRALLES Usus Opii salubris & noxijs.* Vratisl. 1757-1762. vol. 2.

(†) *Anchora salutis sacra s. de Laudano opiatu, &c.* Fran-
cof. 1671.

luteo. *PIST.* *Germen* ovato-globosum, glabrum, longitudine staminum, glaucum. *Stylus* nullus. *Stigma* hemisphaericum, sessile, latitudine germinis, undique striatum: striis radiantibus, elevatis, purpureis, minutim pubescentibus.

PROPR. rec. *Odor* satis fortis, papaverinus; *sapor* debilis, vix ullus; *masticata* petala tenera, lubrica, mucilaginosa: *saliva* violacea. *Siccati flores* purpurascentes, inodori fere.

VIRTUS rec. narcotica; sicc. anodyna.

USUS.

OBS. *Infusum* flor. rec. aquosum rubro-purpureum, odore papaverino, sapore debiliore, papaverino, subamaricante; cum spiritu vitrioli pulchre sangvineum fit; cum vitriolo martis subito nigrescit; hujus infusum guttæ 10, instillatæ aquæ puræ unciæ 3, addito vitriolo martis, colorem cœruleum stiterunt. Sub infusione petala prorsus fere decolorantur. *Infusum* florum, cum ebullitione paratum, rubro-purpureum est, mucilaginosum; sed si soiummodo tepide paratur, parum mucilaginosum evadit, & addito saccharo fit *Syrupus* pulcherrimus, leniter anodynus, ad tingendas mixtu- ras idoneus.

OBS. 2. *Capita* immatura hujus speciei pariter laetescunt: lacte luteo, odore Opii.

289. CAMBOGIA Gutta. LINN. *Sp. pl.* 728. *Mat.* m. 257.

Coddam-pulli. RHEED. *Malab.* 1. p. 41. t. 24.

BLACKW. *Herb.* t. 392.

Grotularia arborea gummifera, flore albo, intus tomentosa. BARRER. *Aquin.* 56.

Caonia arbor. PIS. *Bras.* p. 60. t. 60. MARCGR. *Brasil.* p. 96.

Pharm. *GUTTA (Cambogiæ) Gummi.*

Locus. India, Arbor.

FOR.

FORMA. *Gummi-resina* in massa solida, duruscula, homogenea, purissima, croceo-rubra, opaca, lœvissima, nitida, fragilis : fracturis planis.

PROPR. *Odor* nullus. *Sapor* vix ullus. *Masticatum* primum friabile, dentibus dein adhæret, tum solvitur, & sensationem siccitatis cujusdam fauibus imprimit, salivam tingit colore aureo-luteo. In candelæ flamma accenditur, flagrat flamma vivida, fremente, lucida, fulgorante, fuliginosa, odore fere ligni accensi. Sub deflagratione emollitur primum, subliquescit, subdestilat in guttas, dein nigrescit, tumet & vertitur in carbonem nigrum, spongiosum, levissimum, intus nitidiusculum, friabilem, vix inquinantem. In vase ferreo super ignis flammam lente emolitur, non fumat, nec liquefcit, sed diutius super ignem retentum nigrescit, atque in massam mollem, subtenacem, nigram vertitur, quæ, voluta, vestigia in vase relinquit nigra, splendentia. *Gummi Gutta*, adspersum aqua simplici, mox colorem mutat in pulchre luteum, quod citius adhuc fit cum saliva. Solvitur trituratione vel conquassatione in aqua simplici: solutione lactescente, dilute lutea; in saliva humana: solutione lactescente, spissa instar tremoris lactis, albido-lutea, latera vitri inquinante; in spiritu vini: solutione aureo-lutea; hæ solutiones quiete sponte præcipitantur, sed solutio cum saliva parum. Si oleum Tartari p. d. his solutionibus additur, subito rubescunt, & quiete multum præcipitantur: sedimento ex spirituosa solutione rubro, liquido supernatante limpido; ex solutione aquosa lutecenti - subrubicundo, liquido supernatante limpidiusculo. In oleum Tartari p. d. frigide im-

immissum gummi Gutta, emollitur, subtenax fit, solvitur: solutione sanguinea, in subluteum incidente, in quiete vix se præcipitante; si plus gummi, quam solvi potest, additum fuerit, tingitur colore fusco-sanguineo, exacte ut sanguis grumosus. In oleis expressis nullam subit mutationem hoc gummi; sed tritum cum oleis stillatiis, e. gr. oleo Terebinthinæ, & in balneo digestum, oleum tingit rubicundo colore, etiam si penitus solutum non fuit.

VIRTUS: purgans, hydragoga, (dosi gr. 2-5-8), subemetica.

USUS. Hydrops, Tænia.

OBS. 1. Guimmi Gutta sub specie succi luteo-lætescentis effluit ex sauciata arbore, cum e cortice intermedio radicis seu trunci, tum e ramulis decerpitis. Hunc succum sponte insipillari faciunt incolæ, & deinde subigunt in massas parvas, subrotundas vel cylindricas, qua forma postmodum ad nos affertur.

OBS. 2. G. Gutta, in herpete externe applicitum, commendat cl. BARRERE. Interne frequenter propinamus hoc gummi, ut validum purgans hydragogum in hydrope. Ad Tæniam pellendam conductit etiam G. Gutta, radice Filicis maritatum.

OBS. 3. Inquirendum reor, annon Cambogia americana alia sit species, siquidem flores intus tomentosi & fructus magnitudine Cerasi sunt, dum orientalis fructus magnitudine pomi est.

292. *NYMPHÆA alba*. LINN. *Sp. pl.* 729. *Mat. m.*

258. OEDER *Icon.* t. 602. BLACKW. *Herb.* t.

498. & 499. f. 2. CAMER. *Epit.* 634. LOB.

Hist. 324. DOD. *Pempt.* 375.

Pharm. *NYMPHÆÆ ALBÆ* Radix, Flores.

Locus. Europa, Virginia, sub aqua dulci. Perennis.

FORMA. rec. Radix magna, longa, crassitie brachii vel ultra, diametro 2 pollicum, cylindrica, extus fusca, tomentosa, undique adspersa mammillis convexis, viridescentibus, glabris, singulis instructis fibris teretibus, crassitie pennæ anserinæ; parenchymate subcarnoso, albido-lutescente; post sectionem transversalem centro medullari ampio undulato, serie punctorum annulari in ambitu centri; peripheria parenchymatis undique obsessa glandulis subdiaphanis, magnitudine fabæ feminis, spongiosis, h. e. undique pertusis poris approximatis, Flores pedunculati, speciosi: pedunculis longissimis, 2 vel 3 cubitorum longitudine varia, pro diversa profunditate aquæ; teretibus, glabris, nudis, erectis, unifloris. CAL. Perianth. 4-phyllum: foliis lanceolatis, obtusis, glabris, extus viridibus, intus albis, striis parallelis, erecto-patentibus. COR. nivea, longitudine calycis, polypetala. Petala ultra 12, lanceolata, obtusa, sessilia, 5-striata, erecto-patentia, germinis lateri undique insidentia. STAM. Filam. numerosa, erecta, supera, serie triplici disposita, corolla duplo breviora; quorum exteriors lata, lanceolata, albida; interiora autem paullo angustiora, lutea, breviora. ANTH. lineares, erectæ, sulco longitudinali. PIST. Germen intra receptaculum. Stylus nullus. Stigma maximum, staminibus duplo brevius, peltatum, sessile, concavum, multipartitum: laciinis parallelis, carnosis, subtus planis, supra convexis, apicè luteis, glabris, lævibus, inflexis; tuberculum ovale, glabrum, in centro cayi stigmatis.

PRO-

PROPR. rec. radic. Odor nullus; sapor stypticus; masticata radix sicciuscula. Radix recens, cultro ferreo concisa, ferrum solvit, & obducitur tandem culter pulvere nigro - cæruleofcente, inquinante. Florum: odor vix ullus; sapor nulus; masticati subglutinosi.

VIRTUS: adstringens; rec. leviter rubefaciens.
USUS.

OBS. 1. Infus. aquos. radicis rec. aqueum, sublutescens, odore debili, paludoso, sapore amaricante, leniter styptico; vitr. martis subito cæruleo-nigrescit; hujus infusi guttæ 20, instillatæ aquæ puræ unciaë 3, addito vitr. martis, colorem violaceo-viridescensem exhibuerunt; guttæ vero 40 cæruleo-violaceum. Infus. florum rec. lutescens, limpidum, odore radicis, sapore longe debiliore; vitr. martis derepente nigrescit; hujus infusi guttæ 10, cum aquæ unc. 3 dilutæ, addito vitr. martis, colorem cæruleo-nigrum stiterunt. Alcoholi vini, infuso instillatum, nihil mucilaginosi separavit.

OBS. 2. Radix Nymphaæ luteæ in officinis promiscue sumi solet cum albæ radice; sed prior radix recens cultrum non afficit ut posterior, nisi perquam leviter; valde tamen styptica est, adeo ut infusi radicis luteæ sicc. guttæ 8, aquæ unciaë 3 instillatæ, una cum vitr. martis, colorem violaceum fecerint.

291. BIXA Orellana. LINN. *Sp. pl. 730. Mat. m. 266.*

Urucu. PIS. *Bras. 65. MARCGR. Bras. 61. SLOAN.*

Jam. 2. p. 52. t. 181. f. 1.

Orleana f. Orellana folliculis lappaceis. PLUK.

Almag. p. 272. t. 209. f. 4. COMMEL. Hort. 1.

p. 65. t. 33.

Pigmentaria. RUMPH. *Amb. 2. p. 79. t. 19.*

Oviedi Bixa. CLUS. *Exot. 74. t. 74.*

Le Rocu. MERIAN. *Surin.* p. 44. t. 44. SONNERAT *Voy. à la Nouv. Guinée,* p. 29. t. 18.

Achiotl. HERNAND. *Mex.* p. 74.

Arnotta. BANCER. *Gvian.* p. 27. *

Pharm. *ORLEANA* terra.

Locus. Brasilia, Mexico. *Arbor.*

FORMA. *Massa* coccinea in frustis majoribus, solida, æqualis, pura, fragiliuscula, subinquinans.

PROPR. *Odor* ingratus, etiam recenter paratæ Orleanæ, cum tota arbor ingratum sparcat odorem; ea vero, quæ apud nos venditur, sæpe Tabacum redolet, forte a præparatione. *Sapor* debilis, obscure falsus; *masticata* in ore solubilis, salivam coccineo colore tingens.

VIRTUS.

USUS: tinctorius.

OBS. 1. Orleanæ terra in America ab incolis paratur ex seminibus Bixæ maturis, in aqua calida maceratis, tum colatis, & tinctura quieti reddita, ut fæculæ subfidant, quæ servandæ. Terra hæc Orleanæ, cum aqua pura vel saliva trita, solvitur: solutione coccinea. Digestione in aqua tepida non penitus solvitur; tincturam tamen dat phœnieceam, subsalsam, vitriolo martis prorsus nil demutatam. Mulierculis fuci loco inservit, unde *Bezetta rubra*. In lixivio cocta, sericum, lanas & lintea colore rubro-aurantio tingit; sed colorem persistentem non dat, nisi serico. Pars colorans residet in resino, quare alcali ope solvenda, ut tinctoria evadat; si enim acidis solvitur, nimis lutescit. Apportatur hæc terra in frustis, pondere librar. 2 vel 3, foliis obrectis. Præstantissima ea est, quæ pulchro colore carneo-rubro est, absque venis nigris.

OBS. 2. In America cibo, loco Croci, semina arboris admiscent incolæ. Colitur hæc arbor imprimis

barbaris Americæ, ob fucum Americanum, quem parant maceratione semen recentium in succo Limonum, addito gummi ex arbore *Mauna*, quo totum corpus rubro-kermesinum pingunt; EDV. BANCROFT.

292. TILIA europæa. LINN. Sp. pl. 733. Mat. m.

262. OEDER Icon. t. 553. KNIPH. Bot. orig. cent. 10.

Tilia. BLACKW. Herb. t. 469. DOD. Pempt.

826. MERIAN. Eruc. ort. p. 31. t. 76.

Tilia femina. DALECH. Hist. 89.

Tilia foemina folio minore. DUHAM. Arbr. 2. p. 334. t. 95.

Pharm. TILIÆ Cortex, Flores.

Locus. Europa. Arbor.

FORMA. rec. Cortex (ramulorum) tenuiusculus, cinereo-lutescens, fibris retiformibus constans, intersticiis repletis fibris transversalibus, parallelis, subpulposis; extus vestitus epidermide fusco-cinerea. Corymbi florum simplices, axillares e foliis, prope gemmam futuri anni, longius pedunculati, patentes, solitarii, glabri, subsexflori. Pedunculi proprii versus basin cingulo notati, e punctis circiter tribus constante. Bractea linearis, solitaria, membranacea, albido-subviridescens, glabra, venulis reticulata, apice obtuso-rotundata, inferne attenuata, basi saepe dimidiata, palmaris, longitudine corymbi, a medio inferne pedunculo adnata, superne libera.

CAL. Perianth. 1 phyllum, 5-partitum: laciniis albidis, ovato-lanceolatis, acutis, concavis, extus glabris, intus villosis, reflexo - patentibus.

COR. Petala 5, oblongo-cuneiformia, obtusa, inferne in ungues lineares breves attenuata, calyce paullo longiora, patentissima, concaviuscula,

la, albida. *STAM.* *Filam.* plurima subulata, albida, corolla longiora, erecta. *Anth.* luteæ, cordatae, erectæ. *PIST.* *Germen* superum, subrotundum, tomentosum. *Stylus* cylindricus, albus, staminibus paullo brevior. *Stigma* subcapitato-truncatum, rugosum.

PROPR. *rec.* *Cortic.* sicc. *Odor* debilissimus; *sapor* debilis, vix amaricans. *Florum:* *Odor* sva-veolens, præcipue tempore vespertino, in flores Naphæ incidens. *Sapor* debilis, subglutinosus; *masticati* flores recentes lubrici sentiuntur, mucilaginosi. *Petala*, peracta anthesi, rubescunt; decerpta etiam rubescunt inter siccandum. *Siccati* flores fere inodori, saپore pariter subglutinoso.

VIRTUS: *flor.* *rec.* subanodyna.

USUS.

OBS. I. *Infusum* aquosum *cortic.* *sicc.* aurantium, odore debili, ingrato, saپore odori congruente; *vitr.* *martis* fuscescit; *florum rec.* *infusum* sva-veolens, saپore debiliter amaricante; cum vitriolo *martis* nigre-scit. *Infusum* saturatissimum *florum* *recenter* *siccator.* mucilaginosum, spissum, adspexitu tamen limpidum; diapharum, citrinum, in fila ductile, odore *florum* paullo debiliore, saپore debilius amaricante, odori con-gruente; in ore detentum spissum, haud aliter ac oleum, sentitur; vitriolo *martis* nigre-cessit. Hujus infusi guttae 20, aquæ unciæ ½ instillatae, addito *vitr.* *martis*, colorem fusco-viridescensem stiterunt. *Alcohol* *vini*, *infuso* ad-ditum, mucilaginem præcipitavit. *Aqua* stillat, *florum* *Tiliæ* ex ipsis *floribus* parari debet, sepositis bracteis. Si ex *floribus* recentibus, integris & non contusis de-stilletur, justo calore, fragrans evadit & gratum excipiens in mixturis.

293. THEA bohea. LINN. *Sp. pl.* 734. *Mat. m.*
 264. *Aman. acad.* v. 7. p. 237. t. 4.
 Frutex Theæ. LETTSOM *Dissert.* p. 25. t. 1. f. 1. 2.
 Thea frutex Bontii. BLACKW. *Herb.* t. 352.
 Tsia, Thea, Frutex folio Cerasi, flore Ro-
 sæ sylvestris, fructu unicocco, bicocco &
 utplurimum tricocco. KÆMPF. *Aman.* 605.*
 t. 606.

Evonymo affinis arbor orientalis nucifera,
 flore roseo. PLUK. *Alm.* 139. t. 88. f. 6.
 Thee Sinenium sive 'Tsia Japonensibus. BREYN.
Icon. 17. t. 3.

Frutex Thée. CLYVERS in BARTHOL. *Act. med.*
vol. 4. p. 1. t. 1.

Thea. PETIT. *carm.* t. 1.

Culinis THEÆ BOHEÆ Folia.

Locus. China, Siam, Japonia. *Arbuscula.*

FORMA. *Folia* subadulta, alterna, breviter
 petiolata, ovali-oblonga, obtusa, pollicaria vel
 ultra, venosa, margine ferrata: serraturis acutis,
 fuscis, adpressiusculis; utrinque glabra, saepè sub-
 tus pubescentia: pilis raris, tenuibus.

PROPR. sicc. Odor gratus. Sapor amaricans,
 acerbus, non ingratus tamen. Folia e China ad nos
 apportantur convoluta, siccissima, fusca, rarissi-
 me. integra, saepius extremitatibus diffractis.

VIRTUS: diuretica.

USUS: diæteticus sanis pariter ac ægrotis.

OBS. 1. *Infus.* aquos. saturatum rubicundum, odo-
 re & sapore Theæ, vitr. martis adjecto nigrescit; hu-
 jus infusi guttae 10, aquæ puræ unciæ 3 instillatae, ad-
 dito vitr. martis, colorem fusco-viridescentem effe-
 runt; guttae vero 16 colorem opacum, nigricantem.

OBS. 2. *Extractum* Theæ ad nos fertur e China,
 in massa siccæ, solida, nigricante, splendente, perfra-

gili, friabili, odore debilissimo, & sapore Theæ, sed insimul styptico; quod extraëctum, *masticatum*, inter dentes friabile est, facile solvitur, saliva viridi. In aqua fervida cito solvitur: solutione viridi-brunnea, odore subnauseoso, sapore Theæ rudi & styptico, cum vitr. martis subito nigrescente, cuius guttæ 6, cum aquæ unc. ß dilutæ, addito vitr. martis, colorem fusco-viridescentem stiterunt.

OBS. 3. Colitur hic frutex in China, & caute decerpuntur folia tenella, unde Thea melioris notæ paratur, sed vilior Thea ex foliis adultioribus fit. Super terminam ferream torrentur deinde hæc folia; tosta vero, dum adhuc fervent, inter manus convolvuntur, idque crebro, quoad crispa penitusque siccata reddantur. Ante rostionem communiter citissime infundunt hæcce folia aquæ servidæ. Postquam ita siccata sunt, vasis probe obturatis immittuntur, & annuo spatio linquuntur, non gustando. Sic mitigatur, torrefactione & ætate, ea, quæ in Thea inest, virulentia, quam botanicus alias facile reformidaret.

OBS. 4. Thea Chinensis paullo ante medium seculi 17. Europæis innotuit, nec finitum ante erat seculum, quam per totam Europam increbuerat. Nunc vulgarissimi usus ubique est. Nos, Chinensium morem sequentes, Theæ infusum adhibemus; Japonenses vero pulvrem foliorum aquæ immiscent, unde fit quasi pulmentum tenuius, quod sorbillant. Credunt Japonenses, Theæ usum nocere colica vel ophthalmia laborantibus, prodesse vero calculosis; Chinenses rursus maximis encomiis Theam ubique prosequuntur. Qui apud nos Thea abutuntur, pallidi fiunt, tremuli, langido ventre, insomnes.

OBS. 5. Experimenta instituit cl. COAKLEY LETTSEM (*) cum Thea viridi & bohea. Destillavit Theæ vi-

ridis

(*) *Diss. inaug. sistens observationes ad vires Theæ pertinentes.* Lugd. Batav. 1769.

ridis libr. § cum aqua simplici, & elicuit unc. i aquæ still. fragrantis. Residuum dedit unc. 5 & drachm. 5 extracti aquosi, leviter fragrantis, sapore valde amaro & styptico. Hanc aquam stillat. nervis Ranæ ischiatricis denudatis & cavitati abdominalis applicuit, unde extremitates posteriores intra dimidium horæ prorsus paralyticæ & insensuales factæ, & post h̄oram exspiravit Rana. Id vero non accidebat ab extracto Theæ injerto. Unde concludit, fragrantiam Theæ deleterias possidere vires, sicque nocere, dum potus Theæ in largiori quantitate hauritur. Quoniam Thea viridis fragrantior est Thea bohea, eam magis nocivam arbitratur.

294. THEA viridis. LINN. Sp. pl. 735. HILL. Exot. t. 22.

Thea sinensis. BLACKW. Herb. t. 351.

Culinis THEÆ VIRIDIS Folia.

Locus. China. *Arbuscula.*

FORMA. *Folia* subadulta, alterna, breviter petiolata, ovato-lanceolata, apice attenuata, obtusiuscula, pollicaria, saepe subbipollucaria, utrinque glabra, viridia, tenuiuscula, margine acute ferrata: serraturis incurvatis, puncto fusco s. mucrone acuto adpresso scuto terminatis.

PROPR. sicc. Odor gratus; sapor grate acerbus, odori congruens. Folia pari modo contorta, ac in Thea bohea.

VIRTUS praecedentis.

USUS praecedentis.

OBS. *Infusum* aquosum saturatum rubro-luteum, odore fragrante, sapore intensius acerbissimo, odori congruente; cum vitriolo martis subito nigrescit. Hujus infusi guttæ 8, aquæ puræ unciæ § instillatae, addito vitriolo martis, colorem cœruleum, subviridescensem, exalte ut color ex Indigo; guttæ vero 20 nigrum, stiterunt.

295. CARYOPHYLLUS aromaticus. LINN. *Sp. pl.*
735. *Mat. m. 265.* BLACKW. *Herb. t. 338.*

Le Gérolfier. SONNERAT *Nouv. Gén. p. 196. t. 119.*

Caryophyllus aromaticus Indiae orientalis,
fructu clavato monopyreno. PLUK. *Alm.*
88. *t. 155. f. 1.*

Caryophyllus. CLUS. *Exot. p. 16. 181. 267. 376.*
Arbor caryophyllorum. DE JAGER *statut. p.*
449. t. 2. fig.

Pbarm. CARYOPHYLLI AROMATICI.
ANTHOPHYLLI Fructus.

Locus. Colitur in Amboina, in peninsula Oma,
Honimoa, Nussalauta. In insulis reliquis
Moluccis hodie penitus extirpatæ arbores.
RUMPHIUS. Sed crescit sponte in Nova Gui-
nea pluribusque insulis adjacentibus. SON-
NERAT (*). Amat solum humidum. *Arbu-*
scula.

FORMA. Caryophyll. sicc. Flores inexplicati,
ferruginei, unguiculares vel ultra, germine infe-
ro cylindrico, teretiunculo, subtetragono, mi-
nutim rugoso, terminato Perianthio fructus 4-
partito: laciniis lanceolatis, acutis, concavis, e-
rectis, germine multum brevioribus. Perianthium
floris & Corolla, nondum explicata, in sphæru-
lam imbricata, longitudine calycis fructus.
STAM. plura, intra corollam latentia. *Fructus*
(*Anthophylli*): Capsula ovali-cylindrica, apice uni-
bilicata: calycis laciniis persistentibus; minutim
rugosa, magnitudine glandis quercinæ, unilo-
cularis, monosperma, continens Nucleum magni-
tudine fere & figura capsulae, fuscum, biparti-
bilem: sutura anfractuosa; *siccatum* solidum,
durissimum.

PRO-

(*) *Voyage à la Nouv. Guinée*, p. 199.

PROPR. *Caryophyll.* *Odor* fragrans, validus, aromaticus, svavis. *Sapor* aromaticus, fortis, calidus, aceriusculus, subamaricans; *masticati* fauces lingvamque calefaciunt, halitu fragrantissimo. *Anthophyllor.* *odor* debilis caryophyllorum; *sapor* substypticus, aromatico-caryophylleus, debilior.

VIRTUS *Caryophyll.* caletaciens, tonica, stomachica, emmenagogia, confortans. *Anthophyll.* magis adstringens.

USUS: culinaris; Caries dentium, Odontalgia, Paralyfis.

OBS. 1. *Infusum aquos.* *Caryophyllorum rubrum*; fragrantissimum, sapore aromatico, calido; ex vitr. martis nigrescit. *Infusum Anthophyll.* rubrum, saturatum, odore caryophyllorum, sapore consimili, amaricante, minus calido; vitr. martis subito nigrescit. *Oleum still.* *Caryophyll.* liquidum, rubrum, sapore subdulei, omnium calidissimo, forti ex aromate caryophyllorum, odore graviusculo caryophyllo, in aqua subsidens. *Caryophyllos aromaticos multum olei essentialis continere*, peculiari methodo demonstravit cl. MÜLLER (*); observavit enim, postquam caryophyll. aromat. unc. $\frac{1}{2}$ per triduum digesserat in Naphtha vitrioli, parata e spiritu vini rectificatissimo & acido vitrioli concentratissimo, anatica portione mixtis & destillatis, & cum tinturæ huic aquam frigidam deinde affunderet, oleum sponte secedere, flavo-viridescens, innatans, sapore & odore caryophyllorum, in Naphtham simul incidente, pondere scrupul. 7. Quod a Batavis emitur, oletum caryophyllorum, in solo natali destillatum, non æque purum est atque illud, quod cura & diligentia ipsi destillamus. *Caryophylli olei still.* unam septimam partem ponderis sui dant. Hoc oleum omnium fragrantissimum

G g 5

mum

(*) *Diff. ue Oleis essentialibus vegetabilium absque destillatione parandis.* Gissæ 1756. p. 10.

mum est, acerrimi saporis, in Spiritu vini solubile, in aqua subsidens, recenter paratum colore aqueo, ætate primum lutescens, deinde rubicundum. *Aqua still.* fragrans. *Extractum* spirituof. acerrimum, minus odoratum. Spiritus vini minus odorati, plus sapidi, quam aqua, extrahit, ut docet cl. LEWIS. *Anthophylli fructus* recens *oleum expressum* dat.

OBS. 2. Ubi validum aromaticum indicatur, caryophylli aromatici propinantur; sed valde calefaciunt. *Oleum Caryophylli.* dentibus immittitur, ad sedandam cariem sicciam.

OBS. 3. Coluntur arbores Caryophylli solo pinguisculo, locis umbrosis quamdiu teneræ sunt; octavo vel duodecimo ætatis anno fructiferæ evadunt, & deinde quovis quadriennio copiosam messem proferunt. Simulac flores in corymbis rubri apparent, tempus incidit illos colligendi. Eum in finem terra sub arboribus depurgatur, atque scopis verritur, quo facto nonnemo arborem conscendit, ramulos proximos manibus, remotos vero baculis hamatis attrahit, corymbosque decerpitos in terram dejicit. Virentes hos caryophyllos primum aquæ fervidae immergunt, deinde amplis obtegunt foliis, tigillisque imponunt, ut fumo imprægnentur, quare etiam sub his fumans locatur ignis, atque ita per aliquot dies in fumigio relinquuntur, quoad rufum acquirant colorem. Tum solis calori Caryophylli exponuntur ad siccandum, unde ulterius nigrescunt. Siccationem vero rite perætam esse, exinde cognoscitur, quod tunc ungvibus abrasa quædam portio intus læte purpureum præbet colorem, tanquam Cerasi fructus dissestus. Plerique immersionem caryophyllorum in aquam fervidam minus curant, non tamen fumigium negligunt, quatenus eos bonos esse cupiunt, quoniam rugosi, leves & sordidi evadunt caryophylli, si tale fumigium non adhibetur. Ex abusu caryophyllorum maxima ple-

rum-

rumque noxa emergit. Incolæ Arraco suo caryophyllos sæpe adjiciunt, unde fit potus insalubris, ingentem cephalæam excitans, atque tenebrisosum visum efficiens, quod etiam illis accidit, qui caryophyllos quotidie tabaco immiscent. Odor ex acervo Caryophyllorum congesto tam nocivus est, ut si per unicam solum noctem in camera quis dormiverit, in vel sub qua acervus collocatus est, nauseabundus usque ad vomitum anxiusque sit, & ingenti capitï dolore corripitur. RUMPHIUS.

OBS. 4. *Corticem arboris Caryophylli aromatici ex insula Philippin.* Manilla apportavit cl. CAR. H. WÄNMAN, qui eum a Pharmacopola JOSEPHO DEL ROSARIO, ibidem habitante, acceperat. Hic cortex in frustis erat pedalibus, convolutus, extus cinereus, rugosus, sed epidermide sæpius abscissa, unde læviusculus apparebat; crassitie lineæ 1 vel 2, solidus, difficulter fragilis; fractura glabriuscula, albicante; odore fragrante, fere caryophyllorum aromaticorum, sed paucilo graviore; sapore aromatico, odori congruente, calido, acuto. *Masticatus* inter dentes durus, difficilius comminuitur, calet in ore & fauibus, halitu fragrante. Eodem odore instrutæ sunt omnes partes arboris, utsiote radix, folia, flores, fructus. Binæ species hujus generis cognitæ sunt; 1. *Caryophyllus aromaticus* foliis subsessilibus acutis; hæc est arbor officinalis. 2. *Caryophyllus spirius* foliis petiolatis obtusis; Le faux Geroslier, SONNERAT Nouv. Gvin. p. 197. t. 120. Habitat in Nova Gvinea, omni aromate carens arbor.

OBS. 5. Statuta, circa caryophyllorum mercaturam observanda, recensuit, & e codice legum Amboinensium extraxit H. DE JAGER (*).

(*) Recusa existant in VALENTINI India literata, p. 447.
seq.

296. CISTUS creticus. LINN. Sp. pl. 738. Mat. m.
263.

Ladanum creticum. ALPIN. Exot. 89. t. 88.
Pharm. LADANI Gummi.

Locus. Creta. Arbuscula.

FORMA. Resina in massa subcylindrica, crassitie pollicis, saepe in spiram torta, solida, dura, sublapidea, ponderosa, homogenea, sicca, opaca, fusca, in frusta secta & luci exposita subsplendens atomis micantibus, sparsis.

PROPR. Odor balsamicus, gratus; sapor debilis, balsamicus; masticata haec resina inter dentes dura, friabilis, comminuitur, arenulosa sentitur, non solvitur. Ignis flammæ admota accenditur, subdestillat, flagrat: flamma vivida, fumante, fuliginosa, grato & balsamico odore, relicta carbonibus, non inquinantibus. In cochleari ferreo super ignem liqueficit, & odorem spargit gratum. Solvitur in spiritu vini, nequicquam in aqua. Simplici aquæ infusa haec resina cum digestione, odorem aquæ communicat, idque præcipue si destilletur, unde fit aqua stillatitia fragrans, cui supernat oleum essentiale fragrans, residuo remanente sub forma resinæ pæne inodoræ. In oleis non solvitur, sive sint expressa seu stillatitia, verum tingit olea haec sub digestione colore rubro-brunneo.

VIRTUS: roborans, stomachica, resolvens.

USUS: externus.

OBS. Ladanum multum arenulosi immixtum habet, partim fraude, partim ventorum injuria. Exsudat haec resina præcipue e foliis fruticis, & ab incolis, teste BELLONIO, colligitur diebus canicularibus, ardente sole, unde mollescit. Utuntur vero hi ad collectionem lingulis coriaceis, quibus vibratis adhæret dicta resina, cul-

cultris postmodum abradenda. Pura resina ad nos rassisime fertur. Illa minus dura, plastica, agitatione inter digitos sensim mollior fit, colore est nigricante, odore validiore.

ORDO D'IGYNIA.

297. PÆONIA officinalis. LINN. *Sp. pl.* 747. *Mat.*
m. 267. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 6.

Pæonia mas. LOBEL. *Icon.* 602. BLACKW. *Herb.*
t. 245.

Pœonia femina. BLACKW. *Herb. t. 65.* LOB.
Hist. 391.

Pæonia promiscua s. neutra. LOB. *Hist. 390.*
Pharm. PÆONIÆ Radix, Flores, Semina.
Locus. Alpes Helvetiæ. Colitur ubique in hor-
tis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix* majuscula, informis, sub-
ramosa, breviuscula, extus rubra, *parenzymate*
incarnato, striis radiantibus; tuberosa: *tuberi-*
bis e radice exeuntibus, pedunculatis, fusiformi-
bus, palmaribus vel ultra, saepe spithamæis, sim-
plicibus vel proliferis, saepe moniliformibus, ex-
tus dilute rubicundis, læviusculis, *parenzymate*
albo, carnosæ, solidæ. *Flores* pleni. *Bractæ* 2,
foliaceæ, calyci subjectæ & approximatæ. *CAL.*
Periantb. 5-phyllum: foliolis ovatis, obtusis, ner-
vosis, minutim villosis, concavis, patentibus, in-
æqualibus. *COROLLA* plena, hemisphærica,
magnitudine pugni, kermesina: *petalis* lessili-
bus, numerosis, cuneiformibus, obtusis, subin-
cisis. *STAMINA* in petala mutata. *PIST.* *Ger-*
mina 2 vel 3, ovato-oblonga, tomentoso-sericea,
alba,

alba, angulata. *Styli* nulli. *Stigm.* lanceolata, compressa, subcarnosa, kermesina. *Semina* ovata, magnitudine seminis Pisi, cincta cortice nigro-fusco, nitido; *parenzymate* cotyledoneo, solido, extus villoso, post sectionem transversalem notato punto centrali.

PROPR. *radicis* rec. *Odor* gravis, narcoticus, floribus congruens; *sapor* acriusculus; *tuberum* rec. *odor* fortis, fere Raphani, sed simul graviusculus, hircino-narcoticus, cum floribus conveniens. *Sapor* dulcescens, acris instar Raphani: acrimonia fugaci. Sub refectione tuberum rec. in taleolas; culter corripitur, uti solet ex refectionis malis citreis. *Tubera cocta* mollescunt, *masticata* tenera, sed insimul firmiuscula, odore alimentari, aliquantum tamen hircino, sapore dulcescente, ex Nasturtio participante. *Florum* recent. *odor* narcoticus; *sapor* narcoticus, amaricans; *masticati* teneri, saliva rubro-violacea.

VIRTUS: anodyna, antispasmodica.

USUS. Epilepsia, Ecclampsia, Convulsiones.

OBS. 1. *Infus.* aquos. tuber. *radicis* rubicundum, odore narcotico, sapore dulcescente, styptico; vitr. martis fusco-violaceum. *Infus.* *florum* pulchre rubro-kermesinum, leniter stypticum, gratum tamen, odore florum, cum vitr. martis nigrescit; cum spiritu vitrioli, succo citri congelato atque aceto vini color sangvineus exsurgit; cum oleo Tartari viridi-lutescit, nempe infusum e floribus rec., ex siccatis vero fuscescit. *Infusum* *seminum* siccatur. limpidiuscum, subfatum; vitr. martis subobscurum.

OBS. 2. Ex tuberibus Pæoniæ recentibus, eadem encheiresi ac cum tuberibus Solani tuberosi, obtinetur *Amylum* album, mite, sub elixatione in aqua gelatinescens, bene glutinans.

OBS. 3.

OBS. 3. De Pæonia scripsit Joh. AUG. HÜNERWOLFF.
(*) Is radicis Pæon. libr. I destillavit, & obtinuit aquæ spirituos. unc 6, & olei drachm. 3. Sal fixum in capite mortuo accepit. Laudat radicem Pæoniæ, præcipue in epilepsia, ecclampsia infantili, tussi convulsiva.

ORDO TRIGYNYIA.

298. DELPHINIUM Consolida. LINN. Sp. pl.

748. Mat. m. 268.

Consolida regalis. CAMER. Epit. 521.

Flos regius. DODON. Pempt. 252.

Pharm. CONSOLIDÆ REGALIS Herba, Flores.

Locus. Europa, in agris. *Annuum.*

FORMA. rec. *Radix* filiformis, fibrillosa. *Caulis* tères, pubescens, subbipedalis, erectus, superne ramosus. *Rami* alterni, patentes. *Folia* alterna, pinnato-multifida: laciniis linearibus, acutis, minutim pubescentibus; inferioribus petiolatis; superioribus subsessilibus. *Racemus* terminalis, nudus. *Braetæ* solitariæ, linearisubulatae, ad exitum pedunculorum solitariæ, sed in pedunculis oppositæ. *CALYX* nullus. *COROLLA* violacea. *Petala* 5, ovata, acutiuscula, patentia, æqualia, subtus minutim pubescentia, linea longitudinali; supremum basi productum in cornu filiforme, rectum, obtusum, cinerascens, patens. *Nectarium* monophyllum, dilutius violaceum, concavum, compressiusculum, antice margine utrinque auriculato, rotundatum, apice ere-

(*) *Anatomia Pæoniæ.* Arnstedi 1680.

erectum, obtusum, bifidum, fauce striata, basi cornutum: cornu petali supremi cornu intruso. *STAMIN.* Filam. plurimæ, alba, inferne plana, ciliata, superne subulata, longitudine nectarii, coniventia, erecta. Antheræ luteæ, subrotundæ, erectæ, obtusæ, compressæ, didymæ, margine pubescentes. *PIST.* Germen cylindricum, glabrum, viridescens. *Stylus cylindricus*, albus, staminibus brevior. *Stigma obtusum.*

PROPRIET. rec. *Odor debilis, aphrodisiacus.*
Sapor amarus.

VIRTUS.

USUS.

OBS. *Infus.* aquos. corollæ recentis pulcherrime cæruleo-sapphirinum, americanæ; cum spiritu vitrioli & succo citri congelato rubro-purpurascens; cum oleo tartari p. d. purpureo-viridescens; cum aceto vini gall. non demutatum, verum colore dilutum; cum vitr. martis nigrescens. Sub infusione petala non decolorabantur. Si infusum cito paratur, brevi infusione, color cæruleus ab acidis fere omnibus deletur.

299. DELPHINIUM Staphisagria. LINN. *Sp. pl.*
750. *Mat. m. 269.*

Staphisagria. DOD. *Pempt. 362.* BAUH. *Hift. 3.*
p. 641. BLACKW. *Herb. t. 265.*

Pharm. *STAPHISAGRIÆ Semina.*

Locus. Europa australis, Virginia. *Bienne.*

FORMA. *Semina* majuscula, angulata, tetragona, sœpe trigona, basi truncata, apice acutiuscula, incurvata, dorso plano-convexa, antice carinata, undique rugosa punctis excavatis; *parencymate* constante ex nucleo albido.

PRO-

PROPR. sicc. Odor foetidus; sapor intense amarus, acris, nauseosus, diu inhærens; mastica:ta fauces rodunt.

VIRTUS: vomitoria, draſtico, inflammans, venenata, phthiriaca.

USUS: externus; Pediculi, Scabies, Ulcera fungosa.

OBS. *Infusum aquos.* rubrum, odore foetido, sapore intense amaro, nauseoso; vitr. martis adjecto color sibi constat.

300. ACONITUM Napellus. LINN. *Sp. pl.* 751.

SCHREB. *Mat.* m. 291. SCHVENCK. *Gewaff.*

308. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5.

Aconitum. GARID. *Aix.* 7. t. 2.

Napellus. DODON. *Pempt.* 439.

Pharm. ACONITI Herba, Extractum.

Locus. Virginia, Helvetia, Svecia, Gallia. Conseritur in hortis. *Perenne.*

FORMA. rec. *Caules* plures ex una radice, tripedales vel ultra, erecti, teretiſculi, subangulati: angulis solitariis, obſoletis, e dorſo petioli decurrentibus, inferne glabri, ſuperne minutim pubescentes, ſimplices. *Folia* alterna, petiolata, utrinque glabra, ſupra obſcure viridia, lineata, ſubtus pallidiora, circumſcriptione rotunda, 5-partita: lobis cuneiformibus, bitrifidis, inciſis, laciniis mucronatis. *Petioli* glabri, ſubtus teretes, ſupra concavi. *Racemus* terminalis, elongatus, erectus, inferne compositus, foliiferus, floribus pedunculatis, erectis. *Bracteæ* lineari-lanceolatae, acutæ, minutim ciliatae, ad pedunculos ſolitariae, illisque longiores, glabriſculæ, ad flores vero oppofitæ. *Pedunculi* teretes, pubescentes, clavati. *CALYX* nullus. *COL-*

ROLLA cærulea, pubescens. *Petala* 5, secunda, subimbricata; quorum *supremum* galeatum, triangulare, dorso obtuso-rotundatum, erectum, apice obtusiusculum, patens, antrorsum spectans, latere utrinque compressum, notatum nervis 4 arcuatis; *lateralia* 2 opposita, obovata, plana, superne venosa, subconniventia, galeæ intrusa, latere interiore hirta; *infima* 2 approximata, imbricata, minora, ovali-oblonga, obtusa, deorsum spectantia. *Neetaria* 2, in galea recondita, cærulea, æqualia, filiformia, antice canaliculata, apice tubulosa, incurvata, obtusa, deorsum hiantia: ore obliquo, biloculari, labio producto, sublineari, emarginato, recurvato. *STAM.* *Filam.* plurima, inferne linearia, albida, carinata, glabra; superne subulata, purpurea, reflexiuscula, pilosa, corolla duplo breviora. *Antb.* subrotundæ, erectæ. *PIST.* *Germina* 3, viridia, glabra, subcylindrica, longitudine fere staminum, desinentia in *Stylos* breviuscilos purpureos. *Stigmata* obtusa, compressa, recurvata.

PROPRIET. recent. *Odor* fortis, herbaceus; *Sapor* herbaceus.

VIRTUS; pellens, sudorifera, diuretica, subvertiginosa; *recens* venenata.

USUS: Rheumatismus, Arthritis, Malum i-schiadicum.

OBS. I. *Succus expressus* foliorum colore obscure rufo, ingrato odore, sapore acri leniterque styptico. Hic succus, caute inspissatus in melliginis consistentiā, odore & sapore convenit cum *succo* ^{extra} expresso, sed subsalsus insimul est. Hoc *Extractum* solvitur in aqua, solutione brunnea, & addito vitriolo martis fuscescit.

OBS. 2.

OBS. 2. Plurima experimenta cum Extraēto Aconiti in Svecia instituta sunt. Bonum sane effectum sæpius experti sumus in rheumatismis, febribus intermittentibus protractis cum statu leucophlegmatico, malo ischiadicō, hæmorrhagia uteri chronicā, &c., dosi a gr. 1 ad ferup. §, bis vel sæpius de die propinata. In quartanis compluries præscripsi hujus extraēti gran. 5 quovis bithorio, & cl. HENR. Jos. COLLIN (*) ad drachmam § illud exhibuit quotidie. Sed quod etiam in parca dosi effectum præstiterit, docuit cl. C. M. BLOM (**). Consultum semper est, a dosi parca incipere, ubi recordamur, quam funestos effectus edidit planta recens manducata, cujus rei exempla adduxerunt auctores (***)�.

OBS. 3. De Aconito eleganter egit ill. ANT. STÖRCK (†), pluribus casibus usum ejus declarans, & confirmavit cl. S. A. REINHOLD (††). Plantæ figura, a laudato STÖRCK adjecta, satis indicat, hunc virum experimenta sua instituisse cum Aconito Cammaro LINN., quæ planta, dum spontanea colligitur, videtur acrior esse Napello, pulvis enim foliorum Cammari lingvæ imprimit ardorem inhærentem cum dolore, prout scribit STÖRCK, quem effectum ex Napello non observavi.

OBS. 4. Radicis sicc. Aconiti Napelli grana 15, cani data, strangulationem induxerunt, purgationem alvi, summam debilitatem, subsequente vomitu copioso, quem exceperunt convulsiones totius corporis & singultus;

H h 2

tan-

(*) Observat. p. 2. p. 160.

(**) K. Vetensk. Acad. handl. 1773. p. 258.

(***) Cfr. DODON. Pempt. l. c. MORZUS in Vetensk. Acad. handl. 1739. v. 1. p. 41.

(†) Libell. p. 69. seq.

(††) Diss. inaug. de Aconito Napello. Argentor. 1769.

tandem tamen convaluit. Folia & semina recentia a-
lium canem non moverunt; WILL. COURTEN (*).

301. ACONITUM Anthora. LINN. *Sp. pl.* 751. *Mat.*

m. 270. KNIPH. Bot. orig. cent. 4.

Anthora. MILLER Figur. t. 12. CAMER. Epit.
837. DOD. Pempt. 440.

Pharm. ANTHORÆ Radix.

Locus. Alpes Europææ. Perenne.

FORMA. rec. Radix carnosa, cylindrico-fusi-
formis, angulata, cinerea, digitalis, undique ad-
spersa fibris; parenchymate albo, post sectionem
transversalem notato punctis 12, in circulum am-
plum dispositis. *Siccata* radix duriuscula.

PROPR. rec. Odor vix ullus; sapor amarus,
acris; masticata fauces corrodit, diuque inhæ-
ret; sicc. odor debilis; sapor acriusculus, amari-
cans, faucibus inhærens, tandem nauseoso - dul-
cescens.

VIRTUS: suspecta.

USUS.

OBS. Infusum aquosum lutescens, sapore amari-
canti - dulcescente; cum vitriolo martis fulcescit.

ORDO PENTAGYNIA.

302. AQUILEGIA vulgaris. LINN. *Sp. pl.* 752.

Mat. m. 272. KNIPH. Bot. orig. cent. 5.

Aquilegia sylvestris. GARID. Aix. t. 8.

Aquilegia. BLACKW. Herb. t. 409.

Aquileja. DODON. Pempt. 181.

Pharm.

(*) *Philosop. Transact. vol. 27. p. 499.*

Pharm. AQUILEGIAE Herba, Flores, Semina.

Locus. Europa. Colitur in hortis. *Perennis.*

FORMA. *rec.* *Caulis* erectus, teres, obsolete digonus, glaber, superne ramosus, pedalis vel ultra. *Rami* alterni, erecti. *Folia* alterna; *radicalia* longius petiolata, triternata; *caulinia* vaginis petiolata, ternata: foliolis ovatis, petiole-latis, tripartitis: laciiniis cuneiformibus, venosis, supra glabris, subtus glaucis, glabris, trifidis s. lobatis, obtusis; *suprema* ternato-palmata, sessilia; lobis ovato-lanceolatis, acutis, integris. *Panicula* florum terminalis, simplicissima, pedunculis alternis, unifloris, pubescentibus, cernuis. *CAL.* nullus. *COR.* dilute violacea, minutim pubescens. *Petala* 5, ovata, acuta, æqualia, patentia, minutim ciliata, pubescentia, plana, basi subtus concava. *Nectaria* 5, æqualia, tubulata, turbinata, basi sensim attenuata in cornu incurvato-hamatum, obtusum, dependens, superne oris labio erecto, concavo, obtuso, petalis breviore; margine axis receptaculo annexa. *STAM.* *Filam.* plurima, membranacea, alba, subulata, basi linearia, longitudine Nectarii. *Anth.* linear-i-ovales, obtusæ, compressæ, erectæ, brunnæ. *PIST.* *Germina* 5, supera, cylindrica, parallela, conniventia, villosa, desinentia in *Stylos* subulatos, erectos, staminibus paullo longiores, glabros. *Stigmata* obtusa. *Receptac.* globosum, striatum: striis longitudinalibus, e punctis constantibus. *Capsulæ* 5, conico-cylindricæ, conniventes, erectæ, mucronatae, cinerascentes, pubescentes, bivalves, uniloculares. *SEM* parvula, nigra, nitida, ovata, dorso convexa, versus apicem bicarinata, antice marginata.

PROPR. rec. herbæ: Odor validiusculus, sub-ingratus; sapor subamaricans, ingratus, nautes-ofus. Florum: odor debilis; sapor imitis, submucilaginosus, subdulcescens. Seminum: odor vix ulcus; sapor submucilaginosus.

VIRTUS.

USUS.

OBS. *Infus.* aquosum *herbæ* tamquam potus Theræ subamaricans, herbaceo sapore; vitr. martis parum fulcescit, præcipitatur. *Infus.* *florum* e petalis violaceis recentib. pulcherrime cæruleum, odore debili, sed grato, sapore subdulcescente; cum succo citri congel. rubro-violaceum; cum Spiritu vitrioli pulchre rubrum; cum oleo tart. p. d. viride; cum vitr. martis obscuratur. Si saccharum l. a. huic infuso additur, fit *Syrupus* pulcherrimus, atque idem gratus. In hunc finem feligantur corollæ cæruleæ, petala & nectaria integra infundantur, non contusa, quia tunc color viridescit; recentia erunt, non siccata, color enim a siccatis derupatur; infusio erit citior, nec protracta, namque color a protracta infusione alteratur, nimis violaceus fit, & non cæruleus, ut oportet. *Infusum seminum* colore aqueo est, odore subfatto, sapore debili; cum vitriolo martis color persistit.

303. NIGELLA sativa. LINN. *Sp. pl.* 753. *Mat.*

m. 271. MILL. *Figur.* t. 187. f. 1. KNIPH.

Bot. orig. cent. 7.

Melanthium sativum. CAMER. *Epit.* 551. DOD.

Pempt. 301.

Melanthium s. Nigella romana odora. LOB.

Icon. 740.

Pharm. *NIGELLÆ Semina.*

Locus. Oriens. *Annua.*

FOR-

FORMA. Semina trigona, compressiuscula, apice obtusa, basi obliqua, undique rugolo-scabra, nigra.

PROPR. Odor fragrans; sapor aromaticus, in Sassafras incidens.

VIRTUS: errhina, emmenagogia, lac provocans.

USUS.

OBS. 1. Infus. aquos. rubicundum, odore & sapore semenum; vitriolum martis colorem non alterat.

OBS. 2. In Oriente hæc semina pani insperguntur doméstico, uti umbellatorum semina apud nos; Fors-skål.

ORDO POLYGYNIA.

304. ILLICIUM anisatum. LINN. *Sp. pl.* 664.
Mantiss. 2. 167.

Badianitera, LINN. *Mat. med.* 510.

Skimmi. KÆMPF. *Amœn.* 880. t. 881.

Pharm. ANISI STELLATI Fructus.

Locus. Tartaria, China. *Arbor.*

FORMA. sicc. *Fructus* pollicaris, infra rugosus, supra glaber, 8-partitus: *Capulis* stellæ instar in orbem dispositis, ovatis, compressis, rigidis, duriusculis, fragilibus, unilocularibus, superne hiantibus, monospermis. *Semina* majuscula, ovata, compressiuscula, utrinque obtusa, hilo in apice, dorso conyexa, antice carinata, undique nitida, duriuscula, fragilia; *nucleo* cotyledoneo, sordide albido.

PROPR. sicc. *Capulæ*: *Odor* Anisi, fortis;

sapor Anisi, dulcescens, gratus; *seminum* cortex anisatus, capsulis debilior. *Nucleus* oleosus, odore & sapore valido Anisi; *masticatus* pinguisculus.

VIRTUS: pectoralis, carminativa, diuretica.

USUS. Tussis.

OBS. 1. *Infusum* aquos. limpidum, fragrans, aromaticum, sapore Anisi fortiore, calidiore; a vitri martis obscuratur. *Decoctum* seminum turbidum, odore anisato, sapore consimili. *Aquam still.* fragrantem dat hic fructus, cum oleo essentiali liquido, fragrantissimo, Anisum spirante. *Nuclei*, frigide expressi, *oleum expressum* dant, grate fragrans. Cum spiritu vini destillatus hic fructus, spiritum gratum, dulsecentem largitur.

OBS. 2. *Illicium Floridanum* FORSTER *Flor. Amer. septentr.* p. 22. cum *Chinensi* in *fragrantia* convenit. Crescit sua sponte in utraque Florida, locis depresso, uliginosis, vel ad ripas fluviorum. Vim hiemis bene sustinet. Folia grate amaricantia sunt, & cortex mucilaginosus; ELLIS (*).

305. ANEMONE Hepaticá. LINN. *Sp. pl.* 758.

Mat. m. 277. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 6.

OEDER *Icon.* t. 610.

Trifolium aureum. DOD *Pempt.* 569.

Hepaticæ nobilis. BLACKW. *Herb.* t. 207.

Hepaticum trifolium. LOB. *Hist.* 496.

Pharm. HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.

Locus. Europa, Virginia, in nemoribus. *Perennis.*

FORMA. rec. *Folia* radicalia, annotina, petiolata, cordato-trilobata, utrinque glabra, supra lucidiuscula, margine pilosa, pollicaria, magis la-

(*) *Pbilof. transact.* v. 60. p. 528.

lata quam longa: lobis ovatis, obtusis. *Scapi* radicales, erecti, teretes, lanuginosi, nudi, longitudine petiolorum, uniflori. *CAL.* *Involucrum triphyllum*: foliolis ovatis, acutiusculis, villosis, viridescentibus, a corolla paullulum remotis. *COR.* *Petala* 6 s. 8, ovalia, obtusa, patentia, supra cærulea, subtus albido-cærulescentia. *STAM.* *Filam.* plurima, albida, erecta, corolla duplo breviora, recepraculo inserta. *Antheræ* ovaæ, tetragonæ. *PIST.* *Germina* plurima, cylindrica, villosa, pilis adpressis nitentia, staminibus breviora. *Styli* nulli. *Stigmata* obtusa, planiuscula, obliqua, fulco longitudinali.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* debilis. *Planta* recens, masticata, acrimoniam levem prodit.

VIRTUS: adstringens.

USUS.

OBS. 1. *Infus.* aquo*florum* sicc. rubrum, odore & sapore debili; vitr. martis fusco-nigrescit; hujus infusi guttae 25, cum aquæ puræ unc. $\frac{3}{4}$ & vitr. martis, colorem dilute violaceum stiterunt.

OBS. 2. Ex omnibus hujus generis speciebus *Hepatica* mitissima est.

306. ANEMONE pratensis. LINN. *Sp. pl.* 760.

OEDER *Icon.* t. 611.

Pulsatilla nigricans. - STÖRCK *Libell.* p. 1, t. 1.

Pulsatilla vulgaris saturatiore flore. CLUS. *Hist.*

i. p. 246.

Pulsatilla altera. DOD. *Pempt.* 430.

Pharm. *PULSATILLÆ NIGRICANTIS* Herba, Extractum.

Locus. Europa, in campis apricis. *Perennis.*

FORMA. *Caulis* solitarius, (vel etiam plures ex una radice) simplicissimus, erectus, dodrantalis

Lis, striatus, subangulatus, hirsutus, subnudus. Folia composita, subtus pilosa; laeiniis linearibus, acutis; radicalia bipinnata, longius petiolata; caulina sessilia, opposita, in medio caulis sita, magis hirsuta. Pedunc. terminalis, hirsutus, nudus, uniflorus. Flos nutans. CAL. nullus. COR. campanulata, polypetala, sordide rubro violacea, extus hirsuta, intus glabra: petalis ovato-oblongis, obtusis, venis pictis. STAM. Filam. plurima, setacea, corolla breviora. Anth. didymæ, erectæ, luteæ. PIST. Germ. plurima, subulata, albido-hirsuta. Styli setacei, erecti, purpurascentes, pubescentes; longitudine corollæ. Stigmata obtusa, subcapitata, fusca.

PROPR. rec. Odor vix ullus. Sapor acris, inhærens. Masticata fauces & lingvam corredit. Siccat. sapor primum herbaceus, masticata tandem acris, acrimonia diu inhærente, etiamsi fauces aqua frigida eluantur.

VIRTUS: diuretica, stimulans.

USUS.

OBS. I. Infusum aquosum colore saturato, rubicundo, sapore herbaceo, leviter acriuscule; vitriolo marinis fuscо-nigrescit. Extractum e succo inspissato paratur. Sub inspissatione succi in extractum vapor, qui exsurgit, perquam acris est; cuius rei exemplum mecum communicavit cl. CAROL. SAUR (), in pueru quodam, cui, inter agitandum cum spathula succum sub evaporatione, palpebræ ita ex vapore corripiebantur, ut rumerent atque rubescerent, cum obnubilatione visus; quæ tamen mala post nonnullos dies sponte evanescebant. Aqua stillat. acris.*

OBS. 2.

(*) In Litteris.

OBS. 2. Ill. STÖRCK Pulsatillam nigricantem in oculorum affectionibus commendat, pluribusque casibus utilitatem ejus adstruit. Extractum copiose dedi ægrotis, oculorum morbis, imprimis amaurosi & panno laborantibus, sed ingenuo profiteor, me nullum effectum inde observasse. A parva dosi semper incepi, & ascendi ad dosin satis magnam, sed nec hæc infirmos movit vel juvit.

307. ANEMONE nemorosa. LINN. Sp. pl. 762.
Mat. m. 275. KNIPH. Bot. orig. cent. 1. OEDER Icon. t. 549.

Ranunculus sylvarum. CLUS. Hist. 247.

Anemone 5. DOD. Pempt. 432.

Pharm. RANUNCULI ALBI Herba.

Locus. Europa in nemoribus, locis elevatis.

Perennis.

FORMA. rec. *Caulis* palmaris, saepe spithameus, erectus, teres, subpubescens, nudus, apice foliosus. *Folia* terna, petiolata, tripartita: lobis lanceolatis, acutiusculis, superne incisis, utrinque glabriusculis, pilis raris adspersis, venosis, margine ciliatis: pilis adpressiusculis, basi glandulosis; exterioribus bifidis; intermedio 3-fido, petiolellato. *Petioli* concavi, purpurascentes, pubescentes, marginibus ciliatis. *Pedunc.* terminalis, intra folia enatus, longitudine foliorum, teres, pilis adpressis villosus, uniflorus, cernuus. *CAL.* nullus. *COR.* nivea, extus basi macula cæruleo-scente. *Petala* 6 vel 7, ovali-oblonga, obtusa, patentia; 3 exteriora extus sordide subcæruleo-scentia. *STAMINA.* *Filam.* plurima, albida, erecta, corolla duplo breviora. *Anth.* ovatae, obtuse, retuse, compressæ, didymæ, erectæ, luteæ. *PIST.* *Germina* plura, oblonga, villosa. *Styli* conici, gla-

glabri, staminibus paullo breviores. *Stigm. acuta*, fusca.

PROPR. rec. Odor debilior; sapor herbaceus, acriis, fauces lingvamque stimulans; *siccatur odor nullus*; sapor herbaceus, acriis, recente débilior.

VIRTUS: *siccatur*, rubefaciens; *recent.* vesicans.

USUS: epispasticus; Tertiana vernalis.

OBS. 1. *Infusum aquosum rubicundum*, americanus, ingratum, acriuscum; cum vitriolo martis fusco-nigrescit. *Aqua stillat.* acriis, subnauseosa, quod singulare est in hujus generis speciebus plurimis.

OBS. 2. Radix & folia recentia deglurita summam angustiam pectoris faciunt; & 30 plantæ, comestæ, letales dicuntur; *GMELIN* (*). Tertianæ vernales sæpe curantur ex epispastico, parato e foliis s. floribus recentibus hujus plantæ contusis, & brachio imposito. Si debito tempore supra cutem remanet, rubescit cutis, & convexiusculus sit locus impositus ex affluentibus humoribus. Tum epispasticum removendum, alias adeo inflammatur cutis, ut post diem unum alterumve in vesicam elevetur, unde ulcer manans, dolorificum, tardissimæ sanationis. Sed si opem ferant hæc epispistica, debent ita dirigi, ut agant dum frigus febrile inciperit. Succus inspissatus herbæ menses pellit.

308. CLEMATIS recta. LINN. Sp. pl. 767.

Flammula recta. ZANNICH. Venez. t. 159.

Flammula Matthioli. CAMER. Epit. 698. CLUS. Hist. 1. p. 124.

Pharm. FLAMMULÆ JOVIS Herba, Flores.

Locus. Austria, Monspelium, in collibus. *Pennis.*

FOR-

(*) *Flor. Sibir.* 4. p. 199.

FORMA. *Caulis* erectus, altior, teres, undique striatus, glaber, superne ramosus. *Folia* opposita, petiolata, pinnata: foliolis oppositis, ova-to-lanceolatis, integerrimis, acutis, subbipollicaribus, supra glabris, subtus nervosis, grossius reticulatis, pube rara adpersis, suberectis. *Umbellæ* florum plures, terminales, subfastigiatæ, strictæ, erectæ, striatæ, glabriuscule; quarum universales vestitæ sunt involucro foliaceo: foliolis pinnatis seu simplicibus; partiales vero nudæ. *CAL.* nullus. *COROLLA* ochroleuca. *Petala* 5, linearis-cuneiformia, obtusa, vix semiunguicularia, minutim villosa, nervoso-venosa, patentireflexa. *STAM.* *Filam.* plurima, subulata, erecta, corolla paullo breviora. *Antheræ* lineares, utrinque canaliculatæ, erectæ. *PIST.* *Germina* plura, subrotunda, villosa. *Styli* barbati, staminibus fere breviores, erecti. *Stigmata* cylindrica, glabra, obtusiuscula.

PROPR. sicc. berbæ: *Odor* debilis; *sapor* herbaceus, acriusculus, diu inhærens. *Recens* acris; *folia recentia masticata* fauces lingvamque rodunt, & diutius in ore retenta, fauces subinflammant.

VIRTUS: pellens, diuretica, sudorifera, saepe alvum movens, (dosi fol. gran. 4 ad scrup. §, bis de die); *rec.* vesicans.

USUS.

OBS. 1. *Infusum aquosum rubicundum*, amaricans, nauseosum; vitriolo martis nigricans.

OBS. 2. De experimentis, quæ cum hac herba instituerunt Vindobonenses, consuli potest ill. A. STÖRCK libellus de *Flammula Fovis &c.* Laudat folia *externæ* in ulceribus sordidis, ichorosis, fungosis, cancerosis, hypersarcosi, carie ossium; *interne* in cephalæa,

do-

doloribus ossium nocturnis, lue venerea, scabie, melancholia (*).

309. RANUNCULUS Ficaria. LINN. *Sp. pl.* 774.

Mat. m. 274. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Chelidonium minus. DODON. Pempt. 261. LOB.

Hist. 325. BLACKW. Herb. t. 51. BAUH. Hist. 3. p. 468.

Pharm. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.

Locus. Europa, in umbrofis, solo pingvirore. Perennis.

FORMA. rec. Radix bulbosa: bulbis fasciculatis, subcylindricis, extrorsum paullulum incrassatis, subpollicaribus, albis, fibris filiformibus, descendenteribus interjectis. Parencrema carnosum, post sectionem transversalem puncto medullari rubicundo. Tota planta subsucculenta. Caulis teres, erectus, glaber, ramosus: ramis oppositis. Folia opposita, petiolata, cordata, obtusa, angulata, utrinque glabra, supra venoso-lineata, lucidiuſcula. Petioli foliis longiores, glabri, supra planiusculi, canaliculati, subtus convexi, basi vaginati, concavi; radicales vagina plana. Pedunculi terminales, ex axilla superiori, teretiusculi, undique striato-angulati, elongati, glabri, uniflori, nudi. CAL. Perianth. triphyllum: foliolis ovatis, obtusis, concavis, submembranaceis, sordide lutescentibus, adnatis, patentibus. COR. lutea, polypetala: petalis 8 vel 10, lanceolatis, obtusis, utrinque attenuatis, calyce duplo longioribus, supra nitidis, patentibus; squama ungvis nectarea ovata, obtusa, parva. STAM. Filam. plu-

(*) Cfr. Stöck libell. de *Pulsatilla nigra &c.* p. 57.

plurima, subulata, lutea, corolla duplo breviora, erecta. *Antheræ* subcylindricæ. *PIST.* *Germina* plurima, subrotunda, in capitulum digesta. *Styli* nulli. *Stigmata* subrotunda.

PROPR. *rec. radic.* *Odor* nullus; *sapor* debilis *Nasturtii*; *masticata* tenera, acriuscula, fauces irritat & iis inhæret; *herbæ*: folia recentia contusa debiliter *Nasturtium* redolent; *sapor* herbaceus, sed fortior, *Nasturtii*, radice acrior. *Herba* cocta mitescit. *Bulbi* cocti molles fiunt instar pastæ. *Siccat.* radix parenzymate est farinaceo, albo, fragili, subfriabili; quæ, *masticata*, in ore fere solvitur, sapore farinaceo; herba sicc, acriuscula, sapore herbaceo, subamaricante.

VIRTUS: *rec. herbæ*: mundificans, antiscorbutica, diuretica. *radic.* nutrita.

USUS: culinaris, Scorbutus.

OBS. 1. *Infusum* aquosum *radicis* sicc, turbidiusculum; vitriolo martis non alteratur. *Infusum* *herbæ* sicc, rubicundum, turbidiusculum, acescens, acriuscum; vitriolo martis fuscescit.

OBS. 2. Inter Ranunculos hæc species minus acris, forte quia planta vernalis; attamen omnis acrimoniae expers non est, quod quidem sapor acriusculus *Nasturtii* indicat, itemque aqua stillatitia primaria, quæ, prout observat GEOFFROY, saporem Sinapios habet, sive folia virentia, sive bulbi destillentur. Coctione itaque mitescit, acri avolante, quare etiam primo vere culinaris est apud pauperes, & in mixtione cum aliis oleraceis, ad jusculta oleracea paranda adhibetur.

OBS. 3. Ex observatione auëtorum, *Ficaria* præstans est ad hæmorrhoides cæcas, interne sumta & externe applicata. Tota planta virens, contusa, coquatur in axungia, quoad siccescat, quod ter repetatur, unde fiat unguentum. Sæpius præscripsi serum lactis, in quo fo-

folia recentia infusa fuere, cum ungvento nominato; sed nullum effectum laudabilem inde vidi.

OBS. 4. Cum Ranunculo Ficaria pluribusque Ranunculi speciebus curiosa experimenta in se ipse instituit cl. CAROL. KRAFF (*).

310. HELLEBORUS niger. LINN. Sp. pl. 783.

Mat. m. 273. KNIPH. Bot. orig. cent. 1. LOBEL. Hist. 388.

Elleborus niger legitimus. CLUS. Hist. 1. p. 274.

Veratrum nigrum 1. DOD. Pempt. 381.

Pharm. HELLEBORI NIGRI Radix.

Locus. Austria, Hetruria, in alpinis. Perennis.

FORMA. sicc. Radix nigro-fusca, subcylindrica, subterulosa, subramosa, undique obfessa fibris filiformibus nigris; parenchymate albido.

PROPR. Tota radix (una cum fibris) acris, nauseosa, leviter amaricans, inhærens. Recens acrior; masticata lingvam acrimoniam obstupefacit; Siccata mitior; in pharmacopolis diu affervata vix acris, nisi diutius masticata.

VIRTUS: rec. venenata, rubefaciens, vesicans; recenter siccatae: emetica, purgans, emmenagogue, antiphthiriaca, sternutatoria; diu conservatae: vix purgans, alterans, diuretica.

USUS: Obstructio mensium; Setaceum pecoribus.

OBS. 1. Infusum radicis rubrum, saturatum, sapore amaro; vitriolo martis fuscescit. Aqua stillatitia acris, purgans. Extractum aquosum propinatur dosi gr 8 - 12 - 20; emesin plerumque movet, in majori dosi sumptum, saepè violentam. E radic. sicc. libr. 6 ob-

(*) Experimenta de Ranunculorum nonnullor. venenata qualitate, horumque externo & interno usu. Vindob. 1766.

obtinentur Extr. aquosi circiter libræ 2. Inter pulvrandum radicem, narium irritantur fibræ adusque sternutationem, quare cautelis opus erit.

OBS. 2. Sectionem cadaveris viri, a sumto extracto Hellebore nigri enecati, ubi ventriculus & intestina inflammatæ erant, describit J. B. MORGAGNI (*).

OBS. 3. Radices Adonidis *verbalis* LINN. Helleboro nigro saepius substituuntur, præcipue apud mercatores Francofurtenses & Hamburgenses, qui e Thuringia & Erfordia eas afferri curant; RUD. AUG. VOGEL (**).

III. HELLEBORUS foetidus. LINN. Sp. pl. 784.

KNIPH. Bot. orig. cent. 12.

Helleborus niger foetidus. GARID. Aix. t. 48.

Veratrum nigrum 3. DOD. Pempt. 382.

Helleboraster maximus. LOBEL. Icon. 679. Hist.

387.

Pharm. HELLEBORI FOETIDI Herba.

Locus. Europa australis, Virginia. *Pereennis.*

FORMA. Caulis breviusculus, perennans, inferne nudus, cicatrissatus vel glabriusculus, superne foliosus; supra folia desinens in *Scapum* subangulatum, atomis adspersum, spithameum, ramosum, squamosum. Rami scapi alterni, erecti. *Folia* congesta, longius petiolata, pedata; foliolis linear-lanceolatis, digitalibus vel palmaribus, superne ferratis, utrinque glabris, supra viridibus, minutim subrugosis, lucidiisculis, venis alternis, obliquis, depresso-lineatis, subtus pallidioribus. Petioli lineares, concavi. *Squamæ* scapi alternæ, ovato-lanceolatae, coloratae, glabræ, acutæ, saepè fissæ in foliola, pollicares vel ultra, erecto-patentes, ad ramos & in pedunculis sitæ. Pedunculi

I i

cu-

(*) *De sedibus & caussis morborum*, t. 2. p. 381.

(**) *Mater. med.* 197.

culi in ramis alterni, elongati, pubescenti-scabriuscui, superne tuberculato-rugosi, erecti, uniflori, bracteis vestiti. *Flores* nutantes. *CAL.* nullus. *COR.* squamis concolor, campanulata, atomis scabriuscua, pentapetala, persistens. *PIST.* 3, pubescentia. *Obs.* Planta, quam descripsi, a solo natali, e Castilia veteri, de promta fuit.

PROPR. Odor foetidus, præsertim plantæ recentis; sapor rec. & sicc. acerrimus, amaricans; *masticata* totum os faucesque corrodit, effectu inhærente, quamvis fauces sedulo eluantur. Siccatione acrimoniam vix deponit.

VIRTUS: emetica, purgans, anthelminthica.
USUS.

OBS. Fide cl. CAROLI BISSET hanc plantam excito. Periculum ipse nunquam feci, laudatus autem vir Helleborum hunc, in vermis expellendis, nunquam se fellisse tradit. Dosis erit folior. recent. drachma 1, in decocto; sed si folia siccata sumantur, grana 15 sufficere possunt pueris 5 vel 6 annorum. In majori dosi emeticam & purgantem vim exerceat. Usus per non nullos dies consecutivos continuandus. Succus expressus, ope sacchari in syrupum redactus, commodum erit remedium, si cochleare unum mane & vesperi propinetur; BISSET (*). Sed ob ingentem plantæ acrimoniam cum illa caute agendum. A parca dosi incipere juvat, ne sensibilia subiecta nimis moveat.

CLAS-

(*) *Essay on the medical constitution of great Britain*, p. 329.

CLASSIS XIV.
DIDYNAMIA.
ORDO
GYMNOSPERMIA.

312. **A**JUGA pyramidalis. LINN. *Sp. pl.* 785. *Mat.*
m. 306.

Bugula. DODON. *Pempt.* 135.

Bugula Consolida media. BLACKW. *Herb.* t. 64.

Phyllochnois. RENEALM. *Specim.* 125.

Bugula quibusdam Prunella. LOBEL. *Hist.* 252.

Consolida media. LUDW. *Ectyp. p. 4. t. 8.*

Pharm. CONSOLIDÆ MEDIAE Herba.

Locus. Europa, in pratis. *Biennis.*

FORMA. rec. *Caulis* digitalis, simplex, erectus, tetragonus, a basi ad apicem undique obsestus foliis & calycibus floriferis s. fructiferis. *Ramus teres*, procumbens, ab ima basi exiens, inferne nudus, superne foliosus & florifer, caule duplo brevior. *Folia* opposita, ovata, obtusa, villosa; intima majora, petiolata, crenata, nervoso-lineata, petiolis latis, linearibus; superiora subæqualia, sessilia, alternatim opposita, superne tricrenata, a medio revoluta; suprema purpurea. *Flores* verticillati, seni, sessiles; tota planta ab imo ad summitatem florifera. *CAL.* Perianth. monophyllum, subturbinatum, 5-fidum: laciniis lanceolatis, acutis, ciliato-pilosis, erectis, æqualibus. *COR.* ringens. *Tubus* cylindricus, glaber, albus; calyce longior, superne striis cæruleis. *Labium*

superius brevissimum, album, bifidum, pilosociliatum; inferius cæruleum, striis albidis pictum, trifidum: laciniis 2 lateralibus ovatis, obtusis, erectis, extus pilosis; intermedia obcordata, patente, subtus pilosa. STAM. Fil. 4, subulata, alba; quorum 2 breviora, longitudinē labii superioris. Anth. ovatæ, purpureæ. PIST. Germen 4-fidum, obtusum, glabrum. Stylus subulatus, albidus, longitudine staminum. Stigma cernuum, acutum, bifidum.

PROPR. rec. Odor debilis, graviusculus; sapor debilis, subingratus, tum americans.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. 1. Infusum aquosum colorem habet potus Theæ; cum vitriolo martis fuscefcit.

OBS. 2. Non magna foret jaætura, si ex officinis prorsus abesset hæc planta, quæ dudum obsolevit.

313. TEUCRIUM Chamæpitys. LINN. Sp. pl.

787. Mat. m. 287. KNIPH. Bot. orig. cent. 8.
Chamæpitys prima. DOD. Pempt. 46.

Pbarm. CHAMÆPITYOS Herba.

Locus. Europa australis, Virginia, Oriens. Annuum.

FORMA. Radix cylindrica, descendens, subramosa, fibrillosa. Caulis plures ex una radice, erecti, sæpe subprocumbentes, tetragoni, pilis albis hirsuti (in spontanea magis quam in culta), spithamæ vel ultra, ramosi. Rami pauciores, oppositi, cauli conformes. Folia ad genicula, opposita, sessilia, linearia, hirsuta (in culta subglabriusculta, exceptis summitatibus), pollicaria, in medio fissa in 3 laciniis lineares, acutiusculas, foliis conformes; suprema congesta, erecta. Flores axil-

lares, bini, oppositi, subsessiles. *CAL.* Perianth. 1-phyllum, ovato-turbinatum, pilosum, 5-fidum: laciniis linear-lanceolatis, acutis, erectis. *COR.* ringens. *Tubus* calyce longior, pubescens, subcylindricus, erectus. *Labium superius* parvum, bifidum, obtusum, venis cœruleis pictum; *inferius* elongatum, bifidum, obtusum. *STAM.* didynamia, versus labium superius flexa. *PIST.* Germen 4-fidum. *Stylus* setaceus, staminibus longior. *Stigma* acutum.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, debilior, cephalicus; *sapor* amarus, aromaticus, in Rosmarinum incidens.

VIRTUS: tonica, stomachica, emmenagoga, diuretica, resolvens.

USUS. Arthritis, Podagra.

OBS. 1. *Infusum* aquos. rubicundum, amarum; ex addito vitriolo martis fuscescit.

OBS. 2. Cl. JOHN CLEPHANE (*), inquirens in originem & antiquitatem pulveris illius amari, quo Dux PORTLAND utebatur contra arthritidem, ostendit, præx in fuisse, antiquissimam, & inde a GALENI temporibus moris fuisse, arthritidi podagræque amaris occurere. Formula Pulveris Portlandici hæc est: Rx. Rad. Aristoloch. rotundæ, & Gentianæ, Herb. Chamæpityos, Chamaedryos & Centaur. min. ana p. æ. Mr. f. pulvis, ejus drachma 1 quovis mane sumenda per primum trimestre; postinde diminuenda dosis, ita ut $\frac{3}{4}$ drachmæ per secundum propinentur; sed per bina insequentia trimestria non amplius opus erit quam drachma $\frac{1}{2}$ quovis mane. Exantlato sic anno uno, expediet drachmam $\frac{1}{2}$ quovis altero die, per integrum subsequentem annum, dare. Agit hic pulvis lente, sed secure, & ex mente cl. CLEPHANE curam perficit intra biennium.

314. TEUCRIUM creticum. LINN. *Sp. pl.* 788.
Mat. m. 286.

Rosmarinum Stœchadis facie. ALPIN. *Exot.*
103. t. 102.

Pbarm. POLII CRETICI Herba.

Locus. Creta, Ægyptus. Suffrutex.

FORMA. *Caulis* fruticosus. *Rami* simplices, tetragoni, albo-tomentosi, erecti. *Folia* ad genicula, opposita, linearia, subfessilia, pollicaria, integerrima, supra viridi, glabra, subtus albo-tomentosa, patentia; inferiora obtusa; superiore angustiora, acutiuscula. *Racemus* subspicatus, terminalis, nudiusculus, floribus ternis, breviter pedicellatis, erectis. *Foliola* racemi linearia, opposita, floribus breviora. *CAL.* Periantb. 1-phyl-lum, turbinatum, albo-tomentosum, 5 fidum: laciniis lanceolatis, acutis. *COROLLA* Teucrii, calyce paullo longior. *STAMINA* didynama, filiformia, corolla longiora, exstantia. *PIST.* Germen 4-fidum. *Stylus* filiformis, staminum vix longitudine. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, cephalicus; *sapor* amarus, leniter aromaticus.

VIRTUS: tonica, stomachica.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. rubicundum, amarum; vitriolo martis fusco-nigrescit.

315. TEUCRIUM Marum. LINN. *Sp. pl.* 788.

Mat. m. 285. KNIPHOF Bot. orig. cent. 3.

Marum syriacum vel creticum. PARKINS. *Theatr. 13. BLACKW. Herb t. 47.*

Marum Cortusi. BAUH. *Hist. 3. p. 242.*

Marum verum. LUDW. *Edtyp. p. 7. t. 14.*

Pbarm. MARI VERO Herba.

Lo.

Locus. Valentia. Colitur in frigidario apud nos. *Suffrutex.*

FORMA. *rec.* *Caulis* fruticosus, spithameus, pedalis, teretiusculus, subdistortus, ramosus. *Ramuli* oppositi, minutim tomentosi, albidi, erecti, geniculati. *Folia* opposita, ad genicula, petiolata, ovata, acuta, integerrima, subcarnosa, supra viridia, vix pubescentia, subtus minutim tomentosa, vix semiunguicularia, persistentia. *Racemi* florum in ramulis terminales, subsecundi, floribus brevius pedicellatis, oppositis, axillariibus. *CAL.* *Perianth.* 1-phylum, tubulatum, subincurvatum, supra basi gibbum, hirsutum, 5-fidum: laciniis ovato-acutis, erectis, subæqualibus. *COR.* 1-petala; *Tubus* calyce paullo longior, pallidus, incurvus, utrinque compressus; *Limbus* ringens, hirsutus, unilabiatus, deflexus, 5-fidus, violaceus: laciniis 2 inferioribus lanceolatis, acutis, erectis, ciliatis, pubescentibus; 2 intermediis ovalibus, obtusiusculis, patentibus; terminali longe majore, obovata, subtruncata, concava, glabra, patente, subtus pubescente. *STAM.* *Filam.* 4, subulata, erecta; quorum 2 paullo longiora. *Anth.* ovatæ, cernuæ. *PIST.* *Germina* 4, conniventia, minutim pubescentia. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, cephalicus, fortis, balsamicus, bituminosus; *rec.* fortior; *Fri-*
cata folia nares stimulant, & sternutationem movent. *Sapor* intensius amarus, bituminoso-aromaticus.

VIRTUS: nervina, tonica, resolvens, emmenagoga, diuretica, errhina.

USUS. Cachexia, Hysteria, Debilitas nervorum.

OBS. 1. *Infusum aquos.* rubrum, odore & sapore herbae; vitr. maris nigro-fuscescit. *Aqua still.* fragrans. *Oleum still.*, ut tradit LEWIS, volatile est, fragrantissimum, valde pungens.

OBS. 2. Singulari hujus plantæ amore dicitur Felis Catus.

OBS. 3. Hujus plantæ bonum effectum vidi apud ægrotam, quæ apopleætica prolapsa erat ab iœtu capitis contra lapidem, cum e rheda profiliret. Incassum adhibebantur venæsestiones, sanguisugæ, laxantia antiphlogistica &c. sublethargica tamen permanebat ægra usque in tertiam septimanam, quo tempore pulver. Mari veri scrupul. i ei propinabam, quavis quarta hora sumendum; id quod perquam feliciter cessit, siquidem in integrum restituebatur, atque postinde 13 jam annos bona valetudine exegit. Ceterum in resolutione nervorum, post verani apoplexiā, identidem propinavi Marum verum absque emolumento. De Maro hoc disseveruit cl. J. A. DAHLGREN (*).

316. TEUCRIUM Scordium, LINN. Sb. pl. 790.

Mat. m. 289. *OED.* *Icon.* 593. *KNIPH.* *Bot.* orig. cent. 11.

Scordium, CAMER. *Epit.* 588. *DOD.* *Pempt.*

126. BLACKW. *Herb.* t. 475.

Scordeum. LOB. *Hist.* 261.

Pharm. *SCORDII* Herba.

Locus. Europa, in pratis depressis. *Perenne.*

FORMA. rec. cultæ; *Caulis* erectiusculus, tetragonus, spithameus, pubescens, ramosus. *Rami* alternatim oppositi, elongati, longitudine caulis, simplices, cauli conformes. *Folia* opposita, sessilia, pollicaria, linearis-oblonga, obtusa, utrinque

(*) *Diss. de Maro, sub præsid. v, LINNÉ, Upl. 1774.*

que glabra, supra viridia, lineata, subtus glauca, nervis subpubescentia, margine undique grossius serrata, patentia. *Flores* verticillati, seni, pedunculati, erecti. *CAL.* Perianth. 1-phllum, tubulatum, angulato-striatum, pubescens, 5-fidum: laciniis ovato-acutis, erectis; 3 æqualibus; 2 superioribus profundioribus, brevioribus. *COR.* dilute cærulea, ringens, extus minutim pubescens; *Tubus* incurvatus, sordide albicans, longit. calycis, superne paullo crassior. *Lab.* super. nullum, *inferius* patens, oblongum, 5-fidum: laciniis 4 inferioribus, subæqualibus, acutis, erectis, per paria oppositis; terminalis multoties major, subrotunda, concava, integerima, basi obsolete variegata. *STAM.* Filam. 4, subulata, alba, exstantia, erecta; quorum 2 longiora. *Anth.* oblongiusculæ, brunneæ, secundæ. *PIST.* Germ. subrotundum, obtusum, 4-lobum. *Styl.* subulatus, albus, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. sicc. & rec. *Odor* alliato-cephalicus, gravis. *Sapor* amaricans, odori congruens, inhærens.

VIRTUS: antiputredinosa, tonica, diaphoretica, diuretica, resolvens, animalium lac inficiens sapore Allii.

USUS. Gangræna.

OBS. 1. *Infusum* aquosum amaricans, fragrans; vitriolo martis subito nigrescit; hujus infusi guttae 20, aquæ unc. 3 instillatae, addito vitr. martis, colorem stiterunt viridescenti-rubrum. Menstruo aquoso & spirituoso extrahitur, uti congeneres. *Aqua still.* fragrans, aromate herbæ; sed nullum *oleum stillat.* obtinere potuit cl. LEWIS.

OBS. 2. In hac stirpe natura conjunxit odorem Allii cum planta resolvente, mixtione quidem singulari.

317. TEUCRIUM Chamædrys. LINN. Sp. pl. 790.

Mat. m. 288. KNIPH. Bot. or. cent. II.

Chamæpitys altera. DOD. Pempt. 46.

Petit Chêne ou Germandrée. BULLIARD Flor. paris. t. 16.

Chamædrys. LOB. Hist. 260.

Pharm. CHAMÆDRYOS Herba.

Locus. Europa australis, Oriens. Perenne.

FORMA. Caulis erectus, tetragonus, spithameus vel ultra, geniculatus, pubescens, ramosus. Rami oppositi, cauli conformes, subpurpurascentes, erecti. Folia ad genicula, opposita, breviter petiolata, ovali-oblongiuscula, obtusa, inferne abrupte angustata, utrinque pubescentia, margine inciso-crenata, semipollicaria, patentia. Foliola tenera in axillis foliorum, utrinque gemina, cuneiformia, ferrata. Flores laterales, axillares, verticillati, utrinque bini vel terni, pendunculati. CAL. Perianth. 1-phylum, ovato-turbinatum, nervoso-angulatum, pubescens, 5-fidum: laciniis ovato-acuminatis, erectis, ciliatis. Calyces summitatum purpurei. COROLLA Teucrii, violacea, calyce longior. STAM. didynama, corollæ vix longitudine. PIST. Germen 4-fidum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma bifidum, acutum.

PROPR. rec. & sicc. Odor leviter fragrans. Sapor amarus.

VIRTUS: tonica, stomachica, emmenagogica, diuretica.

USUS. Arthritis, Cachexia.

OBS. In officinis nostris Veronica Chamædrys per-
peram pro Teuerio Chamædry substituta fuit.

318. SATUREJA hortensis. LINN. *Sp. pl.* 795.

Mat. m. 284. KNIPH. Bot. orig. cent. 3.

Satureja. ZANNICH. *Venez. t. 290. DOD. Pempt. 288.*

Satureja altera. CAMER. *Epit. 487.*

Pharm. & Culinis SATUREJÆ Herba.

Locus. Europa australis. Colitur in hortis. Annua.

FORMA. rec. *Radix cylindrica, descendens, fibrillosa. Caulis dodrantalis, erectus, subtetragonus, minutim pubescens, purpureo-viridescens, ramosus, diffusus. Rami brachiatim oppositi, erecti. Folia opposita, subsessilia, vix pubescentia, linear-lanceolata, acutiuscula, vix pollicaria, patentia, utrinque adspersa atomis excavatis, subtus instructa punctis subrotundis, majoribus sparsis, supra vero marginalibus, longitudinaliter dispositis. Verticilli florum axillares, constantes e glomeribus florum pedunculatis, oppositis, floribus pedicellatis. Bracteæ lineares, subsessiles, ciliatae, in pedicellis solitariæ. CAL. Perianth. monophyllum, tubulato-turbinatum, punctatum, subpubescens, striato-angulatum, 5-fidum: laciinis linear-lanceolatis, carinatis, erectis, subæqualibus. COR. infundibuliformis, utrinque pubescens, dilute violacea. TUBUS cylindricus, longitudine calycis; LIMBUS bilabiatus. LAB. super. planum, erectum, obtuso-rotundatum, punctatum, emarginatum; inferius paullo magius, patens, 3-fidum: laciinis rotundatis, crenulatis, planis. STAM. Filam. 4, subulata, pallida, ori tubi inserta, limbo breviora; quorum 2 superiora paullo longiora. ANTHÈRE reniformes, obtusæ, purpurascentes. PIST. Germ. viride,*

4-par-

4-partitum, obtusum, basi perichætio cinctum.
Stylus subulatus, pallidus, staminibus paullo longior. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, validus, cephalicus; *Sapor* aromaticus, calidus, vix amaricans; *Siccata* planta odore & sapore fere fortior.

VIRTUS: stomachica, excitans, emmenoga-
ga, diuretica, resolvens.

USUS: culinaris.

OBS. *Infusum* aquos. herbæ rec. luteo-subrubicundum, odore & sapore herbæ; vitr. martis nigrescit. *Aqua still.* fragrans. *Oleum still.* sapore acuto, o-
dore herbæ, penetrante.

619. SATUREJA capitata. LINN. *Sp. pl.* 795. *Mat.*
m. 283.

Thymum legitimum. CLUS. *Hist.* 1. p. 357.

Thymum creticum incanum capitatum. BAR-
REL. *Icon.* 897.

Pharm. THYMI CRETICI Folia, Spicæ.

Locus. Europa australis. Oriens. *Suffrutex*.

FORMA. *Folia* opposita, sessilia, lanceolata,
basi latiora, apice acutiuscula, carinata, undique
punctata, concaviuscula, margine subciliata, gla-
briuscula, 2 lineas longa. *Spicæ* florū conicæ
s. subrotundæ, obtusæ, sessiles, majusculæ, sub-
pollicares, constantes *Braeatis* foliis similibus,
at paullo majoribus, punctato-rugosis, margine
albido-ciliatis, imbricatis, calycibus longioribus.
Calyces trigoni, scabriusculi, incurvati, bilabiati,
5-fidi: laciniis ciliatis; duabus inferioribus lon-
gioribus; fauce barbata. *COR.* violaceæ.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, cephalicus, gra-
viusculus; *sapor* aromaticus, calidiusculus, gra-
tus.

VIR-

VIRTUS: resolvens, stomachica, emmenagoga.
USUS.

OBS. *Infusum* herbæ aquos. rubrum, cephalicum,
sapore aromatico, amaricante; cum vitriolo martis fu-
sco-nigreficit.

320. **HYSSOPUS officinalis.** LINN. *Sp. pl.* 796.

Mat. m. 290. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 6.

Hyssopus officinarum cærulea s. spicata. GA-
RID. *Aix.* t. 51.

Hyssopus. BLACKW. *Herb.* t. 296.

Pharm. HYSSOPI Herba.

Locus. Oriens, Austria, in subalpinis, Sibiria:
Perennis.

FORMA. rec. *Caulis* tetragonus: angulis ob-
soletis; scabriuscus: pube minutissima; genicu-
latus, pedalis, erectus, ramosus. *Rami* alternatim
oppositi, erecti, elongati, lateribus alternatim op-
positis superne canaliculati. *Folia* ad genicula al-
ternatim opposita, subsessilia, ovali-lanceolata, ob-
tusa, utrinque punctata, subtus scabriuscula, margi-
ne minutissime ciliata, patentia, pollicaria. *Axillæ*
foliorum foliolis onustæ. *Racemus* terminalis, verti-
cillatus, secundus, elongatus, foliaceus: verticillis
distantibus; singulis constantibus e racemulis axil-
latibus, oppositis, breviter pedunculatis, foliis vix
longioribus, 5-floris, foliolaceis; floribus pedicella-
tis, congestis, intermedio priore, nudo. *Braetæ*
breviusculæ, linearis-subulatae, ad singulos pedi-
cellos laterales. *CAL.* Perianth. 1-phylum, tu-
bulatum, striatum, turbinatum, minutim pubes-
cens, 5-fidum, acutum, erectum, hinc viride,
inde purpurascens. *COROLLA* cærulea. *Tubus*
cylindricus, minutim pubescens, superne recur-
vus. *Limbus* glaber, ringens, bilabiatus, *Labium*,
su-

superius ovatum, erectum, bifidum, obtusum, margine utrinque revolutum; *inferius* patens, 4-fidum, truncatum, profunde retulatum: lacinis o-vato-rotundatis; interioribus erectis; exterioribus nutanti-planis. *STAM.* *Fil.* 4, subulata, cærulea, corolla longiora; quorum 2 superiora paullo breviora. *Antb.* exsertæ, lineares, exorrectæ. *PIST.* *Germ.* viride, subrotundum, glabrum, 4-partitum: lobulis obtusis, conniventibus. *Styl.* subulatus, violaceus, staminibus paullo longior, erectus. *Stigm.* bifidum, subulatum, exsertum.

PROPR. sicc. & rec. *Odor* fragrans, graviuscus, non ingratus; *sapor* calidiusculus, aromaticus, amaricans, subcamphoratus; herba recens *masticata* subluculenta, tenerior, lingvam faucesque calefacit in modum fere Camphoræ, verum debilius.

VIRTUS: corroborans, resolvens, pectoralis, stomachica, diuretica, emmenagogia.

USUS. Tussis, Angina.

OBS. *Infusum* aquos. rubicundum, debilius fragrans, sapore amaricante, leniter aromatico; vitr. martis nigrexit. *Aqua still.* ex herba virente fragrans, bona. *Oleum still.* fragrans, lutescens, sapore calido, amaricante, acriuseulo; ex herbæ Hyssopi, sub florescentia collectæ, libr. 20 olei still. drachm. 6. obtinuit el. BAUMÉ.

321. NEPETA Cataria. LINN. *Sp. pl.* 796. *Mat. m.*

291. OEDER *Icon.* t. 580.

Cataria herba. DODON. *Pempt.* 99.

Mentha cataria. LOBEL. *Hist.* 276.

Nepeta vel Mentha cataria. BLACKW. *Herb. t.* 455.

Pharm. NEPETÆ Herba.

Locus. Europa, Virginia, in ruderatis. *Perennis.* FOR-

FORMA. rec. *Caulis* erectus, geniculatus, villosus, cinereus, tetragonus; lateribus oppositis plano-canaliculatis, angulis obtusis; ramosus, pedalis vel ultra. *Rami* alternatim oppositi, erecti, cauli conformes. *Folia* ad genicula, opposita, petiolata, cordata, supra viridia, pubescentia, subtus villosa, cinerea, bipinnicaria, dentato-serrata, patentia. *Petioli* foliis breviores, teretes, villosi. *Spicæ* florum terminales, constructæ e verticillis subsessilibus, approximatis; parce foliosæ, floribus breviter pedicellatis. *Bractæ* subulatæ. *CAL.* Per. cylindricum, tubulatum, striatum, villosum, 5-fidum: laciniis linearis-subulatis; 3 superioribus æqualibus, erectis; 2 inferioribus paullo minoribus, angustioribus, profundius divisus. *COR.* calyce paullo longior. *Tubus* cylindricus, albus, glaber. *Limbus* ringens, bilabiatus, villosus, albidus. *Lab. super.* erectum, obovatum, concavum, obtuso-rotundatum, bifidum. *Faux* turbinata, compressiuscula, intus undique violaceo-punctata, margine utrinque rotundato, revoluto. *Lab. infer.* subrotundum, maculatum, margine crenulatum, concaviusculum, patens. *STAM.* Fil. 4, subulata, alba, longitudine corollæ; quorum 2 inferiora paullo breviora. *Antb.* bilobæ, purpureæ, lobis oblongis, obtusis, divergentibus. *PIST.* Germ. 4-partitum. *Styl.* subulatus, albidus, longitudine corollæ. *Stigm.* bifidum, acutum.

PROPR. recent. *Odor* fragrans, in Melissam citrinam incidens. *Sapor* foliorum aromaticus, fortis, calidus, fere Melissæ citrinæ, sed longe calidior; *florus* paullo debilior, Melissam magis referens.

VIRTUS: resolvens, emmenagogia.
USUS. Hysteria.

OBS. 1. *Infusum* aquos. herbæ recentis colore Theæ potus, odore & sapore herbæ; vitriolo martis nigrescit.

OBS. 2. Feli Cato perinde grata herba, ac Marum verum.

322. LAVANDULA Spica. LINN. Sp. pl. 800. Mat.

m. 296. KNIPH. Bot. orig. cent. 4.

Lavande. BULLIARD *Flor. paris.* t. 9.

Lavandula angustifolia. GARID. *Aix.* t. 60.

Lavandula. DOD. *Pempt.* 273. BLACKW. *Herb.* t. 294.

Spica Lavendula. LOBEL. *Hist.* 236.

Pharm. LAVANDULÆ Flores.

Locus. Europa australis. *Suffrutex.*

FORMA. rec. *Spica* florum terminalis, cylindrica, erecta, pedunculata, constructa e verticillis 10-floris vel ultra, nudis, pubescentibus; quorum inferiores remoti; superiores proximiores; floribus subsessilibus. *Bracteæ* oppositæ, sessiles, cordatæ, nervoso striatæ, longius acutæ, cinereascentes, calycibus breviores. *CAL.* Per. tubulatum, cylindricum, undique striatum, cinereo-tomentosum, superne cæruleum, truncatum. 4; crenatum; lacinia unica, superiore, subrotunda, plana, concaviuscula, erecta. *COR.* violacea, infundibuliformis, pubescens. *Tubus* striatus, calyxce paullo longior, intus pilosus, extus minutim pubescens. *Limb.* 5-fidus, inæqualis. *Lab.* supermajus, obcordatum s. bifidum: laciniis obovatæ, subcrenulatis; *infer.* 3-fidum: laciniis ovatis, obtusis, patentibus, æqualibus. *STAM.* Fil. 4, intra tubum superne inserta; quorum 2 paullo longiora.

ra. Anth. parviusculæ, peltatæ, subconniventes, subrotundæ, planæ, violaceæ, centro luteo, margine obsolete quadrilobæ, piloso-ciliatæ, os tubi obturantes. *PIST.* Germ. 4-fidum: lobis subrotundis, basi cinctum perichætio. *Styl.* cylindricus, longitudine staminum, vix pubescens. *Stigmata* 2, ovato-oblonga, obtusa.

PROPR. rec. & sicc. Odor fragrans, fortis, cephalicus, suaveolens. Sapor aromaticus, americans, calidiusculus, odori congruens. Flores recentes mysticati leniter in ore calefaciunt.

VIRTUS: nervina, resolvens, tonica, emmenagogia.

USUS: externus.

OBS. 1. *Infus.* aquos. rubicundum, fragrans, amarum; vitriolo martis nigrescit. Hujus infusi guttae 20, aquæ unc. 3 instillatæ, addito vitr. martis, colore obscure viridescentem fecerunt. *Aqua still.* fragrans; *oleum still.* citrinum, odore Lavendulæ forti, sapore calido. E flor. Lavand. libr. 15 olei still. unc. 5 3 obtinuit cl. BAUMÉ; alia vice e flor. libr. 80 obtinuit ol. stillat. libr. 1 & unc. 9. Sed e ramentor. libr. 5, dematis floribus, paucas duntaxat olei guttas accepit. *Spiritus,* si rite paratus, gratissimus, sub nomine *Eau de Lavande* increbuit.

OBS. 2. Infans generosus nascetur cum tumore mollissimo verticis capitis, magnitudine ovi columbini; consulebantur plures medici & chirurgi, apertiorum tumoris setio dissimilantes. Tandem præscripsit cel. OL. ACREL *Spirit. Lavend. compos.* Lond., quo tumor fricaretur, unde brevi plenarie resolutus fuit.

323. *MENTHA* crispa. LINN. *Sp. pl.* 805. *Mat. m.* 278. *KNIPH.* *Bot. orig. cent.* 11.

Silymbria mentha agrestis. LOBEL. *Hist.* 272.

K k

Pharm.

Pharm. MENTHÆ CRISPÆ Herba.

Locus. Sibiria. Colitur in hortis. Perennis.

FORMA. rec. Radix cylindrica, ramosa, articulata, repens, fibris descendentibus, filiformibus, fibrillosis. Caules plures ex una radice, pedales vel ultra, erecti, 4 goni, geniculati, pubescenti-scabridi, ramosi. Rami oppositi. Folia ad genicula, opposita, breviter petiolata, ovato-subrotunda, acutiuscula, pollicaria, subtus pubescentia, supra glabriuscula, rugosa, margine inciso-serrata, ferraturis minutum ciliatis, erectis crispa. Capitulum terminale, oblongum s. ovatum, obtusum, conflatum e verticillis subfessilibus, subapproximatis; inferiore magis remoto, pedunculato; floribus brevius pedunculatis. Bractæ ovato-lanceolatæ, acutæ, ciliatæ, subserratae, verticillis subjectæ, oppositæ. Involucrum polyphyllum: foliolis linearibus, acutis, subæqualibus, subpubescentibus, verticillis subjectum, longitudine circiter pedicellorum. CAL. Perianth. tubulatum, turbinatum, undique striatum, pubescens, 5-fidum: laciniis subulatis, acutis, subæqualibus, erectis. COR. pallide violacea, glabra. TUBUS longitudine calycis, superne amplior, sensim desinens in Limbum 4-fidum: laciniis o-vatis, obtusis, erecto-patentibus, margine undique revolutis; suprema paullo latiore, emarginata. STAM. Filam. 4, setacea, corollæ concolora, longitudine lacinarum corollæ; quorum 2 paullo altiora. ANTH. ovatae, didymæ, incumbentes. PIST. Germ. viride, 4-fidum, obtusum, basi cinctum perichætio. STYL. subulatus, corolla longior. STIGM. 2, subulata, acuta.

PROPR. rec. & sicc. Odor fragrans, fortis, spirituofusus; sapor calidus, aromaticus; masticata in

in lingva & faucibus calefacit, fere ut spiritus vini. Ex siccatione intenditur odor & sapor.

VIRTUS: resolvens, ructatrix, diuretica, emmenogoga, stomachica, lac resolvens.

USU. Hysteria, Vomitus, Coagulum lactis in mammis, Colica.

OBS. *Infusum aquos.* rubrum, fragrans, leniter amaricans; vitr. martis subito nigrescit; hujus infus. guttae 20, cum vitr. martis & aquæ unc. ʒ, colorem sordide brunneum stiterunt. *Oleum still.* aureo colore, debilius fragrans; sapore Menthae acuto & calido.

324. MENTHA sylvestris. LINN. *Sp pl.* 804. *Mat.* m. 279.

Mentha. BLACKW. *Herb.* t. 290.

Mentha romana. LOBEL. *Hist.* 271.

Pharm. MENTHÆ LONGIFOLIÆ Herba.

Locus. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, tetragonus, tomentosus, pedalis vel ultra, geniculatus, superne ramosus. *Rami* oppositi, erecti. *Folia* ad genicula, opposita, subsessilia, lanceolata, acuta, subtus tomentosa, cinerea, supra viridescentia, villosa, bipinnicaria vel ultra, acute ferrata, patentia. *Spicæ terminales*, ternæ, brevius pedunculatæ, villosæ, conicæ, nudæ, constructæ ex verticillis sessilibus, approximatis, floribus pedicellatis. *Bracteæ* linearis-subulatæ, villosæ, calycibus fere longiores. *CAL.* *Perianth.* tubulatum, subturbanatum, villosum, 5-dentatum: lacinias linearis-lanceolatis, acutis, erectis, æqualibus, piloso-ciliatis. *COR.* 1-petala, subregularis. *Tubus* cylindricus, pallidus, superne latior, longitudine calycis. *Limbus* 4-fidus, dilute violaceus: lacinias ovatis, obtusis, patentibus; suprema paul-

lo majore, emarginata. *STAM.* Fil. 4, apici tubi inserta, pallida, setacea, corolla duplo longiora, distantia, erecta, subæqualia. *Anth.* subrotundæ, didymæ, incumbentes. *PIST.* Germen viride, pilosum, 4-partitum, obtusum. *Styl.* setaceus, pallidus, longitudine corollæ. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. Odor fragrans, spirituosus, fere Menthæ crispæ, paullo debilior, sed magis gratus; sapor calidus, aromaticus; masticata lingvam faucesque debilius calefacit.

VIRTUS: eadem quæ in præcedente.

USUS: qui præcedentis.

OBS. 1. Infusum aquos. herbæ rec. rubicundo-lutescens, tanquam potus Thææ, odore & sapore herbae, vitr. martis subito nigrescit. Hujus infusi gutæ 20, aquæ unc. 3 instillatæ, una cum vitr. martis, colore fulco-viridescentem monstrarunt.

OBS. 2. Menthæ viridis LINN. fortior est quam sylvestris, minus grata, sapore debiliore quam Menthæ piperita; ideoque in hortis pharmacopœorum perpetram substituitur Menthæ piperitæ.

325. MENTHA piperita. LINN. Sp. pl. 305. SCHREB.

Mat. m. 317. SCHWENCK. Gewäss. 334.

Menthæ piperis sapore. BLACKW. Herb. t. 291.

Menthæ spicis brevioribus & habitioribus, folio menthæ fuscæ, sapore tertido piperis. RAJ. Angl. 3. p. 234. t. 10. f. 2.

Pharm. MENTHÆ PIPERITIDIS Herba.

Locus. Anglia. Perennis.

FORMA rec. Caulis spithameus, pedalis vel ultra, tetragonus: lateribus 2 oppositis canaliculatis; hirtus, geniculatus: geniculis barbatis; superne ramosus: ramis inferioribus brevioribus, Folia opposita,

sita, brevius petiolata, ovato-oblonga, acutiuscula, acute serrata, ciliata, bipinnicaria, utrinque pubescentia, supra vero minus, molliuscula, subtus punctulis excavatis punctata, internodii longitudine, patentia; ramea rotundiora. *Capitulum terminale*, oblongum, obtusum, basi fulcitum foliolis 2, oppositis, conflatum e verticillis sessilibus, circiter tribus; inferiore remotiore; superioribus subapproximatis. *Flores* pedicellati. *Bracteæ* 2, oppositæ, lanceolatæ, longius acuminatæ, ciliatae, ad verticillos sitæ; quarum inferiores, h. e. verticilli infimi, serratæ, verticillo longiores, superiorum vero verticillorum integræ, longitudine verticillorum. *Bracteæ* aliæ parvæ, linearisubulatæ, ad pedicellos, calycibus breviores. *CAL.* *Perianth.* tubulatum, cylindrico-turbinatum, stria-to-angulatum, hirtum, 5-fidum: laciniis rotundatis, apice subulatis, erectis, subæqualibus. *COR.* monopetala. *Tubus* albidus, calyce longior, superne amplior. *Limb.* e tubo ampliato, pubescentis, dilute violaceus, 4-fidus: laciniis ovato-oblongis, obtusis, emarginatis, erecto-patientibus; 3 inferioribus æqualibus; superiore latiore, profundius emarginata. *STAM.* *Filam.* 4, setacea, brevia, tubo inserta, situ fere æqualia. *Anth.* intra tubum corollæ reconditæ, cordatae, obtuse; quarum 2 priores. *PIST.* *Germ.* 4-fidum, obtusum, basi cinctum perichætio. *Styl.* filiformis, corolla longior, erectus. *Stigma* bifidum.

PROPR. sicc. & rec. *Odor* fragrans, spirituofus, subcamphoratus; *Sapor* aromaticus, fervidus, camphoræ; *masticata* lingvam & fauces valde calefacit, subsequente sensu frigidiusculo. Recentis odor fere debilior, quam siccatae; sapor siccatae fortior.

VIRTVS: resolvens, calefaciens, emmenagogia.
USUS. Hysteria, Flatus.

OBS. 1. *Infusum aquos.* rubicundum, debilius fragrans, graviusculum, sapore initio debiliore, tum calido; vitr. martis nigro-fuscescit. *Aqua stillat.* calidissima, subopalescens, sapore spirituoso, fragrans. *Oleum stillat.* fulco-rubrum, in aqua natans, odore forti *Menthæ piperitidis*, sapore omnium acerrimo, *Menthæ piperitidis*, fervidissimo, fere igneo. Gustatum vaporem subfuscantem in laryngem demittit, calidissimum, mox subrefrigerantem, fugacem; postea fervent labia & lingua satis diu, etiam si os saepius aqua eluitur. Genis sub oculis illinitum, oculos vehementer ferit, illosque valde lacrymantes facit, effectu non diu inhærente, at visum postea confortat. Olei gutta 1, vitro aqua repleto immissa, omnem aquam imbuit sapore fervido, parumque abest quin aqua gustata urat in labiis.

OBS. 2. E *Mentha piperitide*, bene matura & secca-
ta, destillando, veram elicuit *Camphoram* cl. GAUBIUS
(*), a recente vero herba non item.

OBS. 3. Inter omnes *Menthæ species Piperita* for-
tissima est.

326. MENTHA Pulegium. LINN. *Sp. pl.* 807.
Mat. m. 280.

Pulegium. BLACKW. *Herb. t.* 302. DOD. *Pempt.*
281. BAUH. *Hist. 3. p.* 256.

Pulegium regium vulgatum. LOB. *Hist. 266.*
Pharm. PULEGII Herba.

Locus. Germania, Anglia, Gallia, locis de-
pressis, humidis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* spithameus, procumbens,
tetragonus, geniculatus, pubescens, ramulos. *Ra-
mi* alternatim oppositi, erecti, cauli conformes,
sim-

(*) *Adversar. l. 1. p.* 99.

simpliciusculi. *Folia* ad genicula, opposita, brevius petiolata, ovalia, obtusa, ferrata, glabra, supra lineata, subtus punctata, nervis minutum pubescentia, unguicularia, patentia. *Verticilli* florum axillares, plurimi, subrotundi, subsessiles, foliis breviores, floribus pedunculatis, cernuis. *Bracteæ* quaternæ, utrinque 2, foliolis obovatis, superne ferratis, petiolatis, foliis duplo brevioribus, verticillo vix longioribus, reflexis, viridibus. *CAL.* *Perianth.* tubulatum, cylindricum, undique striatum, pubescens, viridi-purpurascens; ore 5-fido, acuto, erecto, æquali. *COR.* dilute violacea, pubescens. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis, superne incrassatus. *Limb.* 4-fidus: laciniis linear-ovalibus, obtusis, erectis, subæqualibus. *STAM.* corollæ concolora. *Filam.* 4, subulata, erecta, corolla longiora, patentia, situ æqualia. *Antheræ* cordatae, obtusæ. *PIST.* Germen viride, 4-fidum, glabrum, obtusum, basi cinctum perichæfio. *Stylus* subulatus, longitudine fere staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. & sicc. Odor fragrans, spirituosus, graviusculus. Sapor aromaticus, calidus; masticata lingvam faucesque calefacit, subcamphorata.

VIRTUS: resolvens, errhina, pectoralis, stomachica, emmenagogica, diuretica.

USUS. Asthma, Hysteria.

OBS. *Infusum* aquos. lutescens, fragrans, aromaticum, sapore subspirituoso; vitr. martis subito fusco-nigrescit. Hujus infusi guttae 20, instillatae aquæ unciæ 3, addito vitr. martis, colorem fusco-brunneum dilutiorem effecerunt. *Aqua still.* fragrans, aro-

matica. *Oleum stillat.* rubro-luteum, odore & sapore Pulegii, amaricante.

327. MEN'THA gentilis. LINN. *Sp. pl. 805.*

Mentha verticillata minor acuta, non crispa, odore ocymi. BAUH. *Hist. 3. p. 216.*

Aquatica sive Sisymbria mentha rubro folio & flore nigræ menthæ & Balsamine officinarum. LOBEL. *Icon. 509. Hist. 272.*

Le Baume *vulgo.*

Culinis MENTHÆ BALSAMINÆ Herba.

Locus. Europa australis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, tetragonus, geniculatus, scabridus, spithameus, saepe pedalis, ramosus, ramis oppositis. *Genicula* caulis compressiuscula, pubescentia. *Folia* ad genicula, alternatim opposita, petiolata, ovata, obtuso-rotundata, plana, ferrata, minutim ciliata, supra glabra, dilute viridia, subtus pallidiora, venis scabra, pollicaria, patenti-reflexa; *superiora* acutiuscula; *tenella* in ramulis teneris, suborbiculata, ferrata, in formam rosæ conniventia, plana. *Verticilli* florum ad genicula caulis terminalia, 2 vel 3, axillares e foliis, subflesiles; quorum terminalis capitatus. *Braeteæ* opposita, ovato-acutæ, ferratae, ciliatae, verticillis brevioribus. *Flores* pedicellati. *CAL.* Perianth. 1-phylum, tubulatum, striatum, minutim pubescens, ore 5-dentato: laciinis linear-lanceolatis, ciliatis, acutis, erectis, subæqualibus. *COR.* dilute violacea, infundibuliformis. *Tubus* calyce paullo longior, superne sensim incrassatus. *Limbus* 4-fidus: laciinis ovatis, obtusis, erectis, æquali longitudine; suprema paullo latiore, emarginata. *STAM.* Filam. 4, brevia, subæqualia, sub sinubus limbi in-

inserta. Antheræ parviusculæ, ovato-oblongæ, supra sulcatae, intra apicem tubi inclusæ. PIST. Germ. parviusculum, viride, 4-partitum, obtusum, glabrum, basi cinctum perichætio. Stylus subulatus, dilute violaceus, corolla longior. Stigma bifidum, acutum, patens, longius exsertum.

PROPR. rec. Odor fragrans, gratus, subctreto-menthaceus, in Majoranam simul incidens; folia fricata fragrantiora, balsamica. Sapor calidus, aromaticus, in flavedinem citri incidens.

VIRTUS: resolvens, stomachica.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Folia virentia hujus Menthae saturæ herbariæ immiscentur a quibusdam, & cruda eduntur.

OBS. 2. Ex herbæ libr. 96 olei stillat. unc. 1 obtinuit cl. BAUMÉ, colore leniter rubicundo.

328. GLECOMA hederacea. LINN. Sp. pl. 807.

Mat. m. 303. KNIPH. Bot. orig. cent. 6.

Hedera terrestris vulgaris. ZANNICH. Venez.

t. 253. BLACKW. Herb. t. 225. DOD. Pempt.

389. t. 390.

Humilis Hedera s. Chamæcissus. LOB. Hist.
336.

Pharm. HEDERAÆ TERRESTRIS Herba.

Locus. Europa, ad sepes. Perennis.

FORMA. rec. Radix repens. Caulis tetragonus, repens, spithameus, pubescens, scabriuscus, ramosus. Rami oppositi, erecti, cauli conformes. Folia alternatim opposita, petiolata, reniformia, crenata, ciliata, rugosa, supra scabriuscula, subitus minutim punctata, nervis pubescencia, unguicularia, erecto-patentia. Petioli teretiusculi, scabri, supra sulco longitudinali. Stipulae nullæ, sed margo utrinque inter petiolos, obtu-

sus, ciliatus. *Racemi* florū axillares e foliis, oppositi, brevissimi, subquinqueflori, erēcti, nudi, breviter pedunculati, foliis breviores. *Bracteæ* suboppositæ, lineares, acutæ, ciliato-pubescentes, patentæ, in racemo frequentes. *Flores* pedicellati, erēcti. *CAL.* Perianth. tubulatum, cylindricum, inferne attenuatum, undique striatum, pubescens, ore 5-fido: laciniis ovato-acutis, quarum 2 inferiores paullo breviores. *COR.* 1-petala, violacea. *Tubus* cylindricus, pallidus, minutim pubescens, calyce duplo longior, dorso carinatus, superne clavatus, antice variegatus. *Limbus* ringens, bilabiatus. *Lab.* *superius* erēctum, glabrum, ovatum, obtusum, retulum, marginibus reflexis, dorso carinatum: carina pubescente; *inferius* ovatum, obtusum, patens, pariter glabrum, 3-fidum: laciniis lateralibus lineati-ovalibus, obtusis; intermedia duplo latiore, emarginata. *Palatum* barbatum, cæruleo-variegatum. *STAM.* *Filam.* 4, albida, apici tubi corollæ inserta, labio superiori adpressa; quorum 2 longiora. *Anth.* albae, laterales prope apicem filamentorum, bilobæ, in formam crucis conniventes; quarum *superius* par in medio labii, *inferius* in fauce hæret. *PIST.* *Germen* ovatum, viride, glabrum, 4-partitum, obtusum. *Squama* carnosa, germinis lobis conformis, verum paullo major, convexa; brevior, *germen* ad latus fulciens. *Stylus* subulatus, albidus, longitudine Staminum superiorum, illisque adpresso. *Stigma* bifidum, acutum, violaceum.

PROPR. rec. *Odor* debilius fragrans, graviusculus, non ingratus. *Sapor* leniter aromaticus, odori congruens, leniter amaricans.

VIRTUS: tonica, vulneraria.

USUS: Vomica pulmonum, Tussis.

OBS.

OBS. *Infusum* aquos. rubescens Theæ instar, americans; vitr. martis subito fulco-pigreficit.

329. LAMIUM album. LINN. *Sp. pl.* 809. *Mat.* m. 307. OED. *Icon. t.* 594. BLACKW. *Herb.* t. 33.

Ortie blanche. BULLIARD *Fl. paris.* t. 15.

Urtica iners sive *Lamium primum*. DODON.

Pempt. 153.

Lamium f. archangelica flore albo. LOB. *Hist.* 280.

Galeopsis. CAMER. *Epit.* 865.

Pharm. LAMII ALBI Herba.

Locus. Europa, in cultis & ruderatis. *Annum.*

FORMA. rec. *Radix alba*, repens, geniculata, teres, crassitie culmi secalini, ad genicula fibrillosa: fibris descendantibus, elongatis. *Caulis* erectus, tetragonus, pubescenti-scaber, spithameus, basi ramulos, geniculatus. *Rami* oppositi, erecto-patentes, cauli conformes. *Folia* opposita, petiolata, ovata, acuta, margine inciso-serrata, rugosa, pubescenti-scabrida, patentia; *suprema* subsessilia. *Petio* supra concavo-canaliculati, sub-tus convexi. *Verticilli* florum ad genicula, circiter 10-flori. *Macula* purpurascens, obverse lunulata, utrinque ad geniculum, variegata, verticillum distingvens. *Flores* sessiles. *CAL. Perianth.* tubulatum, 10-angulatum, pubescens, basi extus violaceum, ore ampliato, 5 fido: lacinias linearis-subulatis, carinatis, patentibus, margine minutim ciliatis, carina hirsutis. *COR.* ringens, alba. *Tubus* calyce longior, incurvus, pubescens, superne gibbus. *Limbus* ringens. *Lab.* super, villosum, ciliatum, fornicatum, obovatum;

con-

concavum, retusum, nutans; *infer.* ovatum, glabrum, bilobum, utrinque deflexum, basi notatum lineis 3 longitudinalibus, lutescentibus, basi decussatis. *Faux* amplior, compressa, margine utrinque rotundato, instructo dente subulato, recto, solitario. *STAM.* Filam. 4, subulata, alba, pubescentia, sub labio superiori recondita, parallela; quorum 2 paullo breviora. *Anth.* oblongæ, fuscæ, dorso albo-hirsutæ, erectæ. *PIST.* Germ. 4, trigona, truncata, conniventia. *Styl.* subulatus, albus, glaber, longitudine staminum, illisque parallelus. *Stigma* bifidum: laciniis subulatis, acutis.

PROPR. rec. *Odor* fortior, mucidus. *Sapor* herbaceus; *masticata* folia teneriuscula, saliva viridi.

VIRTUS.

USUS.

330. BETONICA officinalis. LINN. *Sp. pl.* 810.

Mat. m. 304. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5. & 11.

Betoine. BULLIARD *Flor. paris.* t. 3.

Betonica. DODON. *Pempt.* 40. LOB. *Hist.* 286.

BLACKW. *Herb.* t. 46. LUDW. *Egypt. p. i.* t. 2.
Pharm. *BETONICÆ* Herba.

Locus. Europa australis, in pratis siccis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, pedalis vel ultra, tetragonous: angulis obtusis, lateribus plano-canaliculatis, obsolete striatis, geniculatis; hirsutus, simplex, superne saepe ramosus: ramis oppositis, erectis, internodio brevioribus. *Folia* ad genicula, opposita, petiolata, cordato-oblonga, obtusa, undique minutim punctata: punctis excavatis; utrinque pubescentia, venoso-rugosa, margine dentato-serrata: serraturis obtuso-rotundatis, ciliatis; summa subsessilia, reflexa. *Petoli* pubescentes, subtus rotunde carinati, su-
pra

pra concavi. *Spica* terminalis, subfoliosa, constructa e verticillis sessilibus, oppositis, approximatis; quorum inferiores remotiores. Foliola 2 opposita, reflexa, caulinis similia, ad basin spicæ; *Bracteæ* vero lanceolatae ad verticillos, oppositæ, sessiles, ciliatae, pubescentes, calycibus paullo longiores; quarum inferiores subdentatae, reflexæ; superiores integræ, patentes. *Involucr.* polyphyllum, verticillum undique cingens: foliolis bracteis superioribus similibus, inæqualibus, erectis, calycibus vix longioribus. *Flores* sessiles. *CAL.* Perianth: tubulatum, turbinatum, subangulatum, superne villosum: ore truncato, 5-dentato: dentibus subulatis, erectis, æqualibus, mucronato-aculeatis. *COROLLA* monopetala. *Tubus* incurvus, infra glaber, albus, supra purpureus, extus & intus pubescens, calyce longior. *Limbus* ringens, bilabiatus, minutim pubescens, purpureus. *Labium superius* oblongum, obtusum, planum, apice revoluto-patente. *Faux* contracta. *Lab. inferius* trifidum, reflexo-patens: laciniis lateralibus, rotundatis; intermedia duplo majore, basi convexa, sulco longitudinali, apice emarginata, erecta. *STAM.* Filam. 4, subulata, alba, pubescentia, tubo inserta, tubo longiora; quorum 2 inferiora paullo breviora. *Anteræ* in fauce, secundæ, rubro-purpurascentes, bilobæ: lobis verticalibus, subrotundis. *PIST.* *Germen* subrotundum, truncatum, glabrum, viridescens, 4-partitum: lobis arcte conniventibus. *Stylus* subulatus, inferne incurvatus, albidus, glaber, staminibus paullo longior. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. Odor herbæ subaromaticus, sub-narcoticus, in odorem cimicis incidens; *florum* vero

vero paullo gratior, debilior. *Sapor foliorum ingratuus*, fatuus, sed simul calidiusculus, vix amaricans; *florum debilis*, odori congruens; *masticati flores calidiusculi*, fauces aliquantulum calefacientes, saliva dilute violacea. *Siccatæ herbæ odor gravis*, debilior; *sapor amaricans*, ingratus.

VIRTUS: anodyna, tonica, errhina; rec. subinebrians.

USUS. Hysteria.

OBS. 1. *Infusum aquos.* herbæ rec. rubicundum, odore & sapore herbæ; vitr. mortis fuso-nigrexit. *Aqua still.* satis fragrans. *Oleum still.* vix ullum dat hæc planta, saltem parcissime.

OBS. 2. Folia Betonicæ inter pulverandum admodum in naribus irritant.

331. MARRUBIUM vulgare. LINN. Sp. pl. 816.

Mat. m. 305. CLUS. Hist. 2. p. 34.

Marrubium album vulgare. BLACKW. Herb. t. 479. ZANNICH. Venez. t. 198. LOB. Hist. 278.

Marrubium. DOD. Pempt. 88.

Pharm. *MARRUBII ALBI* Herba.

Locus. Europa, Virginia, in ruderatis. Perenne.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis vel ultra, tetragonus, villosus, sæpe albido-tomentosus, ramosus. *Rami* oppositi, erecti, cauli conformes. *Folia* ad genicula, opposita, petiolata, ovalia, sæpe ovata s. subrotunda, pollicaria, patentia, rugosa, pubescentia s. villosa, grossius crenata, obtusa. *Verticilli florum* axillares, dense congesti, amplexicaules, sessiles, tomentosi, multi-flori. *Involuerum* polyphyllum, subulatum, hirsutum, calycibus brevius, illisque subjectum, ari-

sta-

statum. *CAL.* *Perianth.* 1-phylum, tubulatum, hirsutum, 10-striatum, ore patulo, barbato, 10-fido: laciniis subulatis, erectis, uncinatis, rigidis, glabris, alternis minoribus. *COR.* alba, ringens, villosa. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* bipartitus: *labio super.* erecto, linearis, concaviusculo, bifido, obtusiusculo; *infer.* patente, trifido: laciniis lateralibus ovato-linearibus, obtusiusculis, oppositis; intermedia duplo majore, obovata, obtuso-rotundata, obsolete crenulata. *STAM.* didynama, intra tubum versus faucem inclusa. *PIST.* Germen 4-fidum. *Stylus* filiformis, longit. staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. sicc. & rec. Odor fragrans, vinosus, gratus. Sapor amarus, inhærens.

VIRTUS: tonica, emmenagogia, diuretica.

USUS. Cachexia, Obstructio mensium, Hysteria, Asthma pituitosum.

OBS. 1. *Infusum* aquos. rubrum, amarum; vitr. martis fuscescit. *Extractum* aquosum dat ad quinque sedecim partes; CARTHEUSER.

OBS. 2. A veteribus medicis magni aestimata fuit hæc planta, nunc fere oblitterata, tametsi effectus prodit egregios. Certe cl. J. H. LANGE (*) pulverem ex foliis Marrubii omnibus remediis aliis præfert in asthmate humido & pulmonum infarctibus, propter vim eximiā humores viscidos solvendi.

332. LEONURUS Cardiaca. LINN. Sp. pl. 817.
Mat. m. 308.

Cardiaca. LUDW. Ectyp. p. 3. t. 5. BLACKW. Herb. t. 171. ZANNICH. Venez. t. 109. LOB. Hist. 278. DODON. Pempt. 94.

Pharm.

(*) *Miscell. veritas. de rebus medicis*, fasc. 1. p. 57.

Pharm. CARDIACÆ Herba.

Locus. Europa, Virginia, in ruderatis. Biennis.

FORMA. rec. *Radix* fibrosa. *Caulis* erectus, glaber, tetragonus, angulis linea longitudinali pubescente, lateribus plano-canaliculatis; geniculatus: geniculis ciliato-barbatis; bipedalis, ramosus. *Rami* oppositi, erecti, cauli conformes. *Folia* ad genicula, alternatim opposita, petiolata, patentia, rugosa, supra atrichodia, subtus nervis pubescentia, margine ciliata; inferiora palmato-quinqueloba: lobis oblongis, trifidis, acutis, inæqualiter inciso-ferratis; superiora cuneiformia, integra, trilobata: lobis lanceolatis, acutis. *Petioli* tetragoni, supra canaliculati, pubescentes. *Verticilli* florum in summitate caulis ad genicula s. axillas foliorum plures, circiter 20-flori, floribus sessilibus, congestis. *Involucr.* polyphyllum, linearis-subulatum, minutim pubescentis, erectum, calyce brevius. *CAL.* Per. tubulatum, turbinatum, glabrum, 5-angulatum, subbilabiatum, 5-fidum: laciniis 3, interioribus ovatis, apice subulato-spinosis, erectis; 2 exterioribus paullo majoribus, patenti-reflexis. *COR.* sordide & dilute violacea, extus villosa. *Tubus* longitudine calycis, incurvatus, inferne albidus, glaber. *Limbus* ringens. *Labium* superius ovatum, obtusum, erectum, apice subrevolutum; *inferius* trifidum, patens: laciniis lateralibus rotundatis, revolutis, nigro-maculatis; intermedia paullo majore, ovato-oblonga, obtusa, patente, paleo sordido, maculato. *STAM.* Filam. 4, subulata; quorum 2 superiora, labio superiori inserta, erecta; 2 inferiora tubo inserta, patentia. *Anth.* cordatae, obtusæ, trigonæ. *PIST.* Germen

4-par-

4-partitum, laxe, truncatum, apice barbatum.
Stylus filiformis, longitudine staminum, pallidus.
Stigma bifidum, acutum.

PROPR. rec. folior. contus. *Odor* debilis, herbaeо-subaromaticus; *sapor* herbaceo-aromaticus, calidiusculus, substypticus; *Florum* odor aromaticus, non ingratus, debilis. *Siccat.* herb. *odor* vix ullus, *sapor* amarus, austriusculus.

VIRTUS: tonica.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum rubicundum, amarum; cum vitriolo martis fusco-nigrescit.

333. ORIGANUM Dictamnus. LINN. *Sp. pl.* 823.

Mat. m. 301. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 4.

Dictamnum verum. DOD. *Pempt.* 280. *c. fig.*

Dictamnum creticum. BLACKW. *Herb. t.* 462.

CAMER. *Epit.* 472.

Dictamnum. LOBEL. *Icon.* 502. *Hift.* 267.

Pharm. *DICTAMNI CRETICI* Folia.

Locus. Candia. *Suffrutex.*

FORMA. *Folia* petiolata, suborbiculata, obtusa, nervis depresso lineata, punctis nigricantibus s. excavatis utrinque adspersa, tomentosa s. lanata, albida, unguicularia.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, cephalicus, gratus; *sapor* amaricans, aromaticus, calidus, odo-ri congruens.

VIRTUS: stomachica, emmenagoga, calefa-ciens, resolvens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. debilius fragrans, lutescenti-rubicundum potus Theæ instar, vix amaricans; vitr. martis fuscescit. *Aqua still.* fragrans, aromatica. *Oleum*

still. valde aromaticum odore & sapore, frigore congelans sub specie camphoræ; NEUMANN.

334. ORIGANUM creticum. LINN. *Sp. pl.* 823.
Mat. m. 300.

Origanum Heracleoticum. DOD. *Pempt.* 284.
Pharm. & Culinis ORIGANI CRETICI Spicæ (falso herba dictæ).

Locus. Oriens, Europa australis. *Perenne.*

FORMA. *Shicæ* fasciculatæ, lineares, purpureo-scentes, rectæ, pedicellatæ: pedicellis alternatim oppositis; constantes e bracteis & floribus. *Bracteæ* cuneiformes, acutiusculæ, venulosæ, margine suprimeo scabré, imbricatæ, calycibus longiores. *Calyces* ovati, undique punctati: punctis resinosis, 5-fidi: laciniis lanceolatis, obtusiusculis, minutim ciliatis, erectis, subæqualibus. *Corollæ* albescentes.

PROPR. *sicc.* *Odor* fragrans, cephalicus, gratus, fortis. *Sapor* aromaticus, gratus, calidiusculus, vix amaricans.

VIRTUS: calefaciens, tonica, stomachica, resolvens, emmenagoga.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquos. rubrum, debilis fragrans, sapore amaricante, grate aromatico; vitr. martis fusco-nigrescit. *Aqua stillat.* fragrans. *Oleum still.* colore sangvineo, sapore acutissimo, calidissimo, aromate valido Origani cretici.

OBS. 2. In culinis multis cibi spicis hisce conduntur, ob aroma fragrans, palato amicum.

335. ORIGANUM vulgare. LINN. *Sp. pl.* 824.
Mat. m. 299. KNIPH. *Bot. orig. cent. 4.* GUNN.
Fl. norv. 51.

Ori-

Origanum sylvestre. DOD. *Pempt.* 284. ZAN-
NICH. *Venez.* t. 149.

Origanum. BLACKW. *Herb.* t. 280.

Pharm. *ORIGANI VULGARIS* Herba.

Locus. Europa, Canada, Virginia, in monti-
bus. Perenne.

FORMA. *Caulis* pedalis, erectus, tetragonus, purpureo-fuscens, pubescens, ramosus. *Rami* oppo-
siti, erecti, caule teneriores, in ceteris confor-
mes; superiores longiores: *Folia* ad genicula, op-
posita, petiolata, ovata, nervosa, semipollicaria,
supra glabra, subtus minutim pubescentia, utrin-
que punctata, margine minutim ciliata, paten-
tia. *Axillæ foliorum* in planta culta foliolis o-
nustæ. *Flores* spicati. *Panicula* spicatum termina-
lis, corymbosa. *Spicæ* subrotundæ, peduncula-
tæ. *Bracteæ* cuneiformes, acutiusculæ, planæ;
purpureæ, glabræ, venosæ, sessiles, floribus sub-
jectæ singulæ. *CALYX.* *Perianthium* pedicella-
tum, longitudine bracteæ, turbinatum, striatum,
glabrum, ore barbato, 5-fido; laciniis linearis-acu-
tis, erectis, æqualibus, purpurascensibus. *COR.*
infundibuliformis, violacea. *Tubus* sensim sursum
ampliatus, calyce longior. *Limbus* bilabiatus:
lab. super. erectum, bifidum, obtusum; *infer.*
trifidum, patens, obtusum. *STAM.* didynama,
longitudine fere corollæ. *PIST.* *Germen* qua-
dripartitum. *Stylus* filiformis, corolla longior.
Stigma bifidum, acutum, revolutum.

PROPR. sicc. & rec. *Odor* fragrans, gravi-
sculus, non ingratus, fere Serpylli. *Sapor* aro-
maticus, in Mentham incidens, sed debilior.

VIRTUS: prioris.

USUS.

OBS. *Infusum aquosum rubrum*, debilius fragrans, sapore amaricante, leniter aromatico; vitriolo martis nigrescit. Hujus infusi guttæ 8, instillatae aquæ unciae $\frac{1}{2}$, addito vitr. martis, colorem sordide violaceum stiterunt.

336. ORIGANUM Majorana. LINN. Sp. pl. 825.
Mat. m. 298.

Majorana seu Marum. DOD. Pempt. 270.

Amaracus vulgarior. LOB. Icon. 498.

Majorana. BLACKW. Herb. t. 319.

Sampsuchus f. majorana. LOB. Hist. 265.

Pharm. & Culinis MAJORANÆ Herba.

Locus. Colitur ubique in hortis. *Annuum.*

FORMA. rec. Radix cylindrica, descendens, undique fibrillosa. Caulis erectus, spithameus vel ultra, obsolete tetragonus, geniculatus, pubescenti-villosum, inferne ramosus. Rami alternatim oppositi, simplices, erecti, cauli conformes. Folia ad genicula caulis & ramorum, opposita, subsucculenta, petiolata, ovalia, obtusa, vix pollicaria, minutim villosa, obsolete punctata, linearia, margine obsolete repanda. Axillæ foliorum onustæ foliolis quaternis. *Floralia* folia ad ramos paniculæ atque ad capitula, opposita, sessilia, ovalia, concava, pedunculo breviora. Panicula terminalis, composita e spicis pluribus, in ramis terminalibus, congestis, sessilibus & pedunculatis; singulis ovato-oblongiusculis, obtusis, tetragonis, villosis, compositis e floribus & bracteis. Flores sessiles. Bracteæ ovato-subrotundæ, planæ, punctatae, imbricatae. *CAL.* Periantb. proprium nullum, nisi bracteas spicæ diphyllas dicas; quarum interior paullo minor, retusa. *COR.* alba. *Tubus* turbinatus, minutim pubescens, longitudine bractea-

Stearum. Limbus 4-fidus: *laciniis ovatis, obtusis, patentibus, margine utrinque revolutis; suprema latiore, emarginata, apice revoluta. STAM.* *Filam.* 4, erecta, subulata, alba, apici tubi inferta, corolla longiora; quorum 2 paullo breviora. *Antberæ reniformi-bilobæ.* *PIST.* *Germen* viride, parviusculum, 4-fidum, obtusum, minutim perichætiatum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum, erectus. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. & sicc. Odor fragrans, fortis, cephalicus, obscure graviusculus, gratus; Sapor aromaticus, subamaricans, calidiusculus; masticata folia recentia subsucculenta, molliuscula.

VIRTUS: tonica, stomachica, resolvens, emmenagogia, errhina.

USUS: culinaris; Anosmia.

OBS. 1. Infusum aquos. rubicundum, fragrans, sapore aromatico; vitr. martis nigro-fuscescit. Aqua still. fragrans. Oleum stillat. luteo-rubicundum, odore Majoranæ, sapore herbæ calido, amaricante, acri. Ex Herb. recentis Majoranæ libr. 150 unc. 15 olei still., leniter citrini, accepit cl. BAUMÉ; sed ex Herb. majoran. sicc. libr. 8 & unc. 14 obtinuit idem vir unc. 2 & drachm. 2 olei still. præcedenti similis. Cl. SPIELMANN & CARTHEUSER olei $\frac{1}{4}$ partem obtinuerunt.

OBS. 2. Resinam, Camphoræ simillimam, oleum Majoranæ ætate ad fundum vasis demittit, forma crystallina: crystallis albidis, diaphanis, fragiliusculis, majusculis, aggregatis: singulis oblongis, tetraëdris, tetragonis, a medio versus apicem utraque extremitate cuneatis. Hæc resina odore est olei majoranæ, sapore calido, amaricante, aromatico; masticata inter dentes friabilis sentitur, arenosum mentitur sub masticatione, comminuitur, non solvitur, Inter digitos tractata non emollitur,

verum dura pernianet. Non solvitur in aqua pura, nec in oleo expresso; sed in spiritu vini perfecte solvitur. In ignis flamma subaccenditur, funditur, defluit, unde subito extingvitur flamma; resina liquefacta statim solidescit, fragilis fit friabilisque. In vase ferreo super ignis flammam, funditur, fumat: fumo aromatico; admota flamma mox accenditur, flagrat: flamma vivida, lucida, lutescente, non fuliginosa; consumitur penitus sub desflagratione, reliquo pauxillo duntaxat nigredinis ejusdam splendentis. Hinc Camphora non est, ut quidam voluerunt, sed peculiaris resina. In aere aperto evaporatione non consumitur, tamquam Camphora, quantumvis calori exposita. Praeraque olea essentialia aetate resinam deponunt, quae aut fundum petit, aut illis immixta suspensa haeret. Resina, quae subsidit, saepius crystallisata apparet; ea vero quae in oleis suspensa haeret, liquida est, oleoque immixta. Præsentiam indicat color olei, a naturali recedens; demonstrat rectificatio, unde residuum tenax, Terebinthinæ simile. Nascitur haec resina a decompositione olei, quae acceleratur, si vas, in quo oleum servatur, melius non obturetur, quam ut aer acedat, præsertim si loco parum frigido asservetur vas. Quo plus resinæ depositum oleum quoddam essentiale, eo magis spiritu rectore orbum est; sed huic defectui obviandum itur, si oleum super plantam recentem rectificetur, unde sit, ut novo spiritu rectore iterum saturetur.

OBS. 3. In culinis herba Majoranæ vulgaris est, ad cibos conditios idonea.

337. THYMUS Serpyllum. LINN. Sp. pl. 825.

Mat. m. 282. KNIPH. Bot. orig. cent. 6.

Serpillum vulgare. DOD. Pempt. 276. ZAN-

NICH. Venez. t. 170.

Pbarm. SERPYLLI Herba.

Lo-

Locus. Europa, in collibus aridis. *Suffruticulus.*
FORMA. rec. *Radix* filiformis, fibrillosa. *Cau-*
lis filiformis, teres, minutim pubescens, fusco-
cinereus, inferne repens, superne procumbens,
ramosus. *Rami* oppositi, adscendentes, tetrago-
ni, albido-villosi; inferiores longiores, ramosi,
superiores sensim breviores, simplices. *Folia*
caulina vix ulla; ramea opposita, breviter petio-
lata, obovata, obtusa, utrinque punctata, lineas
2 longa, inferne albo-ciliata, patentia. *Capitula*
florum terminalia, laxa, subrotunda, foliis 4 ful-
cica; quorum 2 opposita superiora. *Flores* pe-
dicellati. *CAL.* Perianth. tubulatum, 10-striatum,
villosum, albidum, bilabiatum, 5-fidum: labio
superiore plano, 3-fido, acuto, ciliato; inferio-
re bipartito: laciniis subulatis, ciliatis. *COR.* di-
lute violacea. *Tubus* cylindricus, longitudine ca-
lycis, pubescens; *Limbus* glaber, bilabiatus. *La-*
bium superius oblongum, obtusum, emarginat-
um, erectum, planum; *inferius* patens, trifidum:
laciniis ovatis, obtusis. *Palatum* cæruleo-
punctatum. *STAM.* *Filam.* 4, erecta, subulata,
ad labium superius, corolla longiora, albido-vio-
lacea; quorum 2 superiora margini tubi, 2 in-
feriora, breviora, basi tubi inserta, erecta. *Anth.*
parvæ, cordatae, purpureæ. *PIST.* Germen o-
vatum, apice 4-lobum: lobis globosis. *Stylus* su-
bulatus, albido-violaceus, longitudine stami-
num. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. & siccat. Odor fragrans, cepha-
licus, gratus. Sapor aromaticus, calidiusculus,
subcamphoratus, subamaricans.

VIRTUS: resolvens, tonica, stomachica,
diuretica.

USUS.

OBS. *Infusum aquos. coloratum ut potus Theæ, cum vitr. martis nigrescit. Aqua still. fragrans. Oleum still. saturate coloratum, rubrum, fragrans. Ex herb. Serpylli rec. libris 30 accepit BAUMÉ olei stillatitii drachmam ȝ.*

338. THYMUS vulgaris. LINN. Sp. pl. 825. Mat. m. 281. KNIPH. Bot. orig cent. 5.

Thymum durius. DODON. Pempt. 275.

Pbarm. & Culinis THYMI VULGARIS
Herba.

Locus. Oriens, Europa australis. Colitur in hortis. Suffrutex.

FORMA. Fruticulus parvus, ramosissimus, spithameus vel ultra, erectus. Rami oppositi, obsolete tetragoni, pubescentes; tenelli villosi. Folia opposita, petiolata, ovali-oblonga, obtusa, undique punctata, circiter 2 lineas longa, patentia, glabriuscula s. albido-villosa. Flores subcapitati. Capitula terminalia, obtusa, foliosa, constantia e floribus pedicellatis. Calyces hirsuti, 5-fidi.

PROPR. rec. & sicc. Odor fragrans, fortis, cephalicus, gratus; recentis fsvior. Sapor aromaticus, calidus.

VIRTUS: resolvens, emmenagogia, diuretica, tonica, stomachica.

USUS.

OBS. 1. *Infusum aquos. rubrum, fragrans, vitriolo martis nigro-fuscescit. Aqua stillat. fragrans. Spiritus gratus. Oleum stillat. dilute citrinum, fragrans, calidum, acre, Thymo ipso ingratius.*

OBS. 2. Ab oleo stillatitio Thymi Resinam albam, saccharo cantho similem, crystallis cubicis, diversæ magnitudinis, saepe nucem avellanam exæquantibus, odo-

re Thymi, sapore acutissimo, in aqua non solubilibus, obtinuit NEUMANN (*); quod postea adstruxit J. BROWN (**). Hæc resina solvitur facile in Spiritu vini, sed si tintura hæc in aquam frigidam injicitur, observantur guttæ parvæ olei liquidi, aquæ innatantes, quæ sensim formantur in crystallos planas, a crystallis Lunæ non multum abludentes, odore & sapore Thymi, persistentes, nec volatiles prout camphora. Non solvitur in Spiritu Nitri, sed amittit suam formam crystallinam, & faciem gummosam induit, sapore Thymi amaro; nec solvitur in oleo vitrioli. Igni admota hæc resina funditur, & in oleum liquidum abit, id quod etiam accidit in vase clauso, & non sublimatur, ut cum camphora sit.

339. MELISSA officinalis. LINN. *Sp. pl.* 827. *Mat.*
m. 294. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 4.

Melissa. DOD. *Pempt.* 91. *t. 92.*

Melissa vulgaris odore citri. BAUH. *Hist.* 3.
p. 232.

Pharm. *MELISSÆ CITRINÆ* Herba.

Locus. Europa australis, in subalpinis, Japonia. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix* fibrosa. *Caulis* erectus, tetragonus, geniculatus, dodrantalis vel ultra, minutim pubescens, inferne ramosus, diffusus. *Rami* alternatim oppositi, cauli conformes, ramulosi, erecti. *Folia* alternatim opposita, petiolata, cordata, obtusa, grossius & obtuse serrata, rugosa, pollicaria, supra viridia, minutim pubescentia, punctis parvis elevatis scabriuscula, subtus glauca, punctis excavatis adspersa, patentia; superiora obovata, acutiuscula, pubescentia, superne serrata, patent-revoluta. *Verticilli* flo-

L 15

rum

(*) *Philosopb. transact.* vol. 33. p. 324.

(**) *L. c. p. 361.*

rum axillares, subpedunculati. *Bracteæ* 4, parviusculeæ, ovales, utrinque acutæ, ciliatæ, utrinque 2 ad verticillos, pedicellorum longitudine; minores vero ad pedicellos. *CAL.* Perianth. tubulato-turbinatum, subincurvatum, 5-angulatum, striatum, piloso-pubescent, ore bilabiato, minutim ciliato; *Labio super.* piano, subtruncato, tridentato, reflexo; *inferiore* erecto, bifido: laciniis linearis-lanceolatis, acuminatis. *COR.* alba, tubo cylindrico, incurvato, calyce angustiore & longiore; limbo clavato, angulato, bilabiato; *labio super.* convexo-gibbo, concavo, minutum pubescente, erecto, margine emarginato, reflexo; *infer.* trifido: laciniis ovatis, obtusis, reflexis, intermedio majore; palato hirsuto. *STAM.* Filam. 4, subulata, longitudine corollæ; quorum 2 superiora breviora. *Anth.* bilobæ, divaricatae. *PIST.* Germen 4-partitum, obtusum, glabrum, basi cinctum perichaetio. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigm.* 2, subulata, acuta, revoluto-patentia.

PROPR. recent. & sicc. *Odor* fragrans, fere flavedinis corticis citri; *Sapor* herbaceus, calidiusculus, citratus. Herba ante florescentiam lecta gravior.

VIRTUS: resolvens, leniter roborans, diuretica, emmenagoga.

OBS. *Infusum* aquos, leniter fragrans, citratum, colore potus Thæ, sapore leniter amaricanti-aromatico; vitr. martis nigro-fuscum. *Infusum* vinosum gratum. *Aqua still.* ex herba virente grata, fragrans. *Oleum stillat.* parcum, fragrantissimum, lutescens sive luteo-rubicundum, odore graviusculo, sapore Melissæ graviusculo.

340. DRACOCEPHALUM Moldavica. LINN. Sp.
pl. 830. Mat. m. 292.

Melissa moldavica. CAMER. Epit. 576.

Melissa turcica. LUDW. Ectyp. p. 8. t. 15.

Pharm. MELISSÆ TURCICÆ Herba.

Locus. Moldavia. Annum.

FORMA. rec. Radix fibrosa, fusca. Caulis albidus, erectus, obsolete tetragonus, geniculatus, glaber, vix pubescens, ramosus. Rami alternatim oppositi, tetragoni, minutim pubescentes, pariter ramosi, erecti. Folia ad genicula, opposita, patentia, petiolata, lanceolata, obtusa, trinervia, utrinque glabra, supra viridescentia, subtus glauca, punctata, pollicaria vel ultra, margine profunde ferrata s. inciso-ferrata: ferraturis obtusis, infimis profundioribus, setaceis. Petioli foliis breviores, subtus teretes, sulcati. Flores verticillati. Verticilli axillares, foliosi, 6-flori, floribus pedicellatis. Bracteæ 4, petiolellatae, lanceolatae, glabræ, subtus punctatae, ferratae: ferraturis setaceis. CAL. Perianth. tubulatum, undique striatum, minutim pubescens, bilabiatum: labio superiore majore, erecto, plano, tridentato: dentibus ovato-acutis, erectis; inferiore profunde bifido: laciniis lanceolatis, erectis, acutis. COR. violacea. Tubus filiformis, albidus, incurvus, calyce longe angustior, paulloque longior. Limbus ventricosus, violaceus, ringens, bilabiatus. Lab. super. ovatum, obtusum, erectum, emarginatum, planiusculum; inferius patens, 3-fidum: laciniis lateralibus minoribus, obtusis; intermedia majore, obtusa, retusa: margine utrinque deflexo. Palatum cæruleo-punctatum. STAM. Fil. 4, subulata, albida, corolla paullo breviora. Anth. bilobæ, lobis exorrectis, per paria 2 sub-

con-

conniventes, fauce paullo longiores. *PIST.* *Ger-*
men 4-fidum, glabrum, obtusum, basi cinctum
perichætio dentato. *Stylus* filiformis, longitudine
staminum superiorum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. *rec.* *Odor* fragrans, fere *Melissæ* ci-
trinæ; *sapor* debilior, parcus aromaticus; *masti-*
cata planta lubrica, saliva saturate viridi.

VIRTUS: roborans, resolvens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. herbæ recent. rubrum, odo-
re fragrante *Melissæ*, sed simul graviusculo, sapore re-
missiore; vitr. martis nigro-fuscescit.

341. OCYMUM Basilicum. LINN. *Sp. pl.* 833.

Mat. m. 302. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 4.

BLACKW. *Herb.* t. 104.

Ocymum. CAMER. *Epit.* 308.

Pharm. *BASILICI* Herba.

Locus. India. Colitur in hortis. *Annum.*

FORMA. *rec.* *Radix* cylindrica, descendens,
undique obsessa fibris plurimis, filiformibus, al-
bis. *Caulis* spithameus, erectus, minutim pubē-
scens, teres, ramosus, diffusus. *Rami* alterna-
tim oppositi, ramosi, erecti, cauli conformes.
Folia subsucculenta, opposita, petiolata, ovata,
acuta, glabra, subtus notata punctis excavatis,
pollicaria vel ultra, integerrima, patentia. *Petioli* subtus convexi, supra canaliculati, foliis
breviores. *Racemus* terminalis, rectus: rachi te-
tragona, villosa; palmaris, constans verticillis 6-flo-
ris, plurimis, remotis, floribus pedicellatis: pedicel-
lis rachi adpressis. *Bract.* oppositæ ad verticillos,
petiolatæ, ovatæ, acutæ, concavæ, verticillo paul-
lo longiores. *CAL.* Per. campanulatum, hirtum,
bilabiatum; *labio super.* subcordato, marginato,
pla-

plano, obtuso-rotundato, trinerveo, reflexiusculo; *infer.* 4-fido, laciniis ovato acutis, erectis; basi intus tomentoso. *COR.* alba, resupinata. *Tubus* breviusculus, sensim ampliatus. *Limbus* ringens. *Lab. super.* erectum, ovatum, concavum, extus hirtum, 4-fidum: laciniis ovatis, obtusis, reflexo-patentibus; *inferius* cuneiforme, patens, concaviusculum, apice planum, margine serrulatum. *STAM.* *Fil.* 4, subulata, incurvata, alba, corolla paullo longiora, versus labium *inferius* deflexa, approximata; quorum 2 superiora paullo breviora, inferne geniculata: geniculo instru-cto dente obtuso, hirsuto, patente. *Antheræ* sub-peltatae, cordatae, planae, reflexiusculæ. *PISTILL.* *Germ.* 4-fidum, obtusum, cinctum perichaetio vi-ridi, 4-fido: laciniis ovato-acutis, longitudine germinis; superiore obsoleta. *Styl.* albus, filiformis, longitudine & declinatione staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. sicc. & rec. *Odor* fragrans, gratus; recentis syavor. *Sapor* aromaticus, gratus, sub-anisatus. *Masticata* folia recentia subsucculenta, molliuscula.

VIRTUS: stomachica, resolvens, excitans.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquos. fragrans, rubrum, aroma-ticum; a vitriolo martis obscuratur.

OBS. 2. In culinis grata est herba pro cibi condi-mento.

342. PRUNELLA vulgaris. LINN. Sp. pl. 837.

Mat. m. 309. LUDW. EEtyp. p. 9. t. 19.

Brunella. BLACKW. Herb. t. 24. BESL. Eyfl. æst.

p. 1. t. 1. f. 2. TILLI Hort. Pif. t. 17. f. 2. 3.

Pbarm, PRUNELLÆ Herba,

Locus.

*Locus. Europa, Virginia, in pratis & pascuis.
Perennis.*

*FORMA. rec. Radix fibrosa. Caulis palmaris,
adscendens, tetragonus: angulis oppositis planis,
oppositis aliis canaliculatis; simpliciusculus, ba-
si infima parce ramosus: ramis oppositis cauli si-
milibus; inferne glaber, superne angulis pube-
scenti-scabridus. Folia alternatim opposita, pe-
tiolata, ovato-oblonga, acutiuscula, ferrata, u-
trinque scabriuscula, lineata, patentia, pollicaria;
summa lanceolata, subfessilia. Petioli supra ca-
naliculati, foliis breviores. Spicæ terminales, ses-
siles, ovato-cylindricæ, pollicares, truncatæ, e
floribus verticillatis, breviter pedicellatis, & bra-
cteis constantes. Verticilli 6-flori. Pedicelli com-
presso-tetragoni. Bractæ oppositæ, cordatæ,
latæ, planæ, membranaceæ, sessiles, æquales,
albidæ, striis viridescentibus parallelis pictæ, ex-
tus pubescentes, intus glabræ, ciliatæ, apice acu-
ræ, singulos verticillos foventes. CAL. Perianth.
tubulatum, bracteis longius, biangulatum, supra
glabrum, trinerveum, subtus striatum, pube-
scens, angulis ciliatum, bilabiatum: labio super.
depresso-plano, truncato, crenato, minutim tri-
dentato, margine utrinque reflexo, compresso; in-
fer. lanceolato, angustiore, bifido: laciniis acumi-
natis. COR. cærulea. Tubus calyce longior, infer-
ne albus, superne sensim ampliatus, cæruleuscens,
striatus. Limbus cæruleus, ringens, bilabiatus.
Lab. super. fornicatum, obtusum, erectum; infe-
rius patens, trifidum: laciniis ovatis, obtuso-ro-
tundatis; exterioribus reflexis; intermedia paten-
te, denticulata. STAM. sub labio superiori recon-
dita. Filam. 4, subulata, violacea; quorum 2
superiora breviora; 2 inferiora longiora, omnia
ter-*

terminata dente subulato, divaricato. *Anth.* bilobæ: lobis divergentibus, subovatis; pedicellatæ: pedicello lateralí e filamento, sub dente. *PIST.* *Germ.* 4-partitum, glabrum, obtusum, basi cinctum perichætio. *Stylus* subulatus, violaceus, staminibus paullo brevior. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPR. rec. *Odor* nullus. *Sapor* herbaceus, amaricans; *masticata* folia subglutinosa.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. rubescens, sapore herbaceo; vitr. martis nigrescit; hujus infusi guttae 20, aquæ unciæ $\frac{1}{2}$ instillatae, addito vitr. martis, colore fuscoviridescentem exhibuerunt.

ORDO ANGIOSPERMIA.

343. EUPHRASIA officinalis. LINN. *Sp. pl. 841.*

Mat. m. 315. KNIPH. *Bot. orig. cent. 8.*

Euphrasia officinarum. ZANNICH. *Venez. t. 246.*

Euphrasia. CAMER. *Epit. 767.* LOB. *Hist. 261.*

Euphragia. BLACKW. *Herb. t. 427.*

Pharm. EUPHRASIÆ Herba.

Locus. Europa, in pascuis aridis. *Annua.*

FORMA. rec. *Radix* fibrosa, fibrillosa. *Caulis* digitalis, simplex, vix ramosus, erectus, terres, pubescens. *Folia* opposita, ovata, obtusa, ferrato-dentata: dentibus acuminatis, supra convexis, subtus concavis, minutim ciliatis; supra glabra, lineata; fulculis e sinibus ferraturæ supra discum folii decurrentibus; subtus pubescens, patentia. *Racemus* terminalis, foliaceus, sub florescentia contraëctus, comam breviusculam effi-

efficiens, floribus axillaribus, oppositis, sessili-
bus. *CAL.* Perianth. ovatum, angulatum, foliis
paullò brevius, pubescens, 4-fidum: laciniis lan-
ceolatis, acuminatis, erectis, ciliatis, subæquali-
bus, erectis. *COR.* alba, ringens. *Tubus* cylin-
dricus, albus, glaber, longitudine calycis. *Lim-*
bus bilabiatus. *Lab.* super. album, subovatum, con-
cavum, pubescens, striis cærulescentibus, utrinque
3, intus pictum, obtusum, erectum, bifidum:
lobis obtusis, emarginatis; *inferius* superiori paul-
lo majus, erecto - patens, trifidum: laciniis o-
mnibus emarginatis. *Faux* undique striata & picta
striis cærulescentibus, sc. sub labio superiore & mar-
gine inferiore; antice vero colore luteo. *STAM.*
Filam. 4, subulata, alba, tubo inserta. *Anth.* sa-
gittaræ, obtusæ, purpureæ, subtus barbatæ, conni-
ventes, subconnexæ in hemisphærium supra con-
vexum, ad labium superius vergens, rima posti-
ca. *PIST.* *Germen* ovatum, obtulum, barbatum.
Stylus subulatus, staminibus longior, intra ri-
mam antherarum, pubescens. *Stigma* obtuso-
capitatum.

PROPR. rec. *Odor* debilis. *Sapor* amaricans,
debiliter aromaticus, *odori* congruens.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquos. rubescens, sapore herbaceo;
vitriolo martis fusco-nigreſcit.

OBS. 2. De Euphrasia scripsit Jo. FRANCUS (*). E
propria experientia nihil statuit, verum recenset testi-
monia medicorum de Euphrasia, illiusque vi insigni ad-
versus oculorum vitia, unde constat, priscos medicos

ma-

(*) *Euphragia herba, medicina polychresta, verumque oculorum solamen, &c.* Francof. & Lips. 1717.

magnam huic herbae habuisse fiduciam. Colligenda herba sub ipsa inflorescentia, & probe siccanda commendatur ad visum roborandum, atque nubeculas & quasi telas, ante oculos obversantes, avertendas, panum & suffusionem incipientem tollendam, nec non caliginem oculorum eradicandam. Interne fumenda Euphrasia, & foccus ejus expressus, cum vino & melle edulcoratus, oculis instillandus. Ego ex propria experientia nihil certi de hae herba adhuc scio, sed tamen non spernenda arbitror testimonia prisorum. Certe Islandi succum expressum, ut optimum remedium, in morbis oculorum adhibent, quemadmodum docet cl. EGGERT OLAFSEN (*).

344. ANTIRRHINUM Linaria. LINN. Sp. pl.

858. Mat. m. 313. KNIPH. Bot. orig. cent. 6.

Linaria vulgaris lutea. ZANNICH. Venez. t.

174. BLACKW. Herb. t. 115.

Linaria. LUDW. Edyp. p. 6. t. 12.

Osyris. CAMER. Epit. 930.

Pharm. LINARIÆ Herba.

Locus. Europa, in ruderatis. Biennæ.

FORMA. rec. Caulis pedalis, erectus, tenuis, glaber, foliosus, obsolete striatus, superne ramosus. Rami sparsi, paniculati, erecti. Folia frequentia, sparsa, linearia, acuta, sessilia, pollicaria, glabra, integerrima, patentia. Racemos flororum terminalis, etiam in ramis, glaber, subcylindricus, inferne compositus, floribus brevius pedunculatis, foliosus: bracteis linearibus, acutis, longitudine calycis, reflexis, inferioribus majoribus. CAL. Perianth. 1-phylum, glabrum, 5-partitum: laciniis ovali-oblongis, acutis, ere-

M m

ctis,

(*). Reise igienney Island, vol. 1. p. 433.

Etis, æqualibus, extus trinerviis. *COROLLA* dilute lutea, calyce multum longior. *Tubus* crassus, ventricosus, glaber, striis nervosis parallelis notatus, dorso convexiusculus, minutim carinatus; antice plano-compressus, basi cornutus: cornu conico-subulato, acuto, deorsum pendulo, recto, pedunculo longiore. *Limbus* bilabiatus: *Labio superiore* erecto, bifido: laciniis rotundatis, margine utrinque reflexis; *inferiore* erecto, superiori paullo breviore, villoso, fornicato, saturate luteo, inflato-gibbo, obtuso, apice sulcato, deorsum trifido: laciniis rotundatis, glabris, reflexis, intermedia longe minore. *Faux clausa labiis conniventibus.* *STAM.* Filam. 4, subulata, alba, basi corollæ inserta, ad labium superius compressa, quorum 2 interiora breviora, 2 exteriora longiora, basi clavata, villosa. *Antb.* ovales, per paria conniventes. *PIST.* Germen acutum, obtusum, compressiusculum, glabrum. *Stylus* subulatus, intra stamina, longitudine filamentorum breviorum. *Stigma* cernuum, capitato-truncatum.

PROPR. rec. Odor foetidus, fere Scrophulariæ; sapor herbaceus, amaricans. *Sicc.* odor fatuus, sapor amaricans, fatuus.

VIRTUS: anodyna, repellens.

USUS: externus, Hæmorrhoides cæcæ.

OBS. Infusum aquos. rubescens, odore & sapore fatuo, amaricante; cum vitriolo martis color nil variat.

345. SCROPHULARIA nodosa. LINN. Sp. pl. 863.

Mat. m. 310.

Scrophularia nodosa foetida. ZANNICH. Venez. t. 303.

Scro-

Scrophularia. CAMER. Epit. 866.

Pbarm. SCROPHULARIÆ FOETIDÆ Radix, Folia.

Locus. Europa, ad sepes. Perennis.

FORMA. rec. Radix albida, composita e tuberibus pluribus aggregatis, inæqualibus, sessilibus, obliquis, conicis, sœpe ovatis, obsolete annulatis, undique notatis tuberculis vel nodulis sparsis, magnitudine nucis avellanæ, sœpe ovi columbini, parce fibrillosis: fibris filiformibus, palmaribus, albis, descendantibus. Parenchyma albidum, transversaliter sectum æquale: centro medullari maximo; corticali parte tenui, conciore. Caules plures ex una radice, bipedales, erecti, simplices vel ramosi, fusi, variegati atomis pallidioribus, glabri, lucidiculi, tetragoni: angulis parviusculi, acutis. Folia opposita, petiolata, internodiis paullo longiora, ovata, sœpe basi truncata, acutiuscula, glabra, triplicaria vel ultra, nervosa, lineata, venulosa, rugosa, margine ferrato-dentata, sœpe inferne incisa, patentia. Petioli subtus convexi, compressiusculi, supra canaliculati, foliis breviores.

PROPR. recent. radic. Odor foetidus, in Raphanum & Paeoniam incidens; sapor consimilis, amarus, acriusculus; masticata radix firma, fragilis, instat, Raphani, comminuitur. Folior. Odor foetidus; sapor amarus, acriusculus, graviusculus. Siccatae radicis odor debilis, sapor longe mitior quam in recente.

VIRTUS: anodyna, repellens.

USUS: rec. externus, Scrophulæ, Hæmorrhoides cæcæ.

OBS. Infusum aquos. radicis rubrum, amarum; a vitriolo martis obscuratur.

346. LINNÆA borealis LINN. *Sp. pl. 280. Mat. m. 317. Fl. Svec. p. 219. * t. 1. OED. Icon. t. 3. KNIPH. Bot. orig. cent. 9. GUNN. Fl. norv. 37.*

Nummularia norvegica flore purpureo. BAR-
THOL. Act. Hafn. 2. p. 346. f. C.

Pharm. LINNÆÆ Herba.

Locus. Europa borealis, Canada, in sylvis a-
cerosis, sterilibus. Perennis.

FORMA. rec. Radix fibrosa. Caulis perennis,
filiformis, nudus, repens fibrillis radicantibus,
setaceis; longius exorrectus, saepe 2 vel 3 pe-
dum longitudine, purpureus, teres, minutim
pubescentes: lanugine alba. Rami sparsi, pariter
filiformes, cauli conformes; majores repentes,
ramosi, exorrecti; minores simplices, erecti,
virides, pariter pubescentes. Folia in ramis, sub-
succulenta, semperfurentia, opposita, petiolata,
patentia, orbiculata s. ovata, apice obtuso-ro-
tundata, margine undique reclinato, inferne ci-
liato, utrinque instructa, ferraturis binis, remo-
tis; semiunguicularia, venulosa, supra dilute vi-
ridia, pilis raris adpersa, subtus pallidiora, lu-
cidiuscula, glabra, pilis reflexis in costa. Petio-
li lineares, angusti, concaviusculi, piloso-ciliati,
foliis triplo breviores. Stipulae nullæ, verum
squamæ plures, alternatim oppositæ, subcunei-
formes, obtusæ, ciliatæ, imbricatæ; inferiores
minores, ramulos tenellos inferne tegentes, de-
ciduae. Pedunculi terminales in ramulis, digita-
les, erecti, filiformes, rufescentes, subpellucidi,
pubescentes: pube minima, & pilis brevibus ca-
pitulatis; subviscosi, singuli apice bifidi: pedicel-
lis erectis, unifloris, pedunculo conformibus.
Bractæ 2, oppositæ, lineares, obtusiusculæ, sub-
pu-

pubescentes, concaviusculæ, ciliatæ, sitæ ad divisionem pedunculi, pariter ac ad flores. *Flores* nuntiantes. *CAL.* Perianth. fructus interum, 4-phylum: foliolis 2 oppositis minimis, acutis, purpuratè i-bus, ciliatis; 2 aliis majoribus, ovalibus, concavis, germen amplectentibus, conniventibus, ciliatis, adspersis pilis capitulatis, viscidis, sub florescentia germine minoribus, sed peracta illa exscentibus, germenque totum tegentibus. *Perianth.* floris superum, 5-partitum: laciniis lanceolatis, acutis, ciliatis, erectis. *COR.* 1-petala, infundibuliformis. *Tubus* brevis, longitudine calycis. *Limbus* turbinatus, albido-incarnatus; intus adspersus pilis raris, longioribus, albidis, pictus venis sanguineis, latere vero inferiore luteis; 5-fidus: laciniis ovatis, obtusis, erectis, subæqualibus. *STAM.* Filam. 4, fundo corollæ inserta, subulata, corolla breviora; quorum 2 adhuc breviora. *Anth.* compressæ, versatiles. *PIST.* Germen inferum, ovatum, rubicundum, pilosoviscidum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, ad latus ejus superius flexus. *Stigma* subglobosum. *Capsula* decidua, ovata, minutim pubescens, striata, trivalvis, unilocularis, undique tecta perianthio fructus hirsuto-glutinoso. *Semen* solitarium, ovale, glabrum, dilute lutescens, dorso convexum, antice sulco longitudinali, apice obtusum, basi vero acutiusculum, hilo mucrone parvo versus basin ad exortum sulci.

PROPR. herb. sicc. Odor debilis; florum vero vigentium odor gratus, nocturno tempore fortior; sapor amaricans.

VIRTUS: leniter adstringens, diuretica.
USUS.

OBS. *Infusum* aquos. luteo-rubicundum, sapore amaricante, substyptico; vitr. maris nigrescit. Hujus infusi guttæ 20, aquæ unciae si instillatae, addito vitr. maris, colorem fuscō-viridescentem exhibuerunt.

347. VITEX Agnus castus. LINN. *Sp. pl.* 890.
Mat. m. 319. BLACKW. *Herb.* t. 139.

Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis. GARID. *Aix* t. 190.

Vitex latiore folio. DUHAM. *Arbr.* 2. p. 357.
t. 105.

Vitex Matth'oli. DALECH. *Hist.* 281.

Vitex. DODON. *Pempt.* 762.

Elæagnon Theophrasti. LOBEL. *Icon.* 2. p. 138.

Pharm. AGNI CASTI Semina.

Locus. Europa australis, Carolina, in paludosis. *Arbuscula.*

FORMA. Baccæ globosæ, obtusæ, mucronatae, magnitudine semenis cannabini, laeviusculæ, fusco-cinereæ, quadrioculares, basi fulcitatæ calyce urceolato, tomentoso, bacca dimidio breviore.

PROPR. Odor aromaticus. Sapor recent. acris, piperinus; seccat. acriusculus; masticatæ baccae in fauibus diu calefaciunt.

VIRTUS: calefaciens, emmenagogia.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. aromaticum odore & sapore, amaricans, acriusculum, rubrum; ex addito vitr. maris color non demutatur.

348: ACANTHUS mollis. LINN. *Sp. pl.* 891. *Mat.*
m. 318.

Acanthus Branca ursina. BLACKW. *Herb.* t. 89.

Acanthus sativus. DOD. *Pempt.* 707. LOB. *Hist.*
Car. 477.

Carduus Acanthus s. Branca ursi. BAUH. Hist.

3. p. 75.

Pharm. BRANCÆ URSI Folia.

Locus. Europa australis. Perennis.

FORMA. rec. *Folia* petiolata, spithamea, oblonga, utrinque glabra, lucidiuscula, superne lobata, inferne pinnatifida: lobis oppositis, ovatis, obtusis s. acutiusculis, obtuse dentatis, margine minutim ciliatis. *Petioli* teretes, supra canaliculato-plani.

PROPR. rec. *Odor* debilis. *Sapor* glutinosus, herbaceus; *masticata* lubrica sentiuntur.

VIRTUS: emolliens, demulcens.

USUS. Clysmata.

CLASSIS XV.
TETRADYNA MIA.
ORDO
SILICULOSA.

L349. *LEPIDIUM sativum.* LINN. *Sp. pl. 899.*
Mat. m. 322.
Nasturtium hortense. BLACKW. *Herb. t. 23.*
DOD. Pempt. 699. LOB. *Hist. 107.*
Pharm. NASTURTII HORTENSIS Herba vi-
 rens, Semina,
Locus. Colitur ubique in hortis. *Annum.*
FORMA. rec. *Radix* simplex, fusiformi-cy-
 lindrica, descendens, alba, fibrillosa. *Caulis* bi-
 pedalis, erectus, teres, glaber, rore glauco te-
 nuerit adspersus, superne ramosus. *Rami* alter-
 ni, simplices, erecti. *Folia* alterna, petiolata,
 glabra, subsucculenta, patentia; *inferiora* bipin-
 nata: pinnis cuneiformibus, inciso-dentatis, acutiu-
 sculis; *superiora* pinnata: pinnis suboppositis, li-
 neari-lanceolatis, acutis, subdentatis; *suprema*
 sessilia, linearia, subintegerrima, concaviuscu-
 la, acuta, subpubescentia. *Flores* terminales,
 racemosi, nudi, pedunculati, erecti. *CAL.* Per-
 4-phyllo, viridescens: foliolis linear-i-ovalibus,
 obtusis, subpubescentibus, concavis, margine un-
 dique attenuato, albido, erectis; 2 oppositis paulo
 latioribus. *COR.* cruciformis, alba: *petalis* cu-
 neiformibus, obtusis, ungaviculatis, calyce lon-
 gioribus, patentibus. *STAM.* *Fil.* 6, alba, corolla
 bre-

breviora; quorum 2 opposita paullo breviora. *Anth.* purpureæ, oblongæ, incumbentes. *Glandulæ* 2, utrinque solitariæ, ad basin filamentorum breviorum. *PIST.* *Germen* viride, ovatum, obtusum, retusum, utrinque compressum, plano-convexusculum. *Stylus* brevis, crassiusculus, intra lobos germinis. *Stigma* capitato-convexum, albidum. *Pericarp.* *Silicula* ovata, obtusa, retusa, compressa; hinc plana, concaviuscula, inde convexiuscula, glabra, terminata stylo persistente, lobis breviore; bilocularis, bivalvis: valvulis navicularibus, compressis, carinatis. *Se-mina* ovata, lineata, rufescens.

PROPR. rec. *Odor* debilis; contusorum foliorum fragrans; *sapor* vix subamaricans, acris; *masticata* folia comminuantur, lingvam faucesque calefaciunt, saliva viridescente.

VIRTUS: antiscorbutica, diuretica.

USUS: culinaris; Scorbutus.

B. *Nasturtium hortense crispeum*, BAUH. *Pin.* 104.

Prodr. 44. t. 43.

Culinis NASTURTII CRISPI herba virens.

Locus. Colitur in hortis. *Annuum.*

FORMA. Præcedenti simillima planta, statuta, facie, floribus, & fructu; sed differt foliis inferioribus longius petiolatis, circumscriptione suborbiculatis, magis laciniatis, crispis.

PROPR. *Odor* debilis. *Sapor* qui in præcedente, verum magis validus, magis dulcescens, gravior.

VIRTUS &

USUS ut in præcedente.

OBS. 1. *Infus.* herbæ recent. limpidum, odore & sapore herbæ; vitriolo martis non demutatum.

OBS. 2. Folia recentia in satura herbaria cruda edi solent, admixta Laetula.

OBS. 3. Ex capite mortuo Nasturtii hortensis, post destillationem ex retorta terrea, bene lutata, igne vehementiore, Phosphorum pulchrum elicuit cel. MARGGRAF (*).

OBS. 4. Seminum drachm. 1, aquæ fervid. unc. 3 infusa, infusum dant aqueo-sublutescens, odore Nasturtii, sapore debili, spissiusculum, mucilaginosum, in fibra parum ductile.

350. THLASPI arvense. LINN. *Sp pl. 901. Mat. m. 323.*

Thlaspi. BLACKW. *Herbal t. 68.*

Thlaspi latius. DODON. *Pempt. 700.*

Pharm. *THLASPEOS* Semina.

Locus. Europa, in agris. *Annum.*

FORMA. *Siliculæ* orbiculatæ, undique marginatae, utrinque compresso-planæ, apice rotundatae, bifidae, albidae, venulosæ, biloculares: dissepimento transversali. *Semina* 6 vel 8 in singulo loculamento, pedicellata, subimbricata, ovalia, obtusa, compressiuscula, rubicundo-brunnea, lucidiuscula, undique striata: striis ovalibus concentricis.

PROPRIET. *Odor & Sapor* alliacei.

VIRTUS:

USUS:

OBS. *Infusum* aquosum limpidum, odore alliaceo debili, sapore consimili, amaricante; vitr. martis non mutatum.

351.

(*) *Opusc. chym. tom. 1. p. 69.*

351. THLASPI *Bursa pastoris*. LINN. *Sp. pl.* 903.
Mat. m. 324.

Bursa pastoris. BLACKW. *Herb. t. 5. Lob. Hist.*
110.

Pharm. BURSÆ PASTORIS Herba.

Locus. Europa, Virginia, in cultis. Annuum.

FORMA. rec. *Radix* filiformis, subhorizontalis, alba, fibris descendentibus, capillaribus. *Caulis* subpedalis, erectus, ramosus, teretiulculus, undique striatus, pubescenti-scabridus. *Rami* alterni, erecti. *Folia* alterna, scabra, minutim ciliata; inferiora petiolata, obverse lanceolata, extrorsum latiora, runcinata, margine minutim & remote denticulata; *caulina* lanceolata, sessilia, sagittata, acuta, margine denticulata; *ramea* consimilia, linearia. *Corymbus* florum terminalis, floribus parviusculis, pedunculatis; *Fructus* vero racemus. *CAL.* Per. 4-phylum, laxum: foliolis ovatis, pallidis, pilosis, margine undique albo, apice viridi, concaviusculo, obtuso. *COR.* cruciformis. *Petala* 4, alba, cuneiformia, obtusa, in ungues lineares sensim attenuata. *STAM.* Filam. 6, subulata, alba, corolla breviora; quorum 2 adhuc breviora. *Anth.* ovatae, luteae, incumbentes. *PIST.* *Germen* majuscum, ovale, obtusum, compressum, viride. *Stylus* cylindricus, brevis. *Stigma* truncatum. *Siliqua* obcordata, compressa, lateribus utrinque carinatis, inferne attenuata, apice emarginata cum acumine, bilocularis, bivalvis: dissépimento centrali. *Semina* plurima, ovalia, pedicellata, futuræ affixa.

PRO-

PROPR. rec. Odor debilis; Sapor fere Brassicæ crudæ, acriusculus; sicc. odor fortior.

VIRTUS:

USUS.

OBS. Infusum aquos. lutescens instar Theæ potus, odore fere Brassicæ, sapore subdulcescente, nauseoso; cum vitr. martis vix fuscescit.

352. COCHLEARIA officinalis. LINN. *Sp. pl.*
903. *Mat. m. 320. OED. Icon. t. 135. KNIPH.*
Bot. orig. cent. 3.

Cochlearia batava. BLACKW. *Herb. t. 227.*

Cochlearia britannica. DOD. *Pempt. 583.*

Pharm. COCHLEARIÆ Herba virens.

Locus. Europa borealis, in littoribus maritimis. *Colitur in hortis. Annua.*

FORMA. rec. Caules plures ex una radice, simplices, spithamæi, erecti, 5-angulares, glabri. Folia alterna, glabra, succulentæ; radicalia longius petiolata, cordata, obtusa, rotundata, subintegra vel angulata, unguicularia; caulina ovato-oblonga, obtusa, dentata, quorum inferiora spathulata, superiora sessilia, amplexicaulia. Corymbus terminalis, simplex, erectus, pedunculis sparsis, angulatis, scabris: punctis hyalinis, elevatis. Perianth. viridiuscum, laxum, tetraphyllum: foliolis ovatis, obtusis, concavis, margine albidis, deciduis. COR. cruciformis, alba. Petala 4, ovata, obtusa, unguiculata, patentia, calyce duplo longiora. STAM. viridia. Filam 6, subulata, incurvata, longitudine calycis, quorum 2 paullo breviora. Antb. ovatae, utrinque attenuatae, in medio utrinque instructæ dente solitario, incumbentes. PIST. Germ. ovatum, majusculum, compressiusculum, sulco opposito longitu-

tudinali. *Stylus cylindricus*, longitudine staminum. *Stigma capitatum*, obtusum.

PROPR. rec. *Odor* subnasturtinus, debilior; *sapor amarus*, in *Nasturtium* incidens, acris; *masticata* acris sentitur in ore & faucibus, effectu subfugaci; *saliva viridescente*. *Siccata* folia amara, ingrata, vix acriuscula.

VIRTUS: antiscorbutica, diuretica, mundicans.

USUS. Scorbatus, Scelotyrbe, Rheumatismus scorbuticus.

OBS. 1. Aroma Cochleariae perfecte extrahitur cum Spiritu vini, cum aqua non item. *Aqua still.* debilis; *Spiritus* vero fragrans ex aromate herbae, acris, penetrans. Si herba Cochleariae post incepit florescentiam colligitur, & cum aqua destillatur, obtinetur *oleum stillat.* lutescens, limpidum, aetate spissuscum, aromate & sapore valido herbæ Cochleariae, amari-cante. *Infusum* folior. siccata aquosum lutescens, odore debili, sapore amaro; vitriolo martis nigro-fuscat.

OBS. 2. Habet Cochlearia id commune cum congeneribus, ut recens & cruda adhibeatur, cum in siccata vis antiscorbutica fere pereat; hinc decoctione vis medica debilitatur; hinc etiam nulla extracta valida e plantis antiscorbuticis obtineri poterunt.

OBS. 3. In regionibus borealibus, ubi scorbatus endemius est, provida natura Cochleariam abundare fecit. In Islandia parant incolæ hanc herbam cum late acidulato vel ejus sero; condunt eam etiam sale culinari in magnis dolis, & per hiemem servant. Cum oves in locis, ubi Cochlearia crescit, pascuntur, avide quidem illam edunt & valde pinguescant, sed carnauseolo sapore inficitur; EGGERT OLAFSEN (*).

OBS. 4.

(*) L. c. vol. 1. p. 483.

OBS. 4. Scripsit de Cochlearia V. H. MOLLENBROCIUS (*). Docet, decoctum lenissimum esse debere, ne sal volatile avolet. Sedulo monet pharmæcopœos, ut sibi caveant, ne folia Afari pro cochlearia sumant, quod in Dania factum refert. Salia volatilia in morbis dissipat. Saccharata dicit nocere in scorbuto; Cochleariam autem in eodem morbo permultum prodesse.

353. COCHLEARIA Armoracia. LINN. *Sp. pl. 904.*
Mat. m. 321.

Crassa radice Raphanus rusticus Lapathii
folio. LOB. *Hist. 173. Icon. 320.*

Armoracia aut Raphanus major. ZANON. *Hist.*
p. 21. t. 15.

Raphanus sylvestris s. armoracia multis. BAUH.
Hist. 2. p. 851.

Raphanis magna. DODON. *Pempt. 667.*

Pharm. & Culinis ARMORACIÆ (Raphani
rusticani) Radix virens.

Locus. Europa australis, in paludosis. Colitur in hortis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix filiformi-cylindrica, pendalis, crassitie pollicis vel ultra, saepe instructa nodulis lateralibus subrotundis, sparsis, remotis, fibras emitentibus, undique alba, extus laeviuscula, rugis transversalibus, subannularibus, remotis, apice punctis depresso notata. Parenchyma album, carnosum, firmum; post sectionem transversalem notatum annulo marginali tenui, concentrico; centro medullari conflato e punctis sparvis, subdiaphanis.*

PROPR. rec. *Odor fragrans, pungens, penetrans, oculos feriens. Sapor fervidus, acris, dulce-*

(*) *Cochlearia curiosa.* Lipsiae 1674.

cescens, s^epe subamaric^ans. *Masticata* fauces & lingvam pungit & calefacit, tu^ssim irritat, nares ferit, oculos lachrymantes facit, effectu fugaci. *Cocca* radix mitis, dulcescens, subodorata; *siccata* debilis odore & sapore.

VIRTUS: diuretica, incidens, antiscorbutica, rubefaciens.

USUS. Scorb^utus, Anorexia, Cachexia, Hydrops, Asthma hydropicum, Scelotyrbe, Raucedo, Arthritis.

OBS. 1. Recens radix, cum aqua vel spiritu vini destillata, *aquam stillat*. dat, volatili radicis imprægnatam, pariter etiam *Spiritum*. *Syrupus* Armoraciæ, frigide paratus, aromate radicis valde prægnans fit; hic syrupus, si valebit, recentissime paratus esse debet; volatile enī omne activum brevi evaporat, unde effētus fit; itaque quovis die parari debet. Radix virens, in taleolas concisa & cum aqua fontana in balneo diutius digesta, fragrantiam amittit, odorem acquirit fere Brassicæ acidulatæ, sapore dulci; a vitriolo martis color nil demutatur; si digestio ulterius protrahitur, aquam reddit opalescentem, corrumpitur, aescit, odore nauseoso. *Oleum stillat*. mite, in aqua subsidens, parca quantitate obtinuit NEGMANN.

OBS. 2. Acrimonia Armoraciæ pingvibus involvitur, quare s^epe in culinis bu^yro fuso subigitur radix rasa, ciborum, cum primis pisiciū, condimento inservitura.

OBS. 3. Radix, rasa & l. a. tractata, *amyulum* dat album, sed in parciori copia, plus tamen quam congeneres. Si fermentationem spirituosam subit, abit in *spiritum ardentem*.

OBS. 4. Vim Armoraciæ antarthriticam s^epius mihi experiri lieuit. Secunda radix recens in frustula minuta, e quibus cochlear unum majuscum sumendum omni mane per mensem, deglutiendum absque masti-

ca-

catione prægressa. Insuper bibenda decocti summitatum fruticis Juniperi libra ȝ. Agit secure, ventriculum vix calefacit, nisi sub fine curæ. Multos scorbuticos hoc etiam regimine perquam levatos vidi.

354. CARDAMINE pratensis. LINN. Sp. pl. 915.
KNIPH. Bot. orig. cent. 12. BLACKW. Herb.
t. 223

Flos cuculi. DODON. Pempt. 582.
Pharm. NASTURTII AQUATICI Herba.
Locus. Europa, in pascuis humidis. Perennis.
FORMA. rec. Caulis erectus, simplex, spithameus, teres, glaber. Folia alterna, subcarnosa, glabra, petiolata cum impari; inferiora circiter 6-juga; foliolis subrotundis, angulatis, extimo paullo majore, cuneiformi, saepe lobato; superiora circiter 4-juga; foliolis linearibus, concavis, acutiusculis, subcarinatis; petiolo communi linear-i-concavo. Racemus terminalis, oblongus, pedunculatus, nudus, glaber. CAL. Periantb. tetraphyllum, glabrum: foliolis ovalibus, obtusis, concaviusculis, erectis, margine tenui membranaceo, quorum duo opposita basi gibba. COR. cruciformis, dilute violacea, albida, venis cærulecentibus picta; petalis obovatis, retusis; ungvibus sublutescentibus, longitudine calycis. STAM. Filam. 6, subulata, alba, corolla breviora; quorum 2 opposita breviora. Anth. linear-i-cordatae, incumbentes, incurvae. Nectarium: glandula subrotunda, basin filamentorum breviorum cingens. PIST. Germen cylindricum, glabrum. Stylus cylindricus, germine brevior, longitudine yix staminum. Stigma capitatum.

PROPR. rec. *Odor* debilior; *sapor* subamaricans, leviter acriusculus. *Caules* fortiores, acriores quam folia.

VIRTUS: antiscorbutica.

USUS. Scorbustus.

OBS. 1. *Nasturtii* aquatichi loco nostri pharmacopolæ sumere solent Cardaminem pratensem; exteri vero *Sisymbrium* *Nasturtium* LINN. Perinde quidem fuerit.

OBS. 2. *Flores Cardamines pratensis*, dosi ser. 1 vel dr. § mane & vesperi propinatos, admodum laudat cl. G. BAKER (*), ut præstans quoddam antispasmodicum remedium, utile in morbis convulsivis, chorea S. Viti &c. Veritatem assertionis e propria experientia, casibus adductis, illustrat.

355. SISYMBRIUM Sophia. LINN. Sp. pl. 920.

Mat. m. 332.

Sophia. DOD. *Pempt.* 133. ZANNICH. *Venez.* t. 305.

Pharm. *SOPHIAE* Semina.

Locus. Europa, Virginia, locis siccis. *Annum.*

FORMA. *Semina* parva, rufa, ovata, utrinque obtusa, glabriuscula;

PROPR. *Odor* nullus. *Sapor* fere seminum Sinapios.

VIRTUS: stimulans.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. limpidum, odore Sinapios, sapore debili; a vitr. martis color non alteratur.

356. ERYSIMUM officinale. LINN. Sp. pl. 922.

Mat. m. 333. OED. *Icon.* t. 560. ZANNICH.

Venez. t. 287.

Erysimum. BLACKW. *Herb.* t. 28.

Irio s. *Erysimum.* DOD. *Pempt.* 702.

N n

Pharm.

(*) *Medical Transact.* vol. i. p. 442. seq.

Pharm. ERYSIMI Herba.

Locus. Europa, Virginia, in ruderatis. Annum.

FORMA. rec. Radix cylindrica, descendens, flexuosa, fibrillosa. Caulis pedalis, erectus, teres, striatus, pubescens, scaber, ramosus. Rami alterni, simplices, divaricati, pubescentes. Folia alterna, petiolata, utrinque parcus pubescentia, subtus scabra, præcipue in costa & nervis, pinnatifida: laciinis oppositis, oblongis, serrato-dentatis, sursum dentato-lobatis, infimo pari divaricato-reflexo, a superioribus distante; terminali majore, cum laciinis proximis confluente. Petiolii supra concavi. Racemi horum terminales, subrotundi; fructuum filiformes, elongati, nudi, pubescentes. CAL. Perianth. tetraphyllum, pallidum: foliolis linear-ovalibus, obtusiusculis, concavis, pubescentibus. COR. cruciformis, tetrapetala, sordide lutescens; petalis cuneiformibus, obtusis, venulosis, unguiculatis, calyce longioribus. STAM. Filam. 6, subulata, pallida, corolla paullo breviora; quorum 2 adhuc breviora. ANTH. cordatae, acutæ, subrecurvæ. Nectar. glandulæ 2 utrinque ad stamina breviora. PIST. Germen cylindricum, striatum. Stylus brevis, pubescens. Stigma orbiculatum, planiusculum, emarginatum, altitudine fere staminum. Siliquæ cylindricæ, striatæ, virides, pubescentes, cauli adpresso.

PROPR. rec. Odor debilis. Sapor Nasturtii, acris, calidiusculus.

VIRTUS: antiscorbutica, pectoralis.

USUS: Raucedo.

OBS. Infusum aquos. herbæ siccatur pulcherrime rubro-lutescens, odore debili, sapore fere Brassicæ, subdulcescente; a vitr. martis color nil demutatur.

357. ERYSIMUM Barbarea LINN. Sp. pl. 922.
Barbarea f. *pseudobunias*, LOBEL. Hist. 104.
Barbarea. DODON. Pempt. 700.
Culinis BARBAREÆ Herba virens.

Locus. Europa, in cultis. *Perenne.*

FORMA. rec. *Radix* cylindrica, fibrillosa. *Caulis* erectus, sulcato-angulatus, glaber, pedalis, superne ramosus. *Rami* alterni, virgati. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, glabra, lineata, supra obscure viridia, lucidiuscula, lyrata: lacinis lateralibus linearibus, denticulatis; terminali longe majori, ovata, obtusa, repanda s. inæqualiter profunde ferrato-dentata. *Racemi* florum terminales, virgati; florentes ovati; fructiferi elongati. *CAL.* Perianth. tetraphyllum, lutescens: foliolis linearibus, obtusis; 2 oppositis apice gibbis. *COR.* lutea, cruciformis; *Petalis* cuneiformibus, obtusis, retusis, unguiculatis, calyce duplo longioribus. *STAM.* Filam. 6, subulata, corolla breviora; quorum 2 paullo breviora. *Anth.* lineares, hastatæ. *Nectar.* glandulæ subrotundæ, geminæ, utrinque inter germen & stamen brevius sitæ; glandula solitaria conica utrinque inter stamina longiora & calycem. *PIST.* *Germen* cylindricum, obsolete tetragonum. *Stylus* breviusculus. *Stigma* obtusum, emarginatum, altitudine antherarum.

PROPR. rec. Odor fere Brassicæ; sapor Nasturtii, vix americans, acris; masticata folia lingvam & fauces principio acri leniter calefaciunt.

VIRTUS: antiscorbutica.

USUS: culinaris.

OBS. Per totam hiemem folia legi possunt sub nive, ubi virent; nulla itaque aptior planta antiscorbutica

regionibus frigidis, ubi defectus leguminum recentium est. Editur cruda in satura herbaria.

358. ERYSIMUM Alliaria. LINN. Sp. pl. 922. Mat.

Pharm: Al. m. 334. KNIPH. Bot. orig. cent. 3.
Alliariae Her Alliaria. CAMER. Epit. 589. DOD. Pempt. 674.
ba. BLACKW. Herb. t. 372. LOB. Hist. 285.

Locus. Europa, in cultis umbrosis. *Bienne.*

FORMA. rec. *Radix* alba, cylindrico-fusiformis, filiformis, fibrillosa. *Caulis* simplex, erectus, bipedalis, teres, obsolete striatus, inferne lanuginosus, superne glaber. *Rami* pauci, alterni, in Specimine vegetiore. *Folia* alterna, petiolata, cordata, venosa, subrugosa, glabra, venis subpubescentia; inferiora longius petiolata, obtusa, repanda; superiora acuta, inæqualiter dentato-serrata. *Racemus* florum simplex vel compositus, sessilis, nudus, floribus albis, pedunculatis. *CAE.* *Perianth.* tetraphyllum: foliolis oblongis, obtusis, albis, apice luteo-viridescens, erectis, caducis. *COR.* cruciformis, nivea: *Petalis* 4, obovatis, obtusis, unguiculatis, calyce longioribus. *STAM.* *Filam.* 6, subulata, alba, corolla breviora; quorum duo opposita adhuc breviora. *Anth.* cordatæ, luteæ, erectæ. *Nectar.* Glandula parvula, obtusa, solitaria, utrinque ad basin staminum longiorum. *PIST.* Germen viridescens, tetragonum, longitudine fere staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* capitato-truncatum, luteum. *Siliquæ* tetragonæ, obtusæ.

PROPR. rec. *Odor* (folior. contusorum) Cepæ oleraceæ; *sapor* cepaceus, leniter amaricans, subnasturtinus. Quo magis vegetæ crescunt plantæ, eo fortior odor cepaceus. *Siccata* fere effœta.

VIR-

VIRTUS: antiscorbutica, diuretica.

USUS.

OBS. 1. Hæcce planta documento est, naturam ludentem plantæ etiam antiscorbuticæ eundem indidisse odorem cepaceum, quem alias in planta resolvente posuit, ut supra in Scordio observavimus. Dum vacca Alliaria vescuntur, lac sapore cepæ imbuitur.

OBS. 2. Ad gangrænam ulceraque cancrosa hanc plantam recentem commendant.

359. CHEIRANTHUS Cheiri. LINN. *Sp. pl. 924.*

Mat. m. 335.

Keiri. BLACKW. *Herb. t. 179.*

Leucojon luteum. DODON. *Pempt. 160.*

Pharm. CHEIRI Flores.

Locus. Europa australis. Colitur in hortis.

Biennis, saepe subperennis.

FORMA. rec. Racemi terminales, simplices, adpresso pubescentes, angulati. Pedunculi minutissimi pubescentes, obsolete tetragoni, uniflori.

CAL. Perianth. tetraphyllum, pallide viridescens: foliolis linear-lanceolatis, obtusis, erectis; 2 oppositis convexis, basi gibbis; 2 aliis oppositis paullo altioribus, carinatis, apice compressis.

COR. cruciformis; petalis 4, obovatis, obtusis, luteis; ungibus linearibus, longitudine calycis.

STAM. Fil. 6, subulata, longitudine calycis; quorum 2 exteriora opposita breviora. *Antb.*

lineares, acutæ, basi bifidæ, incumbenti-erectæ. *Nectarifera* glandula utrinque ad stamina breviora.

PIST. Germen cylindricum, obsoletè tetragonum, incanum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum; bifidum, patens, crassiusculum.

PROPR. rec. *Odor* svaveolens; *sapor* amari-
cans, in *Nasturtium* incidens, acriusculus. *Sicc.*
odor nullus; *sapor* americans.

VIRTUS: rec. antiscorbutica.

USUS.

OBS. *Infusum aquos.* flor. sicc. sangvineum, grave-
olens, *Brassicæ* siccatae æmulum, amarum; ex vitr.
martis nigrescit.

360. BRASSICA *Napus*. LINN. *Sp. pl.* 931. *Mat.*
m. 328.

Napus sylvestris. BLACKW. *Herb.* t. 224.

Napus. DOD. *Pempt.* 663.

Culinis NAPI Radix recens.

Locus. Europa media. *Colitur in hortis. Bi-*
ennis.

FORMA. rec. *Radix* fusiformis, palmaris vel
ultra, alba, rugis transversalibus notata, cete-
rum læviuscula, linea laterali utrinque longitu-
dinali, solitaria, e fibris capillaribus constante.
Parencyma album, carnosum, firmum; post se-
ctionem transversalem notatum disco æquali pun-
ctato-radiato; radiis obsoletis; annulo concentrico
prope peripheriam.

PROPR. rec. *Odor* Rapæ; *sapor* Rapæ, dul-
cescens; *masticata* firma, comminuitur.

VIRTUS: antiscorbutica, nutriendis.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Radix rasa*, l. a. tractata, amyllum vix dat.

OBS. 2. In culinis radices in aqua elixantur, & jux-
ta carnes eduntur, incoquuntur etiam jusculis.

OBS. 3. Hiemes severas bene perfert hæc planta;
effodiuntur autem plerumque radices sero autumno vel
primo vere, sed spongiosæ fiunt postquam folia pro-
germinarunt. Hortulani paullo densius ferunt hujus
se-

semina, ut radices parviusculæ evadant, quia sic sapidiores censemur.

361. BRASSICA Rapa. LINN. Sp. pl. 931. Mat. m. 329.

Rapum vulgare. DOD. Pempt. 662.

Rapum majus orbiculatum. LOBEL. Hist. 98. c. fig.

Rapum. CAMER. Epit. 218. BLACKW. Herb. t. 231.

Pharm. RAPÆ Radix recens.

Locus. Anglia. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. Radix orbiculata, latitudine palmæ vel ultra, utrinque deprecta, læviuscula, subitus albicans, apice rugosa, incarnata vel purpurascens, pro ingenio soli, superne viridescens, basi radicans: trunculo cylindrico producto, descendente, fibrilloso: fibrillisque capillaribus, dispositis in serie longitudinali opposita, per radicem adscendente. Parenchyma carnosum, firmum, album, post sectionem transversalem subæquale, notatum striis subspongiosis, radianibus, obsoletis; punctis subrotundis versus peripheriam per series dispositis; corticali parte tenuiore.

PROPR. rec. Odor subfragrans; sapor congruens, dulcescenti-subamaricans; masticata molliuscula, subsuccosa, comminuitur, saliva non tineta.

VIRTUS: antiscorbutica, pectoralis, subecoprotica, detergens, diuretica, nutritiva.

USUS. Aphthæ, Raucedo.

OBS. I. Radix, rasa, nonnisi pauxillum amyli dat; itaque non in gelatinoso, sed in dulci principio, quærenda est vis nutritiva & pectoralis.

OBS. 2. *Syrupus Raparum* debet esse recenter præparatus, si valebit.

OBS. 3. Rapæ, primum in aqua elixatæ, dum mollescant, & postea cum laetæ in pulvri coctæ, nutrimentum præbent mite, edulcorans, saluberrimum, facilissimæ digestionis, & non flatulentum; ut tamen vult opinio vulgi. Ruri crudæ eduntur. Apud veteres Romanos Napis postponebantur Rapæ. Sic *Napis humanum caufsa serendos censemus, Rapas pecudum*, dixit olim COLUMELLA. Ambæ tamen hæ radices a Romanis edebantur, at prius elixatis exprimebatur succus, quem laedere putabant; aromatibus insuper condiebantur, addito melle, aceto, liquamine, defruto, oleo &c. APICIPUS COELIUS (*).

362. BRASSICA oleracea. LINN. Sp. pl. 932.

a) Brassica capitata alba. BAUH. Pin. III.

Brassica capitata albida. DOD. Pempt. 612.

Brassica alba sessilis capitata Lactucæ habitu.

LOB. Icon. 243.

Hvitkål Svecis.

Culinis BRASSICÆ ALBÆ caput.

Locus. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. Radix: truncus cylindricus, apice fibrosus. Caudex brevis, inferne cicatrisato-rugosus, superne foliosus. Folia plurima, maxima, circiter bipedalia, obovata, retusa, sessilia, approximata, utrinque glabra, dilute viridescentia, rore glauco tincta, præcipue subtus, supra grosse rugosa, costa subtus crassa, convexa, carinata, albido-viridescente, nervis grossis, suboppositis, a. costa obliquis, supra albis; inferiora folia patentia; media pauca, erecta; interiora plurima, sensim minora; intima parva,

(*) *De arte coquinaria*, p. 89.

va, alba, rore glauco destituta; concava, lateribus plicata, in formam capitis conniventia; arête imbricata. *Caput magnum*, subrotundum, apice planiusculum.

PROPR. *rec.* *Odor* debilis; *sapor* subdulcescens, tuleraceus.

VIRTUS: nutrienda, flatulenta, diuretica, subeccoprotica, putrescibilis cum foetore.

USUS: culinaria.

OBS. 1. *Infusum aquos.* folior. recent. limpidum instar aquæ, odore fragrante Brassicæ, sapore dulcescente Brassicæ; a vitriolo martis color non demutatur.

OBS. 2. Brassicæ capita, l. a. fermentata, spiritum ardente dant, principio suo dulci; hinc concludi potest ad vim nutrientem Brassicæ, de qua dubitarunt nonnulli. Capita hæc concisa, & in dolio compacta, sponte fermentescunt, quamvis addantur sal culinare, summitates anethi & semina carvi: fermentatione spirituosa breviuscula, tum acida. Sic parant nostrates Brassicam suam *acidulatam*, quam frequenter esitant, juri carnium incoctam. Hæc Brassica acidulata in diæta navalí eximia deprehensa est, ut antiscorbutica. Elixantur etiam capita recentia in jure carnium, ut fiat jusculum spissum, vel etiam friguntur in butyro, & dein coquuntur in jure carnium, usque dum plurimum brodii incoctum fuerit, & sic eduntur cum carnisbus.

OBS. 3. Folia Brassicæ succulenta, ulceribus post cantharides ac sinapismos, & eruptionibus cutis ulcerosis imposita, stillicidium seri purulenti promovent.

OBS. 4. Vidi ex præmatura hieme integros acervos Brassicæ, nive sepultos, qui in sequente vere putrefacti fuerunt, cum intolerabili foetore.

OBS. 5. In *capita* non concrescit Brassica alba in regionibus maxime borealibus, quare neque in Archangel, nec Jakutzk Sibiriae, ejusmodi unquam capita obveniunt, testante J. G. GMELIN. (*); neque magis in Islandia hæcce Brassica in *capita* abit, et si subinde ibi contingit, ut Brassica Botrytis capitula congestorum proferat florum (**). Quid? quod nec in China Brassica alba in *capita* conformatur, ut observavit cl. P. OSBECK (***) qui ejus rei caussam climati calido adscribendam censet. At in Capite bonæ spei bene provenit sapidaque evadit (†); quod etiam accidit in insula Mauritii (††).

B.) Brassica alba crispa. BAUH. Pin. III.

Brassica Sabauda. DOD. Pempt. 613.

Brassica patula crispa Sabauda astiva. LOB. I. con. 244.

Savoj-Käl Svecis.

Culinis BRASSICÆ SABAUDÆ caput.

Locus. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. Radix ramoso-fibrosa. Caudex spithameus, teres, cicatricibus rugosus, nudus, superne foliosus. Folia majuscula, approximata, fessilia, obovata, obtuso-rotundata, undique bullata, glabra; plana, margine undulata, repanda, nervoso-venosa: venis rore tenui cōcolore tinctis; exteriora majora, subpedalia, lutescenti-viridia; interiora sensim minora, albido-lutescentia,

(*) Reise durch Sibirien, tom. 3. p. 64.

(**) E. OLAFSEN Reise igennem Island, p. 437. & p. 955.

(***) Dagbok öfver en Ostind. resa, p. 195. Cfr. GMELIN I. c. p. 63.

(†) DE LA CAILLE Journal du voyage au Cap de b. esp. p. 280.

(††) Voyage à l' Isle de Fr. par un Officier, T. 1. p. 215.

tia, concava, in caput subrotundum, majuscum, imbricata.

PROPR. rec. Odor qui in præcedente. *Sapor dulcescens*; *masticata* folia fere minus succosa, quam in præcedente, saliva sublutescente.

VIRTUS: eadem quæ præcedentis.

USUS: præcedentis.

OBS. Brassica Sabauda præfertur priori, ut magis tenera sapidaque post elixationem.

γ.) Brassica capitata rubra. BAUH. *Pin. III. Dodon. Pempt. 610.*

Rödkål *Svecis.*

Culinis BRASSICÆ RUBRÆ caput.

Locus. Colitur in hortis. *Biennis.*

FORMA. rec. *Radix ramoso-fibrosa, Caudex brevis, cicatrizado-rugosus, nudus, superne foliosus. Folia approximata, magna, petiolata, subrotundo-cuneiformia, patentia, plano-concavula, utrinque glabra, viridi-cærulescentia, rore cærulescenti tincta, nervis & venis purpureis rore-violaceo, peripheria criso-undulata, margine repanda, denticulata. Petioli breviusculi, trigoni, supra canaliculati, purpurei, rore cærulescente, latere utrinque aucti foliolo concolore. Superiora folia spathulata, sessilia; intima concava, rubro-violacea, nitida, teneriora, conniven-tia in caput subrotundum, magnum, durum.*

PROPR. rec. Odor præcedentium; sapor dulcescens; masticata folia comminuantur; saliva pulchre violacea.

VIRTUS: præcedentium.

USUS: præcedentium.

OBS. Hæc varietas Brassicæ principio colorante a prioribus discrepat. Extrahitur color aqua calida, re-ma-

manente colore sordide purpurascente. Pro cibo magis tenera est, minus flatulenta. Apparatur uti præcedentes; sapidior tamen sit, si capitibus, minutim consettis, & in butyro elixatis dum mollescant, addatur jus carnium, cum pauxillo Piperis albi & salis culinaris, atque ita ebulliat quoad quasi puliem referat, tumque addatur acetum vini.

§.) Brassica cauliflora. BAUH. Pin. III. DOD. Pempt.

613. RENEALM. Specim. 131. t. 133.

Brassica floridæ Botrytis. LOB. Icon. 245.

Blomkål Svecis.

Culinis BRASSICÆ BOTRYTIOS caput.

Locus: colitur in hortis. Biennis, saepe annua.

FORMA. rec. Radix ramolo-fibrosa. *Caudex* s. caulis spithameus, viridescens, cylindricus, inferne rugosus, superne cicatratus e foliis decurrentibus: cicatricibus serie punctorum transversali notatis. *Folia* in apice caudicis plurima, approximata, petiolata, ovato-oblonga, plana, subbipedalia, obtusa; emarginata, utrinque glabra, viridescentia, rore glauco tincta, nervosa, venosa; margine repanda, obsolete & minutim denticulata; *infima* lîrata; *superiora* oblongiora, denticulato-serrata; *intima* parviuscula, dilute viridescentia, conduplicata, incurvata. *Caput* turbinatum, superne convexo-planum; album, in ambitu foliosum; compositum e lobis capitulo pariter turbinatis, conniventibus; singulis columnæ carnosæ albæ innixis, & congregatis e conglomeribus subrotundis, constructis e florum rudimentis conglomeratis, cinctis foliolis tenellis, albis, ovatis, longius acutis, crenatis, glomere longioribus, apice inflexis, adpressis.

PRO-

PROPR. rec. Odor Brassicæ, debilior; sapor Brassicæ, dulcescens; masticatum caput fragiliusculum, comminuitur, sed florum rudimenta minus dulcia, quam columna.

VIRTUS: priorum.

USUS: culinatis.

OBS. 1. Quoniam omnium sapidissima species Brassicæ hæc est atque tenerrima, estur frequentissime in mensis opulentiorum.

OBS. 2. Frigoris satis patiens est; vix sub æstate rite luxuriat, nisi frequenter irrigetur aqua. Per totam fere hiemem servari potest, si transplantetur in cella vel frigidario, ubi increscit & in capita conformatur.

OBS. 3. Brassica Botrytis in usum culinarem com mode siccari potest, pariter ac pleraque alia oleracea, & vero methodum siccandi exhibuit cl. J. G. EISEN (*). Alios œconomi nostrates diu noverunt in usus hiemales exsiccare legumina viridia variarum Phaseoli specierum, semina tenera Viciae Fabæ, Spinaciam, Petroselinum &c. Bene depurgata hæc oleracea primum fervide infunduntur vel breviter ebulliunt in aqua pura, tum eximuntur & in elibano siccantur. Cum pro mensa apparantur, prius in aquam frigidam immittuntur per nycthemeron, postea in eadem aqua l. a. elixantur. Atque hoc modo saporem retinent, & satis sapida evadunt; Brassica vero Botrytis, sic tractata, rubescit. Ceterum exsiccati etiam posse Brassicam acidulatam ostendit dictus EISEN, & revera deprehensiones, eandem siccatione nihil perdere de sapore suo acidulo. Circa hujus exsiccationem observardum, non opus esse ut fervide infundatur ante siccationem, neque id quidem prodebet, cum acor sic extraheretur. Opportunum certe gentibus borealibus est, novisse me-

tho-

(*) Unterricht von der allgemeinen Kräuter- und Wurzel stocknung. Reval 1773.

thodos siccandi plantas oleraceas, utpote diætæ ipsorum sub diurna hieme per quam convenientes.

t.) Brassica italica purpurea s. alba Broccoli dicta. MILL. *Diction. art. Brassica.*

Brocoli. LABAT *Voyage en Espagne, tom. 5. p.*

*171. **

Culinis BRASSICÆ BROCOLI totum.

Locus. Colitur ratus in hortis. *Biennis.*

FORMA. Radix ramoso-fibrosa. Caulis pedalis vel ultra, erectus, pallide viridis, rore hyalino tinctus, teretiusculus, pollices circiter 2 crassi, undique obfessus foliis, ramulosus. Ramii sparsi, axillares e foliis, graciliusculi, erecti, breves, teretes, glabri, interne nudi, apice foliosi. Folia inferiora magna, frequentia, erectopatentia, sparsa, petiolata, utrinque glabra, viridia, rore viridescente tincta, lyrata: lacinia terminali magna, ovato-oblonga, concaviuscula, pedali vel ultra, obtuso-rotundata, margine undulata, minutim denticulato-crenata; *inferioribus* laciniis paucis, parviusculis, suboppositis, ovato-rotundatis, sursum in petiolum excurrentibus, basi transversaliter affixa; *infimis* parvis, auriculatis; Folia *superiora* s. intima minora, longa, repanda, magis undulata & crispa, concava, dilutius viridia. Petioli teretes, crassitie digitii, vix angulati, glabri, cinereo-viridescentes, longitudine ipsius folii, basi supra planiusculi. Stipulae nullæ, verum margo foliaceus, ad basin petioli utrinque.

PROPRIETAS,

VIRTUS &

USUS, ut in proxime antecedentibus.

OBS.

OBS. Estur Brocoli sat copiose in Italia & Sicilia, inde a mense Decembris ad mensem Maji. Decortican-
tur primum petioli ipsi foliorum majorum, & deinde una cum foliis teneroribus in fasciculos ligantur, atque tum elixantur in aqua; eduntur postea cum embamma-
te e sale, oleo, aceto vini vel succo citri; LABAT. A-
pud nos ligantur folia crescentis plantæ in fasciculum, ut
eum Endivia fieri solet, unde interiora lætius viridescunt
mollioraque evadunt. Quando pro mensa paratur hæc
brassica, desecatur truncus prope radicem, & coquitur
planta integra in aqua salita, resectis apicibus foliorum,
postea cribelli ope ex olla eximitur, integraque patinæ
immittitur, & sic infertur.

?) Brassica fimbriata. BAUH. Pin. 112.

Brassica sabellica. RENEALM. Specim. 134. t. 133.
Blåkål Svecis.

Culinis BRASSICÆ SABELLICÆ coma.

Locus. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. *Radix* fibrosa. *Caudex* cylindricus, spithamæus, cicatrisatus, glaber, foliis concolor. *Folia* alterna, frequentia, petiolata, utrinque lævia, purpurea, rore glauco obducta, spithamæa, saepe pedalia, patentib-subrevoluta, obverse lanceolata, obtusa, lyrato-pinnatifida: pinnae s. laciniis oppositis, ovato-oblongis, obtusis, basi obliquis, margine altero erecto, altero sursum currente, sublobatis, dentatis, fimbriato-crispis: crispaturis erectis; laciniis inferioribus sensim minoribus, totum fere petiolum occupantibus; *tenella* folia magis crista. *Petioli* (s. ra-
chis) firmi, crassiusculi, supra plano-concavî, sub-
tus convexi, basi latiores, sessiles.

PROPR. rec. *Odor* Brassicæ, in Raphanum
incidens; *Sapor* subdulcescens, Brassicæ, sed in
Ra-

Rapam simul incidens; *masticata* folia teneriora,
saliva viridi-purpurascente.

VIRTUS: pectoralis, antiscorbutica, nutritiva.

USUS: culinaria.

OBS. 1. *Infusum aquosum violaceum*, etiam post injectionem vitriolum martis.

OBS. 2. Frigoris, etiam saevioris, patientissima est haec Brassica, eoque ipso in usum regionum borealium quasi creata. In forti gelo rigescit, saepe sepelitur nive, virens tamen & succosa, quam primum regelatur, quod optime fit, si aquæ frigidæ immittatur. Habent etiam in hac herba quo diætam suam temperare possunt gentes boreales, ob climatis atque diætæ virtutis scorbuto maxime obnoxii. Ceterum pectori conveniens est, & ut ut Brassica est, tamen putrescibilis cum fætore non observatur.

1.) *Brassica maritima*. BAUH. *Pin.* 112.

Brassica sylvestris. DOD. *Pempt.* 615.

Brassica marina sylvestris, multiflora, monospermos. LOBEL. *Icon.* 245. *Adversar.* 92.

Snitskål Svecis.

Culinis BRASSICÆ SECTILIS Herba.

Locus. Europa media. Colitur in hortis. *Bienensis.*

FORMA. rec. *Radix* cylindrico-fusiformis, alba, elongata, spithamea vel ultra, saepe pedalis, crassitie vix digitii minimi, glabra, descendens, apice filiformis, fibrillosa: fibris capillariibus, ramulosis, serie longitudinali utrinque disposita. *Caulis* vix ullus; radix breviter caulescens, supra terram rugosa. *Folia* radicalia, petiolata, viridescentia, supra laeviuscula, sed punctis obsoletis, sparsis, piliferis subasperata; subbas-

gla-

glabra, rore glauco tincta, nervoso-venosa: nervis rubro-violaceis; lyrata: lobis oppositis ova-to-oblongis, obtuso-rotundatis, margine crenulato-undulato; inferioribus sensim minoribus; terminali maxima, subovata, obtusa. Petoli sub-triquetri, foliis breviores, rubro-violacei.

PROPR. rec. *Odor* debilis Brassicæ; *sapor* Brassicæ, in Brass. Sabellicam incidens.

VIRTUS: ut in anteriore.

USUS: ut in anteriore.

OBS. Conseritur, per totam æstatem sectilis & edulis, itaque utilis species Brassicæ. Ad mensam paratur eodem modo ac Spinacia.

3.) Brassica radice napiformi. TOURNEF. *Instit.* 219.

Napobrassica. BAUH. *Pin.* III. *Prodr.* 54.

Rotkål Svecis.

Culinis NAPOBRASSICÆ Radix.

Locus. Colitur in hortis. *Biennis.*

FORMA. rec. *Radix* magnitudine capitis infantilis, subrotunda, extus sublæviſcula, lutescens vel albida; *purencymate carnoſo*, fragiliſculo, lutescente vel albido, post sectionem transversalem notato radiis a centro ad peripheriam obſoletis, disco subpunctato.

PROPR. *Odor* fere Brassicæ albæ; *sapor* subdulcescens. Varietas lutescens præstantior atque dulcior est.

VIRTUS: nutriend, edulcorans.

USUS: culinaris; Aphthæ.

OBS. I. Hæc Brassicæ species, per bina circiter secula in Europa septentrionali confita, non ante bina lustra in Anglia cognita fuit, ubi primum sata est d. 15. Apr. a. 1767 (*).

O o

OBS. 2.

(*) *Memoirs of agriculture, by Rob. DOSSIE.* Lond. 1768.
vol. I. p. 424.

OBS. 2. Si radix hæc in aqua simplici ad mollem coquatur, tum contundatur, & postea in lacte cum pauxillo butyri bulliat in pultem, non ineptum inde exsurgit ferculum; certe quidem sapidum, mite, vix flatulentum, subeccoproticum. Nutrit principio suo saccharato. Scinduntur etiam radices in taleolas, & juri cænium incoquuntur. Panem insuper pro plebe, satis sapidum, ex hac radice paravit cl. Z. STRANDBERG (*). Amyli nihil ex hac radice extrahere potui.

1.) *Brassica gongylodes*. BAUH. *Pin.* III.

Brassica caule Rapum gerens. DOD. *Pempt.*

614.

Brassica Caulo-rapa. BAUH. *Hist.* 2. p. 829.

Rapa, Brassica peregrina, caule Rapum gerens.

LOBEL. *Icon.* 246.

Kålrbabis *Svecis*.

Culinis BRASSICÆ GONGYLODIS tuber.

Locus. Colitur in hortis. *Biennis.*

FÖRMA. rec. *Radix* ramosa. *Truncus* erectus, subpedalis, clavatus, inferne cylindricus, albidocinereus, apice incrassatus in *Tuber* subrotundum, obtusum, supra & infra compressiusculum, pallide viridulum, glabrum, magnitudine circiter capitis infantilis, notatum cicatricibus oblongis, sparsis, transversalibus, utrinque acutis, laevibus, serie punctorum obsoletorum longitudinali, ex casu petiolorum ortis; undique folium: *Foliis* petiolatis, oblongis, obtusis, subundulatis, pedalibus, erectis, obscure viridibus, glabris, rore glauco tinctis, margine minutim denticulatis, inferne inciso-pinnatifidis, sublyratis. *Petioli* teretes, spithamæi, basi utrinque excurrentes

- (*) Sätt ar til Sådes-besparning nyttja tilsås af Rofvor, Kålrbötter eller Potatos vid brödbakning. Stockh. 1772.

tes in marginem elevatum, oppositum, acutum, supra vestiti auriculis subalternis, transversalibus, inæqualibus, margine parvo decurrentibus. *Par-*
encyma tuberis carnosum, firinum, albidum, transversaliter sēctum æquale, maculis s. punctis sparsis notatum.

PROPR. rec. *Odor Rapæ; Sapor dulcescens,* Napobrassicæ, sed post coctionem tenerrimum.

VIRTUS &

USUS prioris.

OBS. Variat colore viridescente & eleganter purpureo.

363. BRASSICA Eruca. LINN. *Sp. pl. 932. Mat.*
m. 330. KNIPH. Bot. orig. cent. 9.

Eruca sativa. DODON. *Pempt. 696.*

Pharm. ERUCÆ Semina.

Locus. Helvetia. Annua.

FORMA. *Semina globosa, pallide subcitrina,* glabra, magnitudine seminis Sinapios.

PROPR. *Odor graviusculus. Sapor seminum* Sinapios, verum longe remissior.

VIRTUS: Sinapios, verum debilior.

USUS.

OBS. *Infusum aquos. colore Theæ dilutæ, odore* seminum Sinapios graviusculo; *sapor debilior; cum* vitriolo martis color constat.

364. SINAPIS nigra. LINN. *Sp. pl. 933. Mat. m.*
326.

Sinapi sativum prius. DON. *Pempt. 694.*

Pharm. & Culinis SINAPIOS Semina.

Locus. Europa, in agris. Annua.

FORMA. *Semina parviuscula, subrotunda, fu-*
sco-ferruginea, undique minutim rugosa.

PROPR. *Odor* debilis; *sapor* subamaricans; *calidus*, *acris*, *subfugax*; *masticata* facile comminuuntur, mordent & calent in lingua & fauci-bus: *saliva* subemulsiva.

VIRTUS: rubefaciens, vesicans, stimulans, excitans, sialagogia.

USUS: culinaris; Anorexia, Tertiana. *Externe*: Herpes, Rheumatismus, Podagra retro-pulsa, Paralysis.

OBS. 1. *Infusum aquos.* pallidum, opalescens, odore fragrante, sapore subdulcescente, acri, caliduscupo; vitriolo martis non demutatur. Hæc semina, cum aqua *destillata*, dant *aquam stillat.* acrem, & ut docet LEWIS, *oleum still.* limpidum, in aqua subsidens, odore & sapore intensius pungente & penetrante. Residuum post destillationem est mite, submucilaginosum, subdulcescens. Expressione semina Sinapios edunt *oleum expressum* mite, sapidum, facile rancescens; residuum post expressionem olei acerrimum est. Hinc principium oleosum in hisce seminibus duplex est, alterum fixum, mitissimum; alterum alembicum transscendens, acerrimum. Si in aqua elixantur semina hæc, protracta ebullitione, mitescunt, & extraictum aquosum debile exsurgit. *Pulvis* Sinapios paratur ex seminibus caute siccatis & pulveratis, estque idem frangans, peracris, in culinis usitatus, ætate rancescens, quare in vasis obturatis servari debet. Parum refert, ex quanam specie Sinapios, alba nigrave, semina sumuntur. Ex seminibus Sinapios cl. MARGGRAF Phosphorum extraxit.

OBS. 2. Pasta, e pulvere seminum Sinapios cum acetato vini gallico parata, acerrima fit, & cuti imponitur sub nomine *Sinapisii*. Excälefacit summopere cutem, fere tamquam ignis calor hue derivatus, atque horæ circiter spatio cutem rubefacit, haud secus ac si igne cre-

cremata esset. Si diutius durat actio sinapis, ruberimur evadit locus. Hic color ruber sensim increvit, sublato sinapismo, cum sensatione caloris urentis, & cutis ulterius lente inflammatur sua sponte, facie erysipelacea, ad tactum dolens. Post nonnullos dies cutis loci affecti rigescit, persistente rubidine, & tandem desquamatur cum pruritu. Si vero justo diutius Sinapismus remanserit, cutis non desquamatur, verum sensim, h. e. post unum alterumve diem, ve serius, in vesicam elevatur, qua aperta, relinquitur ulcus manans, tardissime consolidandum. Sæpe rubor in gangrenam vergit, si diutius adhuc linquatur Sinapismus. Sed, quod mireris, Sinapi, adeo acre quando cuti applicatur, innoxie, tamen edi potest, ventriculo minime acre.

OBS. 3. In culinis miscetur pulvis Sinapios cum acetato, vel teritur cum cerevisia, & editur juxta carnes.

OBS. 4. In Tertiana semina Sinapios cum successu propinavit cl. J. T. FAGREUS. Vidi, hæc semina paroxysmum tertianæ vernalis exquisitæ bene sustulisse, idque ita, ut infirmi postea relapsi vix fuerint proni. Sumenda sunt semina integra, mensura cochlearis majoris, quater vel quinques de die, sub apyrexia, & absque masticatione deglutienda. Abstineant ægri a potu calido post sumta semina. Hac methodo non afficiunt primas vias, nec ardorem iis imprimunt; sed alvum leniter ducunt. Atque sic procedendum, usque dum febris evanescat, quod plerumque brevi sit. Ego plures hacce via curavi, & nullam noxam insecuram vidi. Sed in quartanis autumnalibus hæc semina nequicquam profuerunt. In febribus intermitt. protractis & repullulantibus semina Sinapios pulverata cum Chinchina junxi, neque id sine bono effectu; sed ardorem in ventriculo subinde passi sunt ægri, tamen absque detramento.

365. RAPHANUS sativus. LINN. Sp. pl. 935. Mat. m. 325.

Raphanis. DOD. Pemptad. 665.

Raphanus minor purpureus. LOBEL. Hist. 99. Pharm. & Culinis RAPHANI Radix recens. Locus. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. Radix globosa, s. cylindrica, alba, magnitudine ovi columbini vel supra, lævis, infima basi fibra filiformi, fibrillata, descendente; parenchymate carnosum, succulento, fragiliuscum, albo; post sectionem transversalem centrali parte amplissima, radiato-stellata: radibus subdiaphanis; corticali parte firmiore.

PROPR. rec. Odor subfragrans; sapor calidiusculus, vix amaricans, acris; corticalis pars anterior; masticata non solvitur, sed comminuitur, succo aquoso, sapore acris, fugaci. Cocta fere insipida. Siccata absque odore est, & tantum non sine sapore.

VIRTUS; antiscorbutica, diuretica, rustatrix. *USUS.* Scorbatus, Asthma, Raucedo, Ischuria.

OBS. Syrupus, frigide paratus, bonus est, si modo recens.

B.) Raphanus niger. BAUH. Pin. 96.

Raphanus magnus. LOB. Hist. 99.

Culinis RAPHANI NIGRI Radix.

Locus. Colitur in hortis. Biennis.

FORMA. rec. Radix fusiformis, spithamea, superne rotundata, deorsum sensim attenuata, fusco-nigrescens, rugosa, striis transversalibus, sparsis, albidis, fibris & fibrillis serie longitudinali utrinque dispositis. Parenchyma carnosum, album, fragiliuscum; post sectionem transversalem centrali parte amplissima, radiato-striata: striis

striis constantibus e punctis longitudinaliter dispositis; corticali parte firmiore.

PROPR. Odor Raphani; sapor calidus, intensius acris, præcedenti longe fortior.

VIRTUS: ut in priore varietate.

USUS: culinaris.

OBS. Existantur ambæ hæ radices crudæ cum sale. Raphanus niger diutius hiemis vim sustinet.

366. ISATIS tinctoria. LINN. Sp. pl. 936. SCHWENCK.

Gewaff. 387.

Isatis. BLACKW. *Herb.* t. 246.

Glastum sativum. LOB. *Hist.* 189.

Pharm. *ISATIS* Herba, præparata.

Locus. Europa, in littoribus maritimis. *Bien-nis.*

FORMA. rec. *Radix* cylindrica, palmaris, albida, descendens. *Caulis* erectus, simplex, teretiulus, inter folia alternatim & obsolete digonus, glaber, viridescens, sed ex fusco minutim nebulosus, bi-vel tripedalis. *Folia* alterna, frequentia, lanceolata, sagittata, sessilia, glabra, integerrima, subsucculenta, ereta; inferiora obtusa, inferne attenuata; superiora acuta, superne ciliata. *Corymbus* florum terminalis, glaber, nudus, compositus e corymbulis, subrotundus; fructifer vero constat totidem racemis seminum. *Bractæ* lineares, hastatae, acutæ, ciliatae, ad exitum pedunculorum solitariae. *CAL.* Perianth. luteum, 4-phylum: foliolis ovali-linearibus, obtusis, concavis, laxiulculis, apice pilosis. *COR.* cruciformis, lutea; *Petalis* obovatis, obtusis, inferne attenuatis, sessilibus, erecto-patentibus, calyce longioribus. *STAM.* Filam. 6, subulata, lutescentia, longitudine fere corollæ; quorum 2

opposita paullo breviora. *Anth.* linearicordatae, *incubentes*, luteæ. *PIST.* *Germen* ovale, lutescens, obtusum, compressum, lateribus utrinque carinatis, staminibus brevius. *Styl.* nullus. *Stigma* capitato-truncatum, luteum.

PROPR. herbæ rec. *Odor* vix ullus; *sapor* herbaceus, subamaricans, acriusculus.

VIRTUS.

USUS. tinctorius.

OBS. I. Istatis *præparata* tinctoribus vulgaris est ad lanas cæruleo tingendas. Folia recentia bene matura colliguntur, & in umbraculo ponuntur, ut marcescant. Deinde molæ subjiciuntur, inque pastam rediguntur, manibus pedibusque bene subigendam. Tum formantur ex hac pasta cumuli læviusculi, & bene compressi, ne nimium evaporent. Postquam superficies sensim exaruit, sponte induitur cumulus crux, quæ diligenter curanda, ne rimas apertas agat. Post 14 dies totam pastam agitare oportet, crustamque bene comminuere, quo facto inde formantur globuli, singuli plurium unciarum, qui manibus bene comprimendi, ut duriusculi evadant, tumque in sole vel furno probe siccandi. Quo recentiores hi globuli, eo minus tinctorii sunt; qui per 8 vel 10 annos servati sunt, optimi censentur. Materies colorans consistit in resinoso, quare alkalinis extrahenda. De methodo Istatin tinctoriam collendi, atque etiam præparandi, consuli potest ASTRUC (*).

CLAS-

(*) *Mémoir, pour l'histoire de Languedoc*, p. 523. seq.

CLASSIS XVI.
MONADELPHIA.
ORDO
POLYANDRIA.

367. ALTHÆA officinalis. LINN. Sp. pl. 966.

Mat. m. 338. KNIPH. Bot. orig. cent. 6.

Althæa Dioscoridis. ZANNICH. Venez. t. 236.

Althæa. CAMER. Epit. 667. LUDW. Ectyp. p. 1.
t. 1.

Althæa, Ibiscus. DODON. Pempt. 644.

Pharm. ALTHÆÆ Radix, Herba.

Locus. Europa media, in subhumidis. Peren-
nis.

FORMA. rec. *Radix* majuscula, superne ver-
sus caulem ramosa: ramis pedalibus, descenden-
tibus, teretibus, simplicibus, crassitie digiti vel
pollicis, extus cinereo-albida, subrugosa: rugis
transversalibus. *Parencyma* subcarnosum, album;
post sectionem transversalem striatum: striis ra-
diantibus, albidiioribus, subobsoletis, a centro ad
peripheriam undique spectantibus; centro me-
dullari ampliore, notato annulo incarnato, sub-
crenato; corticali parte subearnosa. *Caules* plu-
res ex una radice, bipedales, erecti, teretes, sca-
bri, hirti, inferne rugosi, ramosi. *Rami* alterni,
erecti. *Folia* alterna, petiolata, patentia, corda-
to-subrotunda, utrinque villosa s. tomentosa,
mollia, 5-loba: lobis rotundatis, inæqualiter &
grosse ferratis; 5-nervia, venosa. *Petioi* longi-

tudine foliorum, semiteretes, scabri, supra plano-canaliculati. *Stipulae* 2, lanceolatae, acutae, oppositae, ciliatae, pubescentes. *Racemus terminalis*, subcompositus, floribus pedunculatis, cernuis. *Foliola* tenera loco bractearum, lobata. *Pedunculi* teretes, tomentosi, uniflori. *CAL.* Perianth. *exterius* 1-phylum, tomentosum, concavum, cinereum, venulis viridibus reticulatum, trifidum: sinibus exstantibus: laciniis ova-tis, trifidis; lateralibus rotundatis; *intermedia* acute, longius producta; *interius* 1-phylum, densius tomentosum, molle, campanulatum, intus glabrum, annulo elevato in medio calycis, longitudine calycis exterioris, 5-fidum: laciniis ovoato-acutis, erectis. *COR.* incarnata. *Petala* 5, calyce duplo longiora, unguiculata, obcordata, erecto-patentia, striata venis parallelis, apice ramosis; biloba: lobis obtusis; sinu profundo, rotundato; unguibus brevibus, margine utrinque ciliato-barbatis. *STAM.* *Fil.* plurima, monadelpha, corolla duplo breviora, alba; columna cylindrica, tomentosa, e receptaculo corollæ surgens, filamentis superne liberis, glabris, inferne pilosis, undique patentibus. *Antheræ* undique echinatae. *PIST.* *Germen* interum respectu corollæ, sed superum respectu calycis, orbiculatum, depresso, margine crasso, undique longitudinaliter striato. *Stylus* cylindricus, breviusculus. *Stigmata* plurima, subulata, staminibus breviora.

PROPR. *rec.* & *sicc.* *radic.* Odor nullus; sapor subdulcescens; *masticata* emollitur, lubrica & valde mucilaginosa sentitur. *Herbe*, nempe folior. & florum: odor nullus; sapor herbaceus; inter *masticandum* mucilaginosum exhibet.

VIR.

VIRTUS: emolliens, lubricans, demulcens.
USUS. Ulcus vesicæ, Ischuria, Raucedo, Tussis, Tenesmus.

OBS. 1. Si planta in solo conseritur minus idoneo, h. e. nimis elevato aridoque, radix saepius gangræna in centro & intra corticem corripitur; quamobrem rationem soli habere oportet, ubi radix plantæ quæritur.

OBS. 2. *Infusum* aquos. *radic.* sicc. & decorticata. lutescens, odore nullo, sapore miti, mucilaginoso; vitr. martis rufescit, coagulatur, h. e. mucilaginosum præcipitatur, quod etiam fit ex addito alcohole vini. *Herba* sicc. infusum lutescens, sapore herbaceo; vitr. martis paullulum fuscescit. *Mucilaginosa* substantia e radice recente extrahitur aqua frigida calidave; corticalis pars mucilaginem dat limpidam, instar aquæ; medullaris vero opalescentem. Radix magis mucilaginosa est, quam herba.

368. ALCEA rosea. LINN. Sp. pl. 966. Mat. m.

340. KNIPH. Bot. orig. cent. 6.

Malva hortensis multiplici flore. DOD. *Pempt.*

641.

Pharm. MALVÆ ARBOREÆ Flores.

Locus. Oriens; colitur in hortis. *Biennis.*

FORMA. rec. *Racemus* terminalis, floribus magnis, brevius pedunculatis. *CAL.* Periantb. *exterius* 1-phylum, tomentosum, hirtum: pilis rigidiusculis, palmatis; profunde 6-fidum, saepe subnovemfidum: laciniis ovato-lanceolatis, acutis, striatis, laxiusculis; *interius* 1-phylum, pariter tomentoso-hirtum, striatum, exteriori longius, 5-fidum: laciniis ovato-lanceolatis, margine undulatis, acutis, erectis. *COR.* calyce duplo longior, 5-petala (saepius plena) purpurea: *Petatis* im-

imbricatis, patentibus, obovatis, latis, subtruncatis, vix retusis, venosis, brevius unguiculatis: unguibus viridescentibus, utrinque barbatis.
STAM. Filam. plurima, monadelpha, corolla duplo breviora; columnæ pentagona, glabra, viridescentes, ex receptaculo corollæ surgens, filamentis superne liberis, glabris, undique patentibus. Antheræ subrotundæ, undique echinatae.
PIST. Germen intra receptaculum, orbiculatum, depresso, viridescentes, glabrum, superne minutum tomentosum. Styli plurimi, rubri, intra columnam staminum, illisque longiores. **Stigma-ta** simplicia.

PROPR. rec. Odor nullus; sapor debilissimus, vix ulla; masticata petala lubrica, mucilaginosa.

VIRTUS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

OBS. I. *Infusum* aquos, spissum, purpureum, odore nullo, sapore mucilaginoso; dilutum vitriolo martis fuscescit.

369. MALVA rotundifolia. LINN. Sp. pl. 969.

Mat. m. 339.

Malva sylvestris pumila. LOB. Hist. 371. DOD.

Pempt. 642.

Pharm. *MALVÆ VULGARIS* Herba.

Locus. Europa, in ruderatis, plateis. *Annua.*

FORMA. recent. *Radix* cylindrica, descendens, alba. *Caules* plures ex una radice, patenti-procumbentes, teretes, spithamei, pubescentes. *Folia* alterna, petiolata, utrinque minutim pubescentia, scabriuscula, subrotundo-reniformia, 5-vel 7-loba: lobis rotundatis, margine serrata, subtus subseptemnervia, supra nervis linearata, vix pollicaria. *Petiolæ* teretes, elongati, pu-

pubescenti scabri, supra sulcati. *Stipulae* 2, oppositæ, parviulcū'æ, lanceolatae, acutæ, ciliatæ, pubescentes. *Flores* gemini, pedunculati, axillares e foliis, pedunculis petiolis brevioribus, filiformibus, teretibus, pubescentibus, saepius inæqualibus. *CAL* Perianth. exterius triphyllum: foliolis linearis-subulatis, obtusis; interius campanulatum, pubescenti-scabrum, 5-fidum: lacinias ovato-acutis, erectis, carinatis, margine ciliatis, subundulatis. *COR*. alba. *Petala* 5, linearicuneiformia, obtusa, emarginata, calyce paullo longiora, erecta, subsessilia. *STAM*. Filam. plurima, monadelpha; columna cylindrica, glabra, corolla breviore, superne breviter libera. *Anth*. parvæ, subrotundæ, echinatae, undique nutantes. *PIST*. Germen orbiculatum, depresso, intra receptaculum corollæ. *Styli* plures, subulati, erecti, vix pubescentes, longitudine statim, *Stigmata* simplicia.

PROPR. rec. *Odor* nullus; *sapor* herbaceus, debilis; *masticata* folia lubrica, mucilaginosa.

VIRTUS: emolliens, lubricans; rec. laxans;

USUS. Itchuria, Colica nephritica, Clysmata.

OBS. 1. *Infusum* aquosum lutescens Theæ potus instar, odore nullo, sapore herbaceo; cum vitr. martis nigro fusculet.

OBS. 2. Malva veteribus culinaris fuit: *Me pa-*
scunt Olivæ, me Cichoria lævesque Malvæ; HORATI.
Comedebatur uti Spinacia apud nos; sed alvum du-
cebatur: *Exoneraturas ventrem mihi villica Mal-*
vas Attulit, & varias, quas babet hortus, opes;
MARTIALIS Ita bene Malvam aliasque herbas condire
sciebant lauiores Romani, ut nihil posset esse savius,
fa-

fatente ipso CICERONE (*), qui se proinde dicit, in
cenā augurali apud LENTULUM, facile quidem ostreis,
& murænis abstinere potuisse, at a Beta & Malva fui-
se deceptum, tamque luxuriose delicias istas comedis-
se, ut gravis 10 dierum diarrhœa ipsum arripuerit.

370. GOSSYPIUM herbaceum. LINN. *Sp. pl.* 975.

Mat. m. 341. KNIPH. Bot. orig. cent. 8.

Goslipium. CAMER. Epit. 203. DOD. Pempt.

66. RUMPH. Amboin. 4. p. 33. t. 12.

Pharm. GOSSYPII Semina, Lana.

Locus. India, Bienne.

FORMA. Capsula pollicaris, subrotunda, sca-
brida, minutim muricata, acuta, 4-locularis, 4-
valvis: valvulis post maturationem semenum pa-
tentissimis, latere interiore longitudinaliter dehi-
scientibus. Semina ovalia, tomentosa, alba, magni-
tudine seminis Pisii, undique vestita *Lana* nivea, e-
longata, implexa; parenchymate cotyledoneo, al-
bido, intra testam cartilagineam; post sectionem
transversalem disco æquali, picto venuis concen-
tricis, approximatis, adsperso punctis nigrican-
tibus.

PROPR. sicc. semin. Odor nullus; Sapor dul-
cescens; masticata comminuuntur, saliva emul-
siva. *Lana* levis, mollis. Turunda bombyci-
na scintillis non accenditur, nisi admoto carbo-
ne bene ignito; e flamma admota subito accen-
ditur, undique flagrat: flamma fremente, vivi-
da, velocissima, mox extincta; durat dein ignis
gliscens, serpens, fulgurans, fumo fere lintei
accensi, graviore tamen, remanente cinere fu-
sco,

(*) *Epistol. libr. 7. epist. 26.*

ſco, levissimo, tomentoſo, ex preſſione diſti fa-
cile fatiſcente, inquinante.

VIRTUS Seminum: obtundens.

USUS Lanæ: mechanicus.

OBS. 1. Semina, quæ in officinis obvenire ſolent, omnia effēta deprehendi; recentia *Oleum* expreſſum dant.

OBS. 2. Lana bombycina loco Moxæ adhiberi potest, mitius vero urit (*).

OBS. 3. Gossypii lana ex pluribus hujus generis ſpeciebus deſumitur. Gossypium etiam in America coſtituitur. Cl. P. NICOLSON (**) americanam methodum tradidit Gossypium colendi.

371. HIBISCUS Abelmoschus. LINN. Sp. pl. 980.

Mat. m. 342.

Alcea hirsuta flore flavo ſemine moschato.

MARCGR. Brasil. 45. t. 45. BROWN. Fam.
285. n. 4.

Flos moschatus. MERIAN. Surin. p. 42. t. 42.

Granum moschatum. RUMPH. Amboin. 4. p.
38. t. 15.

Cattu-gasturi. RHEED. Malab. 2. p. 71. t. 38.

Pharm. ABELMOSCHI Semina.

Locus. India utraque. Arbor.

FORMA. Semina fusca, reniformia, magnitudine ſeminis Pisi minoris, compressiſcula, undique ſtriata: ſtriis parallelis, atomis excava- tis adaspersis: hilo in ſinu ſeminis.

PROPR. ſicc. Odor ambroſiacus, fragrans.
Sapor odori congruens. Semina accenſa fumum ambroſiacum ſpargunt.

VIR-

(*) Cfr. §. 419. B. ubi de Moxa agitur.

(**) *Essai sur l'histoire naturelle de S. Domingue*, p. 40. seq.

VIRTUS: nervina.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum seminum integr. aqueum, limpidum, lutescens, odore ambrosiaco, sapore fatuo; *Decoctum* limpidum, lutescens, odore debiliore; vi-
triolo martis color non demutatur.

CLASSIS XVII.
DIADELPHIA.
ORDO
HEXANDRIA.

372. **F**UMARIA bulbosa. LINN. *Sp. pl. 983. Mat. m. 344. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.*

Fumaria bulbosa radice cava major. GARID.

Aix. t. 38.

Radix cava. DOD. Pempt. 325. LOB. Hist. 439.

Pharm. ARISTOLOCHIÆ FABACEÆ Radix.

Locus. Europa, in umbrofis. Perennis.

FORMA. *Bulbus* subrotundus, magnitudine Pisi majoris vel ultra, subrotundus, compressiusculus, fulco-ferrugineus, supra & infra depresso, laeviusculus; *parenchymate* solidiusculo, firmo, æquali, dilute lutescente; post sectionem transversalem centro medullari parviusculo, rotundo, saepe cavo. *Varietas* alia in officinis occurrit, radice majore, centro omnino cavo.

PROPR. *rec. & sicc.* *Odor nullus; sapor amarus.*

VIRTUS: pellens.

USUS.

OBS. *Infusum aquos. lutescens, limpidum, amarum, odore vix ullo; a vitr. martis color non alteratur.*

373. FUMARIA officinalis. LINN. *Sp. pl. 984.*

Mat. m. 343. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Fumaria officinarum & Dioscoridis. ZAN-
NICH. Venez. t. 247.

P P

Fu-

Fumaria. BLACKW. *Herb.* t. 237. DOD. *Pempt.* 59.
Pharm. *FUMARIÆ* Herba.

Locus. Europa, in cultis. *Annua.*

FORMA. rec. *Radix* filiformi-fusiformis, pallida, descendens, apice fibrillosa. *Caulis* succulentus, fragilis, erectus, dodrantalis, flacidus, subflexuosus, pentagonus, laevis, ramosus. *Rami* alterni, recti, cauli conformes, prope radicem diffusi. *Folia* alterna, petiolata, duplicato-pinnata: pinnis & pinnulis alternis, distantibus, petiolatis: lobis subsucculentis, cuneiformibus, inciso-pinnatifidis; laciniis ovali-linearibus, obtusis, submucronatis, dilute viridescentibus, undique glabris, subtus pallidioribus. *Petiolæ* communes triangulares, recti; partiales subflexuosi. *Racemi* florū laterales, oppositifolii, pedunculati, nudi, recti, floribus sparsis, patentibus, pedunculatis. *Bracteæ* solitariæ, lineares, acuminatae, pedicellis subjectæ, illorumque longitudine. *CAL.* *Perviantb.* diphyllum: foliolis lanceolatis, acutis, membranaceis, ferratis, deciduis. *COR.* 4-petala, dilute subviolacea. *Petala* linearia, subæqualia, concava, superne carinato-gibba, obtusa; quorum 2 opposita apice rubicunda; 2 vero alia opposita apice concreta, purpurea, dorso alato-carinata, emarginata cum acumine parvo. *NELLARIUM:* cornu subrotundum, obtusum, compressum, ad basin petali supremi. *STAM.* *Filam.* 2, membranacea, inferne ovata, superne subulata, corolla paullo breviora. *Antb.* 6, subrotundæ, parvæ, 3 in singulo filamento. *PIST.* *Germen* superum, ovatum, obtusum, glabrum. *Stylus* longitudine staminum, subulatum. *Stigma* cernuum, capitatum, barbatum.

PROPR. rec. *Odor* contusæ herbae tanquam ole-

oleris; *Sapor subingratus*, amarus; *masticata* sub-succosa, saliva viridescente. *sicc.* fere amarior.

VIRTUS: corroborans, tonica, antiscorbutica.

USUS: Cachexia, Hypochondriasis, Morbi cutis.

OBS. Extrahitur menstruo aquoso & spirituoso. *Infusum* aquos. rubicundum, amarum; vitr. martis nigro-fuseescit. *Extractum* aquosum amarum salinum; spirituosum minus amarum. Herbae Fumariæ libræ 27 dant Extracti aquosi circiter libr. I.

ORDO OCTANDRIA.

374. POLYGALA Senega. LINN. *Sp. pl.* 990. *Mat.* m. 345. *Amoen. Acad.* 2. p. 139. t. 2.

Polygala virginiana foliis oblongis, floribus in thyrsò candidis, radice alexipharmacæ.

MILL. *Diet. artic. Polyg. cum fig.*

Senegau. TREW. *Commerc. litt. Norimb.* A. 1734. p. 369. t. 4. f. 1. 2. 3.

Pharm. SENEGÆ Radix.

Locus. Virginia, Pennsylvania, Canada. *Perennis.*

FORMA. Radix cylindrica, rursum prorsum flexa, digitalis, cinerascens, nodulosa: callis lateralibus, alternis, frequentibus, transversaliter rugosis: rugis annularibus, approximatis; terminata capite difformi, torulofo, constante ramulis brevissimis vel cicatricibus, vel turionum rudimentis. *Parencyma* recent. subcarnosum, albidum, fibra centrali, longitudinali, lignea, ut in Ipecacuanha; post sectionem transversalem notatum centro medullari orbiculato, ligneo, albo,

obducto corticali parte carnosa, post sectionem longitudinalem facile a fibra lignea secedente. *Siccata* dura, fragilis.

PROPR. rec. & sicc. *Odor* peculiaris, debilior, non ingratus; fortior in recente. *Sapor* odori congruens. *Masticata* corticalis pars comminuitur, remanet fibra lignea; sapor primum calidiusculus, deinde acidulus in faucibus sentitur, cum specie acrimoniæ, inhærens cum siccitate.

VIRTUS: subemetica, diuretica, diaphoretica, subpurgans, expectorans.

USUS. Morbus serpentum.

OBS. 1. *Infusum* aquosum limpidum, subcitrinum, odore debili, sapore forti radicis, acidulato; cum vitr. martis color nil variat.

OBS. 2. Ut specificum adversus serpentum morsum ab Americanis diu adhibita est hæc radix, istamque ejus efficaciam postea plurimi adstruxerunt. In eo casu radix interne propinetur, dosi scrup. i vel drachm. $\frac{1}{2}$, bis vel ter de die, radixque masticata externe vulneri applicetur. Ob peculiarem hujus radicis saporem, medici eam in variis quoque aliis casibus conducere arbitrati sunt, illamque ideo propinarunt in pleuritide, hydrope, asthmate, phthisi pulmonali, arthritide &c. nec in fructuofasam in quibusdam deprehenderunt; ego tamen censeo, caute esse adhibendam, dum febris urget pulsusque durus est.

ORDO DECANDRIA.

375. GENISTA canariensis. LINN. *Sp. pl.* 997.

Mat. m. 347.

Cytisus 1. CLUS. *Hist. i.* p. 94.

Cy-

Cytisus canariensis semperfurens & incanus.

COMMEL. *Hort. 2. p. 103. t. 52.*

Pharm. RHODII Lignum.

Locus. Insulæ Canariæ Arbor.

FORMA. *Lignum* in frustulis cylindricis, distortis, crassitie 1 vel 2 pollicum, ponderosum, solidum, durum; alburno albido, tenuiore; medullari parte amplissima, viridi-rubescente; post sectionem transversalem notatum disco discolore, undique distincto striis minutissimis, a centro ad peripheriam tendentibus, parallelis, undique etiam adsperso punctulis parvis, frequentibus, sparsis; centro medullari amplissimo, in medio saturatus tincto, versus marginem vero dilutius. *Lignum* vestitum est *cortice* cinereo-brunneo, rugoso, tenuiore.

PROPR. *ligni* rasi s. fricati: *Odor* fragrans, fere Rosæ damascenæ, gratus; *sapor* ligni pulverati gratus, rosaceus, leniter amaricans, lingvæ inhærens calidiusculus. *Pulvis* e ligno raso flavescit. *Corticis* odor & sapor debiles, non rosacei.

VIRTUS.

USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquosum scobis ligni colore aqueolutescenti, odore grato, rosaceo, fragrante; sapore rosaceo, leniter aromatico; vitriolo martis haud demutatur. *Oleum stillat.* luteum, odore rosaceo, grato, sapore amaricante, aromatico. E *Ligni* libr. 80 cl. BAUMÉ obtinuit drachm. 9 olei still. levis, lutescentis, odore præstantissimo; sed ex eadem quantitate ligni Rhodii seleetioris, durioris, magisque resinosi, alia vice olei still. unc. 2 accepit cl. vir. *Aqua still.* fragrans, aquæ Rosarum æmula. *Extractum* spirituosum

fragrans, rosaceum, tenax. Extr. aquos. vix olidum, amaricans.

OBS. 2. Difficile est invenire hoc lignum selectum in nostris officinis. Id, quod descripsi, humanitati cl. EDV. SANDIFORT deboe. Communiter in pharmaco-polii, sub nomine Ligni Rhodii occurrit lignum quoddam cylindricum, crassitie pollicis vel supra, solidum, durum, pallidum, post sectionem transversalem notatum circulis concentricis, striis radiantibus, & punctulis sparsis; sed odore debili, subrosaceo, sapore amaricante, cuius infusum aquos. rubescit & cum vitriolo martis leniter fuscescit. Inveni etiam in officinis radices arboris, distortas, crassitie fere brachii, pedales vel ultra, extus cinereas, parenzymate ligneo, durissimo, rubescente, centro saturatius tincto; odore grato rosaceo; unde patet, radicem arboris pari fragrantia pollere, atque ipsum truncum.

376. GENISTA tinctoria. LINN. *Sp. pl. 998. Mat. m. 346. KNIPH. Bot. orig. cent. 6. ZANNICH. Venez. t. 165. CLUS. Hist. i. p. 101. DODON. Pempt. 751.*

Tinctorius flos s. Genista humilis. DALECH. *Hist. 175.*

Pharm. GENISTÆ Folia, Flores, Semina. Locus. Germania, Anglia, Svecia. Frutex. FORMA.

PROPR. Odor nullus. Sapor amaricans.

VIRTUS: pellens, purgans, tinctoria.

USUS. Hydrops.

377. ONONIS spinosa. LINN. *Sp. pl. 1006. Mat. m. 357.*

Ononis montana præcox purpurea frutescens.

DUHAM. Arbr. i. p. 57. t. 21.

Ano.

Anonis spinosa flore purpureo. ZANNICH. Venez. t. 210.

Anonis. BLACKW. Herb. t. 301. DOD. Pempt. 731.

Pharm. ONONIDIS Radix, Herba.

Locus. Europa, in agris, aridis. Perennis.

FORMA. rec. *Radix* spithamæa, sæpe pedalis vel ultra, cylindrica, crassitie pennæ cygneæ, sæpe digitæ vel pollicis, fibrillosa, extus fusca, descendens; *parencymate* solidiusculo, albido; post sectionem transversalem centro medullari striato-radiato, obducto disco latiore, minutim reticulato, & striis longitudinalibus, frequentibus, ad corticem pertingentibus. *Caulis* plures ex una radice, procumbentes, teretes, villosi, dodrantales s. pedales, ramosi: *ramis* paucis sub-digitalibus, divaricato-patulis, spinosis: spinis rigidis, pungentibus, unguicularibus, foliosis & floriferis. *Folia* caulina ad ramulos, alterna, breviter petiolata, ternata: foliolis ovalibus, obtusis, supra glabriusculis, subtus pubescentibus, margine ferratis; extimo serrato; *ramorum* vero & *spinarum* simplicia. *Stipulae* solitariae, planæ, latæ, lineares, obtuse s. truncatae, ferratae, vaginæ loco petiolum basi terminantes. *Flores* in summitate caulis, in ramis s. in spinis, solitarii, brevius pedicellati, axillares e foliis parvis. CAL. Perianth. 1-phylum, turbinato-tubulatum, hirsutum, striatum, angulatum, 5-fidum: laciniis linear-lanceolatis, obtusiusculis, carinatis, erectis, æqualibus; 4 supremis parallelis, approximatis; infima sub carina. COR. papilionacea, calyce duplo longior. Vexillum orbiculatum, obtuso-rotundatum, conduplicatum, ceteras partes floris includens, dilute rubicundum, extus

pubescens, erectum, basi striatum; ungve breviore. *Alæ* 2, albidæ, cuneiformes, vexillo ferre duplo breviores, obtusæ, basi semisagittatæ; ungve parvo linearí, incurvato. *Carina* albido-rubescens, reniformi-triangularis, apice subconico, compressio, adscendente, basi antice & pone fissâ, alis tere longior; ungvibus 2 parvis. *STAM.* *Filam.* 10, in vaginam tubulatam, superne fissam, cuncta convexa, carinæ inclusa. *Anth.* subrotundæ, nutantes. *PIST.* *Germen* superum, parviusculum, viridescens, ovatum, apice hirtum. *Stylus* filiformis, glaber, adscendens, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PROPR. rec. radic. *Sapor* seminis Pisi siccati; *Odor* consimilis; *masticata* tenax, vix comminuitur, saliva non tincta; *Herbæ odor* & *sapor* æquales, tere herbae Pisi, sed foetidiusculi; *masticata* subtenerior, saliva viridi.

VIRTUS: diuretica, aperiens.

USUS. *Ischuria* calculi vesicæ, Sarcocèle.

OBS. 1. *Infusum* radicis rec. limpidum, tenui, colore potus Theæ, sapore seminis Pisi, gravi, odore congruente, gravi. *Decoctum* radicis rec. ingratum, amarum; vitriolo martis non demutatum. *Infusum* herbæ recentis luteum Theæ instar, odore & sapore debili; vitriolo martis fuscescens.

OBS. 2. *Decoctum* radicis Ononidis insignem levationem afferre saepius vidi in *Ischuria* ex calculo vesicæ, ubi emulsiva omnia atque mucilaginosa incassum exhibita fuere. Radicis drachmæ 3 vel 5, in aqua pura elixatæ, colaturæ libr. 1 responderunt. In *Sarcocèle* etiam radix hæc commendatur. Vidi ego senem nobilem, qui per plures septimanæ sumsit radic. drachm. 1, bis de die, cum notabili decrescentia sarcocèles, tandemque laudabili resolutione. Cel. Ol. ACREL, qui amplissimam.

mam praxin feliciter exercet, tres ægros, hydrosarcocele afflitos, post usum radicis Ononidis restitutos vident, & quidem plenaria resolutione. Horum unus tumorem testiculi habuerat, magis ad hydroccelen vergentem, subopacum tamen. Verum est quod asserit ALEX. PSISTERUS, radicem Ononidis interdum valde movere ægrotos, quod ipse etiam observavi.

378. PHASEOLUS caule volubili, racemis multifloris, bracteis pedicellorum solitariis ovatis, leguminibus linearibus.

Phaseolus vulgaris. LINN. *Sp. pl.* 1016. *Mat.* m. 351. LOBEL. *Icon.* 59.

Dolichus f. *Phaseolus.* DOD. *Pempt.* 509.

Smilax hortensis f. *Dolichos.* DALECH. *Hist.* 474.

Culinis PHASEOLI Legumina virentia, Semina.

Locus. India. Colitur ubique in hortis. *Annuus.*

FORMA. rec. Racemi axillares, pubescentes, solitarii, erecti, multiflori, fructibus geminis, quadrijugis, pedicellatis. Bracteæ solitariæ, glabrae, pedicellis subjectæ, sessiles, ovatae, acutæ, concaviusculæ, striis parallelis, patentes, apice inflexæ; ad calyces vero 2 oppositæ, reliquis conformes, obtusæ, subpatentes, calyce longiores. Perianth. campanulatum, ore superne truncato, inferne tridentato: laciñiis ovato-acutis; intermedia paullo majore. Legumina pendula, fragilia, spithamæa, viridia, linearia, recta, dorso grossius repanda, glabra, sed minutissime oblique & interrupte striato-rugosa, versus basin paululum attenuata, apice terminata mucrone conico-subulato, transversim compresso, incurvato; immatura multilocularia, carnoſo-succulenta; ma-

tura coriacea, polysperma. *Semina* matura nitidiuscula, alba, ovali-oblonga, reniformia, utrinque compresso-planiuscula, hilo albo in sinu, obducta tunica pergamenta; *parenchymate* albo, cotyledoneo, bipartibili.

PROPR. rec. leguminum: *Odor crudus*, h. e. moderate subhircinus; *sapor dulcescens*, subnau-*seosus*; *masticata* subtenera, succosa, saliva subviridescente. *Cocita* tenera, sapida. *Seminum* maturorum *sapor* seminis Pisi.

OBS. Semina hujus generis, matura siccataque, *amylum* dant, uti semina Pisi; cocta & comesta, nutritunt bene, tamquam Pisa, sed flatulenta non sunt.

379. PHASEOLUS caule volubili, racemis multifloris, bracteis pedicellorum ternis lanceolatis, leguminibus acinaciformibus hirtis.

Phaseolus puniceo flore. CORNUT. *Canad.* 184.

Culinis PHASEOLI FLORALIS Legumina virentia.

Locus. Colitur in hortis. *Annuus.*

FORMA. *rec. Racemi* axillares, elongati, multiflori, leguminibus geminis, pedicellatis. *Bracteæ* 3, parvæ, lanceolatæ, acutæ, ad pedicellos, glabriusculæ; quarum exteriore reflexæ; *intermedia* erecta, paullo major; calycum vero 2 oppositæ, calycis basi utrinque adnatæ, lineariorales, calycis longitudine. *Perianth.* campanulatum, truncatum, ore subbilabiato, superne emarginatum, inferne minutim tridentatum. *Legumina* pendula, acinaciformia, compressa, utrinque attenuata, apice acuto, transversaliter compresso, subtus sulcato; minutim rugosa, villosa-hirta, dorso tuberculata, bipollucaria vel ultra, trisperma.

PRO-

PROPR. rec. *Odor subhircinus. Sapor dulcescens, odori congruens; masticata parencymate tenero, corticali parte tenaciore, saliva subyiridescente; cocta priori sapidiora.*

VIRTUS &

USUS, ut in antecedente.

380. *PHASEOLUS* caule subvolubili, pedunculis axillaribus, quadrifloris, calycibus superne truncatis

Culinis PHASEOLI SACCHARATI Leguminna virentia, Semina.

Locus. Colitur in hortis. *Annuus.*

FORMA. rec. *Pedunculi teretes, axillares, erecti, quadriflori, pubescentes. Bracteæ ovatae, acutæ, nervoso-striatae, glabrae, patentes, pedicellis subjectæ, solitariae; 2 vero oppositæ calyci subjectæ, reflexo-patentes, calyce majores. Perianth. glabrum, parviusculum, truncatum, subtus paullulum productum, tridentatum. Legumen carnosò-succolum, fragile, teretiusculum, utrinque compressum, apice mucronatum: mucrone transversaliter compresso, utrinque sulcato; palmare, incurvatum, atomis oblongiusculis minutim subrugosum, ceterum glabrum, pentaspermum. Semina ovata, ferruginea, utrinque truncato-rotundata, compressa, glabra, nitidiuscula, semiungvicularia, hilo laterali, oblongo; parencymate albo, bipartibili.*

PROPR. rec. *legumin. Odor subhircinus; sapor dulcescens, ab odore non ab ludens; cocta tenera, sapidiora.*

VIRTUS &

USUS, ut in antecedentibus.

381. PHASEOLUS caule brevi erectiusculo diffuso, pedunculis oppositifoliis, calycis labio superiore emarginato.

Phaseolus nanus. LINN. Sp. pl. 1017.

Phaseolus vulgaris italicus humilis s. minor, albus cum orbita nigricante. BAUH. Hist. 2. p. 358.

Culinis PHASEOLI NANI Legumina virentia, Semina.

Locus. India. Colitur in hortis. *Annuus.*

FORMA. rec. Pedunculi oppositifolii, erecti, teretes, pubescentes, nudi, multiflori, 4-vel 6-flori, leguminibus geminis, distantibus, pedicellatis. Bracteæ ovatae, acutæ, glabræ, nervis parallelis striatae, patentæ, ad pedunculos solitariae, ad calycem vero oppositæ, calyce longiores. Perianth. persistens, urceolatum, viride, vix pubescens, superne emarginatum, bilabiatum: labio superiore obsoleto, emarginato; inferiore longitudinaliter compressum, futura longitudinali dorsali, apice acuminato: acumine inflexiunculo, conico, supra & infra sulcato; bivalve, polyspermum. Semina 6, ovato-cylindrica, unguicularia, vix reniformia, utrinque obtuso-rotundata, colore sordide albo, picta venis obsoletis non elevatis, glabra, nitidiuncula; parenchymate cinerascente, bipartibili.

PROPR. rec. legumin. Odor moderate subhiracinus; sapor dulcescens, subnauseosus; cocta tenera, sapida. Semin. sapor idem qui seminis Pisi.

VIRTUS & USUS ut in antecedentibus.

OBS. *Amylum* separavi ex hisce seminibus, albissimum, inter digitos crepulum, pulcherrimum, videlicet amyli grana 48 e seminum unc. 1.

382. DOLICHOS urens. LINN. *Sp. pl. 1020.* JAC. QUIN *Hist. 202. t. 182. f. 84.*

Phaseolus siliquis latis hispidis rugosis, fructu nigro. PLUM. *Icon. t. 107.*

Pharm. DOLICHI URENTIS lanugo.

Locus. America meridionalis. *Frutex.*

FORMA: Scabrities leguminum, constans e pilis subulatis, rigidiusculis, subpungentibus.

PROPR: Odor nullus, neque sapor.

VIRTUS: irritans, stimulans, anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

OBS. Fide cl. BANCROFT (*) hoc novum simplex excito; sed ex propria experientia nihil habeo quod scribam. Secundum hunc virum, incolæ totius Gvianæ, potissimum servi nigritæ, lumbricis intestinalibus vexantur, adversus quos nullum aptius antidotum inventum est, quam lanugo Dolichi, quæ a leguminibus abradi debet, & cum Syrupo quodam in Elestuarium redigi, cuius dosis adultis est uncia i vel plures, quovis mane per triduum, sumto insimul Rheo. Medium hoc æque tutum ipsis infantibus est, dosi nimirum ad ætatem aptata. Post secundam dosim propinatam, vim lumbricorum communiter excernere solent. Quovis tertio aut quarto mense curam hanc iterant. Millenis casibus usum hujus lanuginis comprobatum vidit BANCROFT. Agit stimulatione & irritacione, vermbus molesta, qui ideo ex sumto purgante facile profligantur. Video cl. PATE. BROWNE hanc curam etiam commemorare.

(*) *Naturgeschichte von Gviana*, p. 241.

383. DOLICHOS Soja. LINN. *Sp. pl. 1023. Mat. m. 363.*

Soja-bōna. *K. Vet. Acad. Handl. v. 25. p. 272.* t. 9.*

Phæoleolus erectus, siliquis Lupini, fructu Pisii majoris candido. KÆMPE. *Amæn. p. 837. t. 838.*

Culinis SOJA.

Locus. India, Japonia. Annuus.

FORMA. Liquor fusco-niger, opacus, vini meracioris spissitudine, cum aqua dilutus rubroaurantius evadens.

PROPR. Odor exakte ut Rob Sambuci; sapor fatus, obscure subpinguisculus, in Rob Sambuci incidens; vitriolum martis colorem liquoris non demutat.

VIRTUS: appetitum excitans.

USUS. Cibi condimentum.

OBS. I. Ex observatione cl. ELLIS (*), Sojam sequenti modo præparant Chinenses: Re. Sem. Daidsu (h. e. Dolich. Sojæ) cong. 1. Coquantur in aqua quoad mollescant; admisceatur Tritici vel Hordei contul. a-natica pars. Stent in vase clauso per nycthemeron, loco tepido, ut fermententur. Tum addantur salis culinaris cong. 1 & aquæ puræ cong. 2 §. Tota hæc mixtio vasi fistili immittatur, quod probe obturetur, & per 2 vel 3 menses quovis die bis vel ter bene quæssetur, ut omnia eo melius commisceantur. Postea coletur cum expressione liquor, qui in vase ligneo deinde asservari debet. Quo vero antiquior, eo præstantior evadit hæc Soja. Residuo iterum plus aquæ affundi potest, subsequente nova eademque valida quassatione; sic aliquanto post plus Sojæ denuo exprimi potest.

Alium

(*) *American philos. transact. vol. 1. p. 259.*

Alium præparandi modum docuit cl. CAROL. G. EKEBERG (*), e China redux, qui ita se habet. Re: Sem. Paetau (h. c. sem. Dol. Sojæ, prout vidi in seminibus ab hoc viro allatis & satis) libr. 35; per horas 2 vel 3, in aheno clauso, igne moderato, in aquæ puræ, sensim adiectæ, s. q. coquantur, quoad semina hæc digitis facile comprimi possint. Exemta ex aqua semina in cribro reponantur, ut aqua liberentur; adhuc vero humida convolvantur in farina seminum Paetau, ut eadem quasi incrustentur. Tum rare extendantur supra lamellas pertusas, in ^{KONI} cophino aperto disponendas, situ horizontali, alia supra aliam, ad distantiam pollicis unius cum dimidio, quo facto cophinus iste circumtegatur ^{natta} storea quadam vel panno, atque ita relinquatur, dum semina multo obducantur mucore, id quod tridui vel quatridui spatio fieri solet. Postea, remoto hocce tegumento, aëri primum, deinde vero ardori solis vel furni calori exponentur diæta semina, dum in tantam duritatem exaruerint, ut ad mallei iustum dissiliant. Posthinc ea inter manus fricentur, quoad tota crusta farinæ, mucore imbuta, secedat, quæ tunc in unam amphoram, vel etiam plures urceos, injiciatur, eique superinfundatur lixivium salinum limpidum, e salis culinar. libr. 20 & aquæ puræ libr. 100 paratum. Hidemum urcei quovis die in sole collocari debent aperti, quavis autem nocte obturari, ne pateant frigori aërisque humiditati; & vero solis defectu in loco calido ponи possunt, ubi stent per 6 septimanas, ut extractio rite procedat. Postquam lixivium salinum fulcum evasit, decantari debet, & per unam alteramve ebullitionem ad debitam consistentiam leniter evaporari. Non nullis placet aromata addere.

OBS. 2.

(*) K. Vetensk. Acad. Handl. vol. 25. p. 38.

OBS. 2. Soja apud nos in mensis opulentiorum adhibetur, & embammatis immiscetur, unde sapor exaltatur apud carnes, pisces &c.

384. PISUM sativum. LINN. Sp. pl. 1020. Mat. m. 352.

Pisum. BLACKW. Herb. t. 83. CAMER. Epit. 213. DALECH. Hist. 450.

Culinis: PISI Legumina virentia, Semina.

Locus. Europa in agris, feritur ubique. Annum.

FORMA. rec. Legumina 2 vel 3, pedunculata, pendula, immatura, carnosofucculenta, fragilia, acinaciformia, subincurvata, glabra, lucidiuscula, dorso recta, inferne antice paululum attenuata, utrinque acutiuscula, apice terminata stylo persistente, superne barbato, basi infima vestita Perianthio persistente, campanulato, glabro, 5-fido. Vagina staminum persistens, emarginata, intra calycem. Semina 5 vel 7, breviter pedicellata; immatura ovali-subturbanata, glabra, pallide viridescentia, succosa; matura duriuscula, sphærica, alba, undique laevia, hilo laterali, furcato, parencymate cotyledoneo, dilute lutescente, bipartibili: lobis conniventibus; transversaliter secto æquali, uniformi, intra tunicam subpergamenam.

PROPR. rec. Legumin. immatur. Odor moderatus; sapor dulcescenti-herbaceus, odori congruens; masticata teneriora, subcrepula, comminuuntur, extrahuntur, saliva subviridescente; cocta tenera. Seminum matur. Odor vix ullus; sapor subdulcescens; masticata comminuuntur, sapore validiore subingrato, solvuntur fere, sa-

li-

liva emulsiva; cocta sapidiora, magis dulcescens, odore alimentari.

VIRTUS: legumin. nutritius, eccoprotica. *Semin.* fortius nutritius, i subflatulenta.

USUS: culinaris.

OBS. I. Pisi semina integra, baln. m. in aqua fontana digesta, emollescent, mole rument, & infusant aqueo-subcitrinum, odore alimentari, sapore dulcescente, vitriolo martis nil demutatum. Si vero hæc semina in aqua fluviatili s. lacustri coquuntur, dum penitus mollescant & sponte ruimpantur, elicetur cotyledonea pars & cum aqua miscentur; unde *Decoctum saturatum spissum evadit*; sed dilutius decoctum opalescit, quamdiu calet, refrigeratum vero subsidit, scilicet cotyledonea pars fundum petit, supernante liquido dulcescente, seri lactis facie. Sic non solvitur cotyledonea pars perfecte in aqua, verum in minimas particulas resolvitur & commiscentur cum aqua. Si decoctum saturatus Pisorum vitri lateri illinitur, vitrum deprehenditur obfuscatum atomis subrotundis, discretis, subpellucidis. Pisi semina plurimum mucilaginis continent, quod e decocto Pisorum præcipitatur cum alchohole vini & omnibus salibus imperfectis, sive basis sit terrea, sive metallica. Hinc ratio elucet, cur Pisum ad mollitiem non possint elixari in aqua puteali, quæ sapissime ejusmodi sale fecunda est. Vitriolo martis decoctum Pisorum coagulatur, non fuscescit. Si semina Pisum siccata cum aqua frigida contunduntur, *Emulsionem* dant lacteo-tubulifcentem, spississimam, persistentem, quæ, virgula agitata, spumescit, tamquam solutio saponis: spuma alba, copiosa, tardissime extingibili. Haec emulso sapore est dulcescente, insimiliter subamaricante, Pisum sapori congruente. Non alteratur ex affusa solutione salis culinaris, vel spiritu vitrioli, sed præcipitatur cum alchohole vini & solutione

aluminis. Sub contusione Pisorum in emulsionem, amyacea pars secedit, & tandem ad fundum subsidit *Amylum* pulchrum, album, inter digitos crepulum, frumentorum amylo simile, in aqua coctum gelatine-scens, bene glutinans. E semin. Pisi uncia i obtinui amyli drachm. 2. Pisi semina, pulverata, in farinam abeunt albo-lutescentem. Hæc farina cum Tartaro cerevisiae bene fermentatur, & dat panem perfectum, facie panis fecalini, sed ponderosum, satis gratum dum recens, sapore Pisorum dulcescente, odore panis ordinarii, & dum masticatur in ore solubilem; sed per dies nonnullos servatum, siccum & non sapidum. Requiritur tamen, ut pastæ fermentatio sit brevissima, perinde ut de Hordeo dictum est. *Puls*, ex farina Pisorum in aqua leniter cocta, bene glutinat, dum chartæ illinitur. Ex dictis liquet, semina Pisi admodum nutrire, idque dupli principio, amyaceo nimirum & dulci. Certe experimentis mihi constitit, semina Pisi plus amyli largiri quam congeneres, quare etiam ea magis nutrire statuo.

OBS. 2. Quandoquidem emulsio Pisorum adeo spumelcens fuit, linteas mihi sumsi ejus ope dealbanda. Inter lavandum spumescientia quidem solutionem saponis mentiebatur, sed maculas non delebat, nec linteas adeo alba reddebat, uti solent spones. Nihilo tamen minus dubitari vix poterit, quin Pisa facultatem habent saponaceam, siquidem, ut supra allatum est, pari modo se habent ad reagentia, atque verus sapo.

OBS. 3. Reliqua semina hujus classis esculenta, ut Phaseoli, Viciae, Ervi, cum aqua contusa, pari modo, ac de Piso dictum est, Emulsionem dederunt, quæ ad fundum depositum Amylum. Harum emulsionum potissimum americans fuit illa, quæ ab Ervo Lente parata erat. Phaseolus saccharatus dulcescentem emulsionem protulit, ut Pisum, sed reliqui Phaseoli emulsiones vix dulcescentes stiterunt.

385. LATHYRUS tuberosus. LINN. *Sp. pl.* 1033.
KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5. MUNT. *Aardgew.*
t. 193.

Terræ glandes. DODON. *Pempt.* 540.

Culinis GLANDES TERRÆ recentes.

Locus. Sibiria. In Belgio inter segetes conseri-
tur. *Perennis.*

FORMA. rec. Radix tuberosa, conica, sæpe
cylindrica, digitalis, apice germinans, vestita
cortice firmo, ex nigro fusco; parenchymate al-
bo, firmiusculo, æquali.

PROPR. radic. rec. Odor subaphrodisiacus;
sapor leguminum virentium Pisii hortensis, si-
mul dulcis. Cocta radix adhuc firmiuscula; ma-
sticata sensim solubilis, sapore subleguminoso.

VIRTUS: nutritius.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Glandes terræ amyllum dant pulcherrimum,
album, coctione ex aqua gelatinescens, bene glutinans.
Amyllum hæcce tubera copiosius largiuntur quam So-
lanum tuberosum, namque horum tuber. libra i dat
amyli unc. 3, dum ex pari pondere Solani tuberosi
vix amyli unc. i obtinetur. Sub extractione amyli,
aqua supernatans laetescit.

OBS. 2. In culinis tubera hæc in aqua elixantur,
& eduntur cum butyro recente, cute nigra. detracta
Tartari ad Krasnojarsk ut alimentum primarium radi-
ces Lathyri tuberosi adhibent; J. G. GMELIN.

386. VICIA Faba. LINN. *Sp. pl.* 1039 *Mat. m.* 353.
Faba sativa. DALECH. *Hist.* 451. BLACKW. *Herb.*
t. 19.

Bona s. Phaseolus major. DON. *Pempt.* 504.
Culinis & Pharm. *FABÆ Flores, Legumina*
tenera, Semina.

*Locus. Aegyptus. Seritur in agris & hortis.
Annua.*

FORMA. rec. *Racemi* parvi, axillares e foliis, 5-vel 6-flori, petiolis breviores. *Flores* subsessiles. *Bracteæ* nullæ, sed margo paryus turbinatus. *CAL.* Per. tubulatum, cylindricum, album, glabrum, antice obsolete angulatum, 5-fidum: laciinis lanceolatis, acutis; 2 superioribus brevioribus. *COR.* papilionacea, calyce duplo longior. *Vexillum* obovatum, obtusum, erectum, concavum, carinatum: carina apice acuta, subreflexa; album, intus pictum striis rubicundis, parallelis; ungve lato, elongato, in tubum convoluto. *Alæ* 2, vexillo breviores, albæ, cum macula maxima nigricante in medio alæ sita, obtusæ, dorso convexæ, basi antice semi-sagittatae, ungvibus linearibus. *Carina* alba, alis multum brevior, navicularis, triangulari-lunulata; concava, compressa, ungve linearis, basi bifido. *STAM.* *Filam.* 10, coalita in vaginam cylindricam, rima longitudinali antice hiantem, superne libera. *Anth.* subrotundæ, didymæ, hinc planiusculæ, inde trisulcatæ, carinæ inclusæ. *PISTILL.* in carina juxta stamina reconditum. *Germen* lineare, minutim villosum, viride, superne albidum. *Stylus* ad angulum rectum flexus, subulatus. *Stigma* capitatum, penicillo barbare obtectum. *Legumen* viride, glabriuscum, lucidiuscum, tereti-compressum, palmare vel ultra, subtorulosum, futura utrinque marginali, basi paullulum attenuatum, fulcitum calyce persistente & emarcido, apice obtuso-rotundatum cum mucrone conico subulato, incurvo, e styllo persistente orto, saepe terminato stigmate reflexo; uniloculare, subtetraspermum, bivalve: val-

valvis carnosis: tomento spisso, spongioso, succoso. *Semina* pedicellata, magna, reniformi-ovata, utrinque compresso-plana, glabra, alba, apice obtuso rotundata, basi obtusa, utrinque gibbosa, hilo linearis notata, orto e pedicelli apice clavato-linearis, longitudinaliter semini adnato; *Parencyma* cotyledoneum, viride, intra tunicam firmam.

PROPR. rec. florum: *Odor* debilior, gratus; *Sapor* oleraceus; *masticati* flores teneri, succulent. *Legumin. odor* leguminis Pisii; *sapor* consimilis; *tenella* tenera, cocta sapida. *Seminum* immaturor. *sapor* dulcetens; *masticata* tenera, succosa, saliva viridecente; ipsa tunica subsucculenta.

VIRTUS: *legum. & semin. nutriens.*

USUS: culinaris.

OBS. 1. Legumina tenella sapida sunt, pariter ac semina immatura. Coquuntur communiter haec semina cum radice Dauci in aqua, & parantur cum butyro & Petroselino. Solent etiam nostri siccare haec semina immatura, in aqua fervida antea citissime infusa, atque demum in usum hiemalem servare.

OBS. 2. *Amylum* album, & inter digitos crepulum, haecce semina largiuntur, nimirum e semin. unc. 1 amyli gr. 75.

387. ERVUM Lens. LINN. *Sp. pl. 1039. Mat. m. 360. KNIPH. Bot. orig. cent. 9.*

Lens major & minor. DALECH. Hist. 475.

Lens. DOD. Pempt. 517.

Culinis LENTIUM Semina.

Locus, Europa inter segetes. *Annum.*

FORMA. sicc. *Semina* subrotunda, utrinque compressa, margine undique acutiusculo, laevia, cinerascentia, magnitudine vix Pisi minoris.

PROPR. *Odor* vix ullus, *Sapor* seminis Pisi, subamaricans.

VIRTUS: nutriens.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Juscolum* e Lentibus, cum carne paratum, in culinis invaluit. A quibusdam præferrunt juscule e Pisibus. Nutriunt Lentes pari fere modo ac Pisum, quantumvis minus dulcescentes. Pisici Arabes multum sibi ex Lentium seminibus sperarunt in variolis, qua in re plures ex veteribus medicis asseclas habuere. Nostra variolarum theoria nunc longe alia est.

OBS. 2. *Amylum*, quod ex hisce seminibus obtinetur, album est & inter digitos crepulum; videlicet amyli grana 98 e semin. unc. 1.

388. CICER arietinum. LINN. *Sp. pl. 1040. Mat.*

m. 359. DOD. Pempt. 515. CLEWB. Frument.

& legum. spec. in S. cod. V. T. memor. t. 1. f. 1.

Cicer sativum. DALECH. *Hist. 461.*

Cicer sativum arietinum. LOB. *Hist. 519.*

Pharm. & Culin. CICERIS Semina.

Locus. Europa australis, inter segetes. *An-*
naum.

FORMA. *Semina* subrotunda, magnitudine seminis Pisi, alba vel rubra, postice sulcato-depressa, antice breviter rostrata; puncto excavato proxime sub rostro; elevato autem puncto subtus, longius a rostro. *Parencyma* lutescens, uniforme, cotyledoneum.

PROPR. eadem quæ seminis Pisi.

VIRTUS: nutriens.

USUS: culinaris.

OBS. 1.

OBS. 1. Hæc semina inde a priscis temporibus culinaria fuerunt, & GALENUS de illis statuit, quod validius nutriunt quam Fœba. Apud veteres Romanos frequentissimi usus erant pro cibo, & quidem plerumque simpliciter fricta in faragine sicca, cum sale modico, sub qua forma etiam in theatris vendebantur plebi, qui Cicere fricto, dum fabulæ agebantur, famem sedare solebat. Hodie etiamnum in culinis usurpantur, & sapida censentur; minus tamen increbuerunt in nostris oris, quam in Europa australi atque Oriente. In Barbaria a quibusque inter delicatores cibos connumerantur, tamenetsi non aliter apparata sunt, quam frigendo quoad colorem cinereum induant (*).

OBS. 2. Post semina Pisii, semina Ciceris validius nutriunt, quod, ex abundantia substantiae amylaceæ apud hæc semina, concludo. Ex semin. Cicer. unc. 1 obtinui amyli albi & pulchri grana 102.

389. GLYCYRRHIZA glabra. LINN. Sp. pl. 1046.

Mat. m. 362. KNIPH. Bot. orig. cent. 4.

Glycyrrhiza siliquosa. ZANNICH. Venez. t. 160.

Glycyrrhiza non echinata, scythica herba.

DALECH. Hist. 248.

Glycyrrhiza. BLACKW. Herb. t. 495.

Pharm. LIQUIRITIÆ Radix, Succus inspissatus.

Locus. Europa australis. Perennis.

FORMA. rec. Radix sarmentosa, profunde descendens, sub terra repens, ramis teretibus, extus ferrugineis, crassitie pennæ anserinæ, digitæ minoris vel pollicis, instrutis fibris radicantibus sparsis; parenzymate subcarnoso, lutescente; post sectionem transversalem notato centro medullari subrotun-

Q q 4 do,

(*) SHAW Voyage dans la Barbarie & le Levant, Tom. i. p. 288.

do, parvusculo, disco undique punctato, radia-to-striato: radiis a centro medullari ad peripheriam; constante ex circulis 2, quorum interior magis flavescit. *Siccata* radix dura.

PROPR. rec. Odor crudus, exakte leguminum rec. Phaseoli vulgaris; Sapor intense dulcis, simul in legumen Pisi incidens; masticata mucilaginosa. *Siccatae odor* nullus; *sapor* intense dulcis; *masticata* emollitur & subpulposa fit.

VIRTUS: edulcorans, pectoralis, sitim extingvens.

USUS. Tussis, Arthritis, Rheumatismus.

OBS. 1. *Infusum* rad. sicc. aquosum, frigide pariter atque calide paratum, lutescens, odore nullo, sapore intensius dulci; vitriolo martis non demutatum secundum colorem, sed turbidum fit. Extrahitur radix hæc menstruo aquoso & spirituoso. Hujus radic. libræ 12 & unc. 8 simplici infusione in aqua frigida dedeuhi Extracti siccii libr. 2 & unc. 4; BAUMÉ. Ut observat cl. vir, radix hæc, per successivas infusiones in aqua frigida, diversa extracta dat; etenim quod per primam infusionem obtinetur, extractum, flavescens est, sapore dulci & grato; extractum vero secundæ infusionis magis obscurum est & minus dulce. Si autem residuum in aqua elixatur, obtinetur extractum nigrum, sapore acri, vix dulci. *Decoctum* radicis Liquiritiæ aquos. acriusculum est & nauseosum; hinc fortem non admittit ebullitionem hæc radix; hinc etiam in decoctis faciendis sub fine ebullitionis addenda, vel potius infundenda.

OBS. 2. *Succus* Liquiritiæ, ex Hispania huc allatus, extractum est nigricans, lucidum, plasticum, duriusculum, in magdaliis, foliis Lauri obrectis, allatum. Odor vix ulla; sapor Liquiritiæ. Solvit in ore, salivam fulvam reddens; solvit etiam in aqua & spi-

ritu vini. In candelæ flamma vix accenditur, nec funditur in igne clauso; neque facilis accenditur calefactus. Hispani eum parant sequenti modo: radices recentes effodiuntur in mense Julii, purgantur & suspenduntur in aëre, ut semisiccant; tum conſinduntur, & in aqua elixantur in decoctum saturatissimum, quod, quiete depuratum, postea in extractum inspissatur, & in sole ficitur.

OBS. 3. *Glycyrrhiza echinata* etiam radicem dulcissimam gerit. Refert cl. LERCHE, maximam quantitatem hujus radieis circa fluvium Volgæ quotannis colligi, unde tanta Succi Liquiritiae copia, quanta prototo imperio Russico sufficiat, in officinis Astracanensis apparatur (*).

390. INDIGOFERA argentea. LINN. Mant. 2.
p. 273. *

Colutea fruticosa argentea, floribus spicatis
e viridi purpureis, siliquis falcatis. SLOAN.

Jam. 2. p. 37. t. 176. f. 3.

L' Indigo franc. BEAUV. RASEAU *Indigotier*
p. 49. *. t. 1. f. 1. & t. 8. f. 1. MARCH. Hist.
de l' Acad. des scienc. 1718. p. 92. c. fig.

Pharm. INDIGO COMMUNE.

Locus. Colitur ubique in America. Suffrutex.

FORMA. Massa solida, subponderosa, duriuscula, homogenea, difficulter fragilis: fragmentis indeterminatis, rugosis; violaceo-rubicunda, vix friabilis, inter digitos fricata illos cæruleo colore inquinans.

PROPRIET. Odor nullus; sapor nullus; Indigo masticatum comminuitur, saliva cærulea.

VIRTUS.

USUS: tinctorius.

(*) Cfr. GMELIN Flor. Sibir. vol. 4. p. 32,

OBS. 1. Indigo, in aqua pura digestum, non solvitur, verum insolutum in fundo vasis jacet, aqua supernatante colore lutescente tincta. Sed si Indigo in oleo tartari p. d. vel alio lixivio alcalino digeritur, imperfecte solvitur: solutione cærulea; quod signum est solutionis imperfectæ; omnes enim colores cærulei vegetabiles cum alcali fixo viridescunt; quorum accedit, quod solutio hæc quiete præcipitatur. Addita calce viva, vel pasta panis acidi, sub fermentatione excitata, paullo melius solvitur, sed non tamen perfecte nisi in acidis. Sic in Spiritu vitrioli solvitur Indigo, sub digestione: solutione belle cærulea; solvitur etiam in Spiritu nitri: solutione lutea. In acido salis non solvitur, nec in spiritu vini.

OBS. 2. Indigo est fæcula tinctoria, fermentationis putridæ ope generata e planta Indigofera. Præparatur maceratione plantæ recentis, ante inflorescentiam collectæ, (subinde etiam siccatae, pro diversa methodo præparandi) in aqua fluviatili, cum subsequente fermentatione justa, i. a. excitata, posteaque strenua agitatione liquaminis, herba prorsus liberati, in alio vase; quæ agitatio tamdiu durare debet, dum juscum a magnate subtilissimo turbidum evaserit, quod tandem, insequente quiete, sponte subsidit, fæculasque cæruleas efformat. De Indigo præparatione optime scripsit cl. DE BEAUV AIS RASEAU (*).

OBS. 3. *Indigoferam tinctoriæ LINN. Sp. pl. 1061.* excitare debuisse, siquidem Indigo etiam ex illa paratur. Illud Indigo, quod in America producitur, communiter ex Indigofera argentea desumitur, atque hoc in commerciis nostris vulgatissimum est: Indigo autem orientale ex Indigofera tinctoria elaboratur. Parant Indigo ex pluribus speciebus hujus generis, etiam in America, ubi Indigofera tinctoria pariter colit-

(*) *L'art de l'Indigotier.* Paris 1770. fol.

colitur. Javanenses & Chinenses Indigo præparant fermentatioms ope, addita calce viva, ut observavit cl. CAR. GUST. EKEBERG. Colligunt plantam recentem, sed maturatam, quam in magnis lagenis cum calce viva collocant per strata, superastusa tandem aqua. Sic perficitur pigmentum cœruleum, quo statim, & absque prævia siccatione, tingunt telas bombycinas. Nigræ in Sene gal suum Indigo sine multis ambagibus præparant. Colligunt folia recentia, illaque in mortario contundunt in pastam, unde formant globulos, quos deinde exsiccant & servant usui. Cum tingere volunt, hos globulos emolliunt & solvunt in lixivio alcalino, parato ex cineribus Seluvii Portulacastri LINN. Sie obtinent lixivium tinctorium cœruleum, quo frigide tingunt, pannos fentel, bis vel tæpius immersendo, prout dilutiorem seu saturatiorem volunt colorem; ADANSON (*). Relatio de plantatione, collectione & exsiccatione Indici, vulgo *Indigo* dicti, prout in regione Tsin sie & vicinis locis exerceri solet; pariter ac alia relatio, qua ratione optimum & genuinum Indicum in oris supradictis paretur; legi possunt in extenso apud VALENTINI (**). En contentorum synopsin. Folia ante non colligenda, quam semina produxerit planta. Tunc caute resecan di ramusculi, nec prope caulem amputandi, ne fruticulus emoriatur. Ramusculi sic resesti primum siccandi, dein baculis triturandi, ut folia secedant, tum de novo fustiganda sunt folia, ut comminuantur, quæ postea in locis clausis, ventis minus perviis, in acervos cumulanda, qui bene undique integumentis obtegi debent, siveque per 20 vel 25 dies relinqu, ut apta fiant præparationi Indici. Folia sic præparata infunduntur in aqua frigida, nullo discrimine habito sive sit salsa seu dulcis, modo limpida, atque probe concutiuntur. Hæc

ma-

- (*) Hist. nat. du Senegal, p. 165.

(**) Ind. literat. p. 481. 482. seq.

maceratio debet fieri in summo solis calore, quoad folia intumescant, & substantiam quandam viscidam, instar fæcis fermentescentis, ejicere incipient, quod communiter intra 4 horas fit. Tum coletur infusum per linteum, residuum vero novam iterum subeat macerationem, usquedum omne colorans prorsus fuerit extractum. Postea debet infusum bene agitari & quassari, non aliter ac cum lacte bubulo fieri solet in vase butyraceo. Exlurgit tunc spuma, initio pallide purpurea, post successive albidior, tandem vero in colorem cæruleum abiens; ipsum vero infusum prorsus atrum & nigricans apparet. Subsequente demum quiete, fæculæ subsidunt, quæ exsiccatæ, bonum & perfectum Indigo constituunt.

OBS. 4. Dum vaccæ planta Indigofera vescuntur, earum lac colorem cæruleum induit; GARDEN (*).

391. ASTRAGALUS Tragacantha. LINN. Sp. pl. 1073. Mat. m. 358. KNIPH. Bot. orig. cent. 3. Tragacantha massiliensis. DUHAM. Arbr. 2. p. 344. t. 100.

Tragacanta alpina sempervirens, floribus purpurascens. GARID. Aix. p. 469. t. 104.

Tragacantha orientalis vesicaria, erectior, caule ab imo ad summum florido. Russ. A-lep. t. 5.

Tragacantha altera, Poterium forte. CLUS. Hist. 108. DUHAM. Arbr. 2. p. 344. t. 101.

Tragacantha. BLACKW. Herb. t. 264. DOD. Pempt. 739.

Pharm. TRAGACANTHÆ Gummi.

Locus. Europa australis, Oriens. Frutex.

FORMA. Gummi pallidum, subdiaphanum, læve, facie cornea, leve, subsplendens, fragile, po-

(*) Philos. transact. vol. se. p. 296.

polymorphum: frustulis compressis, communiter flexuosis s. intortis, saepe angustis, lineariformibus, saepe in grumulis oblongis s. subrotundis.

PROPR. *Odor* nullus. *Sapor* nullus; *masticatum* durum, comminuitur, plenarie solvitur. In ore retentum absque masticatione, emolliatur, tardius solvitur. *G.* *Tragacanthæ* in ignis flamma tardius accenditur, flagrat difficulter: flamma parva, cærulescens; intumescit, nisi probe antea siccatum, nigrescit, odorem spargit ferre lintei accensi. Accensum, ignem diu retinet, sed deflagratum abit in favillam impalpabilem, albissimam, cum spiritu vitrioli effervescentem. In igne aperto, vase ferreo, nigrescit, non accenditur, ignitum fit; admota vero flamma, mox accenditur & flagrat: flamma satis vivida, cærulea, quæ, sponte extincta, massam ignitam refert, satis diu persistentem, relicta favilla. *Gummi* hoc non solvitur in oleis, vel spiritu vini, sed satis facile in aqua, tamquam reliqua gummata; largam tamen aquæ copiam ad sui solutionem requirit.

VIRTUS: demulcens, obtundens, incrassans;

USUS. Dysenteria, Diarrhoea, Stranguria.

OBS. 1. *Gummi Tragacanthæ*, aquæ frigidæ immisum, brevi mucore quasi obductum conspicitur, dein sensim intumescit, vertitur in gelatinam albidam, subdiaphanam, glutinantem, quæ, cum aqua supernatante agitata, flocculos natantes aquæ immiscet. Idem etiam accidit in calore balnei. Decoctione perfectius solvitur: solutione opalescente, velut decoctum Hordei tenuius, spissiuscula, sapore mucilaginoso, fatuo.

OBS. 2. Multo fortius est hoc gummi, quam *G. arabicum*, sc. ut 1 ad 24. Etenim dum *G. Tragac.* scrup.

scrup. 8 aquæ puræ libr. 2 in consistentiam Syrupi redigunt, requiruntur G. arab. unc. 8 ad eundem effectum præstandum.

OBS. 3. Gummi Tragacanthæ transudat in Oriente, mensibus æstivalibus, ab ipsa substantia ligni, sub specie succi gummosi, & deponit se in porositate corticis, unde sponte exprimitur, & in aëre indurescit sub forma grumulorum verniformium, vel laminularum tortarum; TOURNEFORT.

392. TRIFOLIUM Melilotus officinalis. LINN.
Sp. pl. 1078. Mat. m. 355. KNIPH. Botan. or.
cent. 7.

Melilotus. BLACKW. Herb. t. 80.

Trifolium odoratum f. melilotus. DODON.
Pempt. 557.

Pharm. MELILOTI Herba, Flores, Semina.
Locus. Europa, Virginia. Biennie.

FORMA. rec. Radix annua, fusiformis, fibrillosa, extus pallida, intus alba. Caules plures ex una radice, erecti, bi-vel tripedales vel ultra, teretes, glabri, virides, angulis tribus instar linearum elevatarum, a singulo ramo decurrentibus, parallelis, remotis; ramosus. Rami alterni, erecti, angulati, glabri, striati. Folia alterna, petiolata, ternata; foliolis ovali-oblongis, apice truncatis, margine acute ferratis, subpollicaribus, utrinque glabris, supra obscure viridis, subtus pallidioribus, nervis tenuibus suboppositis, a costa obliquis; 2 inferioribus subfessilibus; intermedio paullo majore, petiolato, petiolelli apice sursum flexo. Petioli superne sulcati, basi ovati, concaviusculi, amplexicaules. Stipulae 2, oppositæ, lineari-subulate, parvæ. Racemi florum axillares, pedunculati, erecti, subcy-

cylindrici, nudi, pubescentes, secundi, floribus pedicellatis, nutantibus. *Bra&teæ* parvæ, linearisubulatæ, subpilosæ, ad pedicellos solitariæ, illisque breviores. *CAL.* Perianth. campanulatum, parviusculum, minutim pubescens: ore 5-fido, acuto, erecto. *COR.* lutea, calyce triplo longior. *Vexillum* obovatum, obtuso-rotundatum, emarginatum, planum, carinatum, subrevolutum, ungve concavo. *Alæ* 2, lineares, obtusæ, longitudine vexilli, basi semisagittatae. *Carina* navicularis, dorso convexa, longitudine ferre alarum, ungve linearis. *STAM.* Filam. 10, simplex & novemfidum, carinæ inclusa. *Antb.* subrotundæ. *PIST.* Germen linearis-ovale, utrinque acutum, viridescens, compressum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* simplex. *Legumen* pendulum, calyce longius, ovale, utrinque acutum, dorso convexum, antice margine acuto, undique rugosum, uniloculare, dispermum. *Semina* subrotunda.

PROPR. rec. Odor syaveolens, in Asperulam odoratam incidens; sapor herbaceus, americans, simul in Pisum incidens. *Sicc.* fere consimilis; odor paullum fortior.

VIRTUS: resolvens, subemolliens, anodyna.
USUS: externus.

OBS. *Infus.* aquos. lutescens, odore grato ambrosiaco, sapore consimili amaricante; vitriolo martis fusco-viride.

393. TRIFOLIUM repens. LINN. Sp. pl. 1080.

Mat. m. 354. RIVIN. Tetrap. 17.

Pharm. TRIFOLII ALBI Flores.

Locus. Europa, in pascuis. Perenne.

FOR-

FORMA. rec. Florum umbella simplex, longius pedunculata, capitato-globosa. Pedicelli tereti sculi, uniflori, superiores sensim longiores. Bracteæ solitariæ, parvæ, membranaceæ, ova-to-oblongæ, acuminatæ, pedicellis breviores. *CAL.* Per. 1-phyllum, albidum, 10-angulatum, 5-fidum: laciniis subulatis, subæqualibus; 2 superioribus paullo longioribus. *COR.* alba, papilionacea. *Vexillum* ovale, obtusum; calyce multo longius, planum, subcarinatum, ungve oblongo, concavo. Alæ 2, subobovatae, obtuse, semisagittatae, vexillo breviores, ungibus linearibus. *Carina* navicularis, carinata, acutifusa, longitudine alarum. *STAM.* diadelpha, simplex & 9-fidum, profunde divisum, in carina recondita. *Anth.* ovales, didymæ, incumbentes. *PIST.* *Germen* lineare, rudimento seminum 4, viride, glabrum. *Stylus* subulatus, apice incurvus, staminibus longior. *Stigma* obtusum.

PROPR. rec. & sicc. Odor melligineus; sapor vix ullus.

VIRTUS: restringens.

USUS.

OBS. 1. *Infus.* aquos. flor. sicc. aqueo-citrinum potus Theæ instar, odore nullo, sapore amarieante; cum vitr. martis nigro-fuscum.

OBS. 2. Ut euporiston contra Leucorrhœam, a mulierculis adhibentur hi flores in infuso.

394. TRIGONELLA Fœnum græcum. LINN. Sp. pl. 1095. Mat. m. 356.

Fœnum græcum sativum. DALECH. Hist. 480.

CAMER. Epit. 199. DOD. Pempt. 526. BLACKW.

Herb. t. 384.

Pharm. FOENUGRÆCI Semina,

Locus. Europa australis. Annun.

FOR-

FORMA. Semina oblonga, teretiuscula, compressiuscula, usque truncata, glabra, brunnea, undique adspersa atomis excavatis, incisura laterali utrinque stria depresso decurrente, magnitudine feminis Cannabis vel ultra; *parenchymate* cotyledoneo, lutescente: cotyledone bifido, laciinis ovalibus, obtusis, basi cylindrica, inflexa.

PROPR. Odor fragrans, unguentaceus. *Sapor* feminis Pisi, odori congruens; *masticata* mucilaginosa.

VIRTUS: emolliens.

USUS: externus; Clysmata.

OBS. 1. Semin. Fœnugræci drachm. 1, in aqua servida unc. 6 infusa, *infusum* dederunt agitatione spume-scens: spuma alba; lutescens, vix mucilinosum, odore debili itemque sapore. Si vero plus seminum sumatur, fit *mucilago* spissa, quæ ab adjecto vitriolo mattis vix fuscescit.

OBS. 2. Fœnum græcum apud veteres Romanos culinare fuit. Parabatur cum garo, oleo & vino; APICUS COELIUS (*). Nunc temporis equinum medicamentum.

R r

CLAS-

(*) *De arte coquinaria*, p. 159.

CLASSIS XVIII.
POLYADELPHIA.
ORDO
PENTANDRIA.

395. **T**HEOBROMA Cacao. LINN. *Sp. pl.* 1100.

*Mat. m. 364. JACQUIN Observ. 1. p. 2.**

Cacao Clusii. MERIAN. *Surin. p. 26. t. 26.* & 63.

Cacao. SONNERAT *Nouv. Guin. p. 101. t. 61.*

SLOAN. *Hist. 2. p. 15. t. 160.* CATESB. *Carolin. 3. p. 6. t. 6.* BLACKW. *Herb. t. 373.*

ANON. *Hist. nat. de Cacao. p. 3. t. 1.*

Arbor cacavifera americana. PLUKEN. *Almag. 40. t. 268. f. 3.*

Cacaotier ou cacoyer. LABAT *voy. aux isl. amer. t. 6. p. 1. t. 1.*

Pharm. **CACAO** Fructus; Oleum.

Locus. America meridionalis, locis depresso-umbrosis. Arbor.

FORMA. Nuclei ovato-oblongi, utrinque obtusi, utrinque compressi, magnitudine nucis avellanæ, inclusi cortice papyraceo, cinereo-olivaceo, fragiliuscule; parenchymate cotyledoneo, pingvi, fusco-nigricante, violaceo, constante e lobulis intortis & conniventibus, tenui pellicula interstinctis.

PROPR. sicc. Odor vix ullus, nisi nuclei tosti, & tunc debilis; Sapor pinguiusculus, leniter subadstringens, amaricans, satis gratus; mosticati nuclei comminuuntur, in ore sensim solvuntur: fali-

faliva fusco-brunnea. Hi nuclei, ignis flammæ admoti, accenduntur, flagrant: flamma lumino-
sa, non fumante, vix fuliginosa.

VIRTUS: *nucl.* nutritius, leniter restringens;
olei: relaxans.

USUS. *nucl.* diæticus; *Alyus laxa.* *olei:* Rha-
gades, Hæmorrhoides cæcæ.

OBS. 1. *Decoctum* saturatum nucleorum crudorum
fusco-brunneum, amaricans, turbidum; dilutum vero
rubicundo-subpurpureo; cum vitr. martis fusco-ni-
grefcens. *Decocti* guttæ 10, aquæ unciaë 3 instillatæ,
addito vitr. martis, colorem fusco-viridescentem reddi-
derunt. Nuclei multum usculati *Decoctum* dant sa-
turate rubrum, empyreumaticum, sapore amaricante,
& odore in oleum animale incidente.

OBS. 2. Nuclei Cacao recentes in solo natali tripli-
ci modo *oleum* dant, nempe destillatione, expressio-
ne & decoctione. *Oleum stillatum* duplex obtine-
tur: alterum crassius, rubicundum, subbutyraceum;
alterum tenuer, albidum, volatile, plus minus empyreum-
aticum; *expressum* liquidum, circiter unc. 2 e nu-
cleor. hbr. 1; *coctum* butyraceo-sebaceum, subbrunne-
um, sed repetitis lotionibus in aqua calida album, æ-
tate in sebum se inspissans, vix rancescens. Idem fere
ex nucleis siccatis apud nos obtinetur; *oleum* vero ex-
pressum sebaceum est, & *oleum coctum* magis buty-
raceum. In hunc finem nuclei torreantur, mudentur,
& supra lapidem calidum terantur, postea coquantur
cum larga quantitate aquæ, fere quoad consumta sit
aqua; tum nova iterum affundatur aqua calida, unde
oleum adscendit in superficiem aquæ, butyri instar su-
pernatantis, postquam aqua refrigeruit. Hoc *oleum* o-
doris fere expers est, sapore miti, in calore liquefit;
ex baïneo arenæ destillatum transcendent, tum iterum
butyraceum evadit, subempyreumaticum. Si nuclei

Cacao siccata decorticata grosso modo contunduntur, saceruloque includuntur, deinde prelo excalefacto subjiciuntur, obtinentur olei butyracei, cocto similis, unciae 2 ex Nucleor. libra 1. Hoc oleum, dum exprimitur, liquidum est, sed refrigeratum brevi concrescit in sebum album, odore nucleorum, & sapore aromatico, odori congruente, diu se servans absque rancore. Ætate tamen satis facile rancescit, si in loco frigido non fuerit servatum. Si sacculus, in quo nuclei constui inclusi sunt, supra vaporem aquæ tenetur, usque-dum vapor omnem pulverem nucleorum penetraverit, posteaque prelo calefacto committitur, ex nucl. Cacao libra 1 obtinentur unciae 6 olei expr. priori similis. HOMBERGIUS destillatione ex Cacao libr. 1 extraxit olei unc. 3; e nucleor. calefact. libr. 1 expressione obtinuit olei unc. 2, sed e residuo per decoctionem s. distillationem oleum ulterius extraxit; nucleos cacao calido lapide trivit in massam; hujus massæ unc. 13 superinfudit aquæ bullientis libras 8, quæ, refrigeratae, nullam pinguedinem extraxerunt; sed per ebullitionem pinguedo secessit, unc. 6 effecit, sebacea fuit, odore Cacao. Alii (*) ex nucleor. non torrefactor. unc. 16 obtinuerunt unc. 3 ½ olei cocti, butyracei, odore gratissimo, sapore dulci, aromatico.

OBS. 3. Chocolatæ panes apparantur sequenti modo. Nuclei primum ustulatione leni torrefiant, adeo ut cortex fractus secedat, qui bene removendus, deinde de novo torrefiant, quoad saporem subsuccosum & colorem brunneum, sed non nigricantem, acquisiverint. Tum contundantur in mortario ferreo calefacto, pistillo ferreo pariter tepido, & postea redigantur in massam tenuissimam, quæ, cum oleosa parte nucleorum, dum refrigeruit, sponte in panem concrescit. Sub-

ustu-

(*) *Commerce. litt. Norimb.* 1737. p. 82.

ustulatione sexta pars ponderis perditur, adeo ut nucleor. libræ 30 dent nucleor. decorticat. libr. 25. Quidam addunt saccharum, siliquas Vanillæ, Cinnamomum Caryophyllosque aromaticos. Hi panes, in scobem concisi, coquuntur unica ebullitione in parca aqua, sc. panis absque saccharo unc. 3 in aquæ unc. 5, addito saccharo ad conciliandum saporem, postea fortiter agitari oportet decoctum; sic obtinetur pulmentum fuscum, amaricans, fragrans, spumescens: spuma persistente. Si frustulum parvum saponis additur, magis spumescens fit hic potus.

OBS. 4. Nuclei Cacao e Caracco minores, & insimul pingviore; qui vero e Costa Rica apportantur, latiores & compressiores sunt. Theobroma colitur plurimis in locis Americæ calidioris, ubi arbores a nucleis consitis proveniunt, & quarto vel quinto anno frugiferæ evadunt. Nuclei includuntur pericarpiis oblongis, quæ ex ipsis ramis grandioribus, vel illorum axillis, dependent, & constant cortice coriaceo subligneo, polliciis fere crassius, fragiliusculo. Quodlibet pericarpium circiter 100 continet nucleos, per series quinquefariam dispositos, arte compressos. Bis in anno, scilicet mense Junii & Decembbris, fructus maturescunt, sed inæqualiter, quare etiam singulis diebus arbores visitandæ & fructus successive decerpendi. Sed arbores non multum frugiferæ sunt; vix ultra 30 pericarpia quælibet arbor profert. Hi fructus decerpti in acervum cumulantur, ut sudent, tum manibus disfringuntur & nuclei eximuntur, qui postea in sole siccandi. Sic demum in Europam transferuntur. In sinu Campescano monetae vicem sustinent; DAMPIER. Cum rancecant hi nuclei, fiunt rubicundo-brunnei, saepaque obducuntur crusta ferruginea rancida. Sed non adeo facile fit, ut rancecant, idque vix ætate, nisi locis humidis con-

Servetur, aut a pluviis vel alio modo sub itinere maledicant.

ORDO ICOSANDRIA.

396. CITRUS Medica. LINN. *Sp. pl.* 1100. *Mat. m. 366.*

Malum citreum vulgare. FERRAR. *Hesp.* p. 56. t. 69.

Citria malus. BLACKW. *Herb.* t. 361.

Malus medica. DOD. *Pempt.* 779.

Malus citrina. DALECH. *Hist.* p. 298.

Pbarm. CITRI Flores, Malum, Flavedo, Semina.

Zocus. Oriens. Colitur in Europa australi. *Arbor.*

FORMA. rec. *Pomum ovale,* utrinque attenuatum; magnitudine ovi anserini vel supra, undique rugosum, punctatum, ad tactum læviusculum, colore pallide luteo; cortice coriaceo-carnoso, albo, subinsipido; epidermide (*flavedine*) crassiusculo, celluloso: cellulis subrotundis, oleo essentiali gratissimo fœcundis, singulis terminatis poro, occluso membrana tenui. *Parencyma* 9-loculare: loculis dispermis; vesiculatum: vesiculis parallelis, pedunculatis, cylindricis, teneris, diaphanis, succo limpidissimo turgidis. *Semina* albida, ovato-gibba, undique minutim rugosa, dorso & basi convexa, striata, antice submarginata, apice acuta, undique obducta gelatina lubrica; parencymate cotyledoneo, bipartibili.

PROPR. rec. *Flavedin.* Odor fragrans, grattissimus; sapor consimilis, calidiusculus, vix amari-

ricanes. *Pulpæ odor* debilis, gratus, ab epidermide infectus; *sapor* intensius acidus, purus. *Seminum sapor* amaricans.

VIRTUS: *flavedin.* calefaciens, cardiaca; *pulpæ*: refrigerans, anti^corbutica, diuretica.

USUS: *Flaved.* Condimentum cibi & medicamentum; *Pulpæ*: Febres phlogisticæ, biliosæ, putridæ, Scorbatus calidus, Stomacace.

OBS. 1. *Infusum* cort. Citri luteum, odore fragrante, sapore amaricante; cum vitr. martis nigrescit.

OBS. 2. *Oleum* præstantissimum e floribus & flavedine corticis Citri præparant exteri. E floribus citri: Rr. Flor. recent. libr. I, vasi idoneo immitte, & adde aquæ puræ egelidæ libr. 6. f. destillatio igne primum minuto, sensim auēto, quoad cervix vasis ex humore destillaturo incipit incalescere, tum ignis caute temperandus, ne fæces oleum destillaturum deturpent. E floribus libr. 60 obtinetur unc. I olei st̄illatitii, succino-flavi, & leviter odorati. E flavedine corticis citri recenti dupli modo ab Italis oleum extrahitur, vel destillatione vel expressione. In priori casu sumantur mala citri recentia, & decorticentur supra catinum fistilem, aqua pura ad medium repletum, in quem cortices immittantur. Tum cortices hi una cum aqua in alembicum conjiciantur, & post macerationem in loco tepido, tandem destillentur igne leni. Surgit tunc a primo oleum tenuius & præstantissimum, *Essentia* vel *oleum Cedri* dictum, coloris aquei, odoris acutissimi, vasculo idoneo vel etiam gossypio ab aqua socia separandum. Deinde sequitur oleum crassius, viridiuscum, bonum tamen. Ex 100 malis citreis, nec maturatissimis, nec nimium crudis, habetur olei primarii tenuioris unc. I, & olei crassioris unc. 3. Expressione simplici e malis citreis oleum etiam obtinetur; in quem finem mala citrea in longitudinem incidentur, seg-

mentis digitalibus, acutiusculis, e quibus singulis medulla & caro resecetur; tum supra patinam fistilem, in mensa collocatam, exprimantur hæc segmenta utraque vola, cubitis mensæ innixis, unico nisu, in adversam patinam recurvatis, ut uno impetu emicantis oleum minutissima patinam adspergine irroret. Ex 100 malis citreis accipiunt unc. i olei expressi, fragrantissimi, oleo destillato savorioris, non tamen æque perfecte se conservantis. Si cortices hi expressi deinde destillentur, oleum crassius obtinetur. FERRARIUS (*). Sed in Gallo-Provincia & Lusitania faciliori enchæiresi oleum hoc expressum parant; nempe abradunt flavedinem Citri omnem instrumento idoneo scabro, quam deinde inter duo vitra exprimunt, & oleum expressum gravissimum, per subsidentiam depuratum, decantant & servant. BAUMÉ.

OBS. 3. *Succus*, e parenzymate Citri recenter expressus, colore & consistentia est seri lactis limpidi, sapore acido & odore debiliore citri. Si residuum, nempe pelliculæ vesicularum, per linteum fortius exprimitur, permeat substantia quædam gelatinosa, similis gelatinæ amyli vel pomorum, linteoque adhæret. Hæc gelatina acida est, in ore solubilis, sed nequam in aqua frigida, neque in spiritu vini. Si succus Citri frigore condensetur, acidissimus evadit, quod a priori non crederes, quandoquidem experientia docuit, mala citrea integra, frigori exposita ut gelu constringantur, prorsus corrupti, pulpamque vappidam & fere insipidam deprehendi. Plura itaque experimenta cum succo citri, gelatione concentrato, instituimus, cum ego, tum cl. viri, J. C. WILCKE, C. J. SALBERG, J. C. GEORGII & LAUR. COLLIN; e quibus, inter se collatis, sequentia didicimus. Si Succus Citri antiquior, quiete & decantatione a suo viscoso probe defæcatus,

in-

(*) Hepperides, p. 173. f.

intenso frigori exponitur, sensim congelatur in *glaciem* friabilem & spongiosam, constantem lamellis tenuibus, nucleo solidiore, sub qua glacie succus citri liquidus & non gelatus deprehenditur, qui, si degustetur, solito acidior est, idque pro gradu concentratio-
nis. Si vero succum penitus in glaciem verti sinas, invenies glaciem lamellatam, priori simillimam, sed succum Citri liquidum inter lamellas involventem. Hæ moles glaciei, si vasculo vitro imponitur, loco calidiusculo, mox destillat succus concentratus, coloris rubri, quem guttatum stillare permittas, quoad albescat, quod signum est, ipsas lamellas glaciei, ex aquosa parte constantes, incipere liquefcere, quare posterior ille succus minus valet, ideoque spernendus est. Interim si residuum glaciei sensim regelare facies, id in aquam abiit acidulam, quod etiam indicio est, plus succi acidi in eo adhuc inesse, quod denique nova gelatione iterum cogere poteris. Ex hoc experimento, saepius repetito, didicimus, succum citri plus frigoris ad gelationem requirere, quam aquam puram; succum vero citri, gelu stratum, in calore citius regelare, quam aquam puram; ceterum huncce succum, concentratum & liquidum factum, frigoris postea perquam patientem esse, nec in glaciem iterum verti, nisi infra gradum 15. sub 0 in thermom. Ivecico. Porro succum, e malis citris recentissime expressum, gelu exposuimus; ille vero sub congelatione non tingebatur colore rubro, uti praecedenſ, sed faciem seri lactis limpidi servabat, tamen post aliquod tempus colorem rubrum assumſit. Praestat sine dubio gelationi exponere succum citri antiquiorem & probe defæcatum, quam recenter expres-
sum, nam viscosum illud, quod in hocce deprehenditur, difficillime separatur, cum id colum papyraceum permeet, atque succum turbidum reddat, aptumque putredini. Succus citri, gelu rite concentratus,

acidissimus est, itemque ruber; Spiritui vini vel aquæ puræ immisso, fundum petit, nec miscetur, nisi agitatione; ætate situm non contrahit, sed diu se servat absque ulla additione. Ego equidem apud me lagunculam, ejusmodi succo concentrato repletam, in fenestra soli expositam habui per integrum biennium, neque vero minus succum incorruptum deprehendi, & æque gratum sapore, colore atque odore; proinde quoque perquam præstabilis erit tam pharmacopoliis quam culinis. Alcali fixum copiosius requirit ad sui saturationem, ita quidem, ut cum succi citri vulgaris unc. $\frac{1}{2}$ ad perfectam saturationem requirat salis tartari scrup. $\frac{1}{2}$ & gr. 3, par quantitas hujuscce concentrati fere triplarem portionem alcali, sc. salis tartari drachm. $\frac{1}{2}$, postulet, vel etiam plus, si succi concentratio intensior fuit; atque hinc emergit mixtura quædam salina, eo saturatius rubra, quo fortius acidum adhibitum fuerit. Gradus concentrationis difficillime constituitur, nam variat is pro diverso gelationis gradu. At experiundo didicimus, succum citri, ad dimidium duntaxat concentratum, etsi per tantulum tempus bene se sustinet, tamen non perdurare, sed tandem situmducere. Neque magis edurat succus gelatus secundarius, tametsi satis acidus gustatu, sed mucore brevi obducitur. Ceterum methodum faciliorem succum Citri gelandi postea dedit cl. J. C. GEORGII (*). Exponit is succum Citri, e solo natali allatum, leniori hiemis frigori, inter grad. 3 & 5 in thermom. svec., & tantum quod aliquid illius, quæ in eo inest, aquæ gelu adstrictum est, glaciem sensim demit, quoad glacies acidum resipere occipiat; vel etiam formatam in superficie glaciem pertundit, protenusque subjacentem succum per foramina decantat. Atque hacce methodo pereunt qui-

(*) *K. Vetensk. Acad. handl. vol. 35. p. 245.*

quidem ipsi $\frac{7}{8}$ partes, octava solum remanente, tamen nullam ideo se pati jaeturae arbitratur, si quidem eadem illa residua pars non minus valens & ad usus quoslibet idonea est, quam fuerat antea totum.

OBS. 4. E succo Citri & acetato fortissimo Saturni commixtis, l. q. & proportione justa, paratur epithe-ma, tremori lactis simillimum, in morbis cutis utile, quod *Cremor Saturni* dicitur (*). Phænomenon illud explicatur e qualitate acidi Citri, salia in aqua insolubilia formandi, si cum calce vel plumbō saturetur.

OBS. 5. Succus Citri in officinis, pariter atque culinis, crebro usurpatur. Medici ejus ope parant serum lactis, mixturas salinas, &c. Ut bonum antiscorbuticum, succis antiscorbuticis additur; ut optimum refrigerans, in omni febris specie copiosius adhibetur, potui ægrotorum instillatus. Erysipelati scorbutico tibiarum identidem medicatus sum frictione cum pulpa Citri; quo etiam remedio cum successu usus sum adversus gingivas scorbuticas, atque ubi nomina oboritur.

OBS. 6. De Malo citreo egerunt D. NEBELIUS (**), LANZONUS (***) & H. GRUBE (†), quorum postremus recenset imprimis formulas plures, ex hoc fructu profectas.

- β.) *Malus Limonia acida.* BAUH. *Pin.* 436.
Limon vulgaris. FERRAR. *Hesp.* 191. t. 193.
Limœn-boom. COMMEL. *Hesper.* p. 6. t. 6. 7.
Malus Limonia. DOD. *Pempt.* 779. DALECH.
Hist. 301.
Pharm. *LIMONII Succus.*
Locus. India. *Arbor.*

PRO-

(*) *Pharmacop. Svecic.* p 84.

(**) *Dissert. de Malo citreo,* in VALENTINI *Simpl.* p. 625.

(***) *Citrologia,* in Oper. ejus T. I. p. 309.

(†) *Analysis malii citrei.* Hafn. 1668.

*PROPR. Succi: Odor debiliter aromaticus.
Sapor acidus, Citri succo acidior. Hujus Succa
drachm. 6 saturant salis tartari drachm. $\beta.$*

*VIRTUS &**USUS præcedentis.*

*OBS. Essentia Limonum est oleum stillatitium e
corticibus recentibus Limonum, limpidum, aqueum,
odore fragrante, grato, sapore calido, congruente.*

597. CITRUS Aurantium. LINN. *Sp. pl. 1100. Mat.*

m. 367. KNIPH. Botan. orig. cent. 9.

Oranje-boom. COMMEL. Hess. p. 12. t. 12.

*Aurantium vulgare. FERRAR. Hess. p. 374. t.
369.*

Malus Anarantia. DOD. Pempt. 780.

*Aurantia mala. DALECH. Hist. 302. CAMER.
Epit. 150. BLACKW. Herb. t. 349.*

Pharm. NAPHÆ Flores.

AURANTII Folia, Malum.

*Locus. India orientalis. Colitur in Europa
australi. Arbor.*

*FORMA. rec. Folia alterna, petiolata, coria-
cea, sempervirentia, ovato-oblonga, utrinque
attenuata, acutiuscula, margine sublerrata: ferra-
turis remotis, obsoletis, adpressis; utrinque læ-
via, lucidiuscula, undique punctata: punctis sub-
diaphanis, excavatis, disci folii parvis, in marginis
vero majoribus, tripollicaria, patentia, saturate
viridia; tenera citrina. Petioli foliis quadruplo
breviores, basi teretes; superne alati: ala plana,
cuneiformi, apice obtuso-rotundato, petiolo bre-
viore. Flores in ramulis terminales, 2 vel 3 con-
gesti, saepe solitarii, axillares, pedunculati. Pe-
dunculi petiolis breviores, albi, punctati, super-
ne sensim incrassati. Bractæ 2, parvæ, opposi-
tæ*

tæ, linearis-subulatæ, ciliatæ, ad basin pedunculi, erectæ. *CAL.* Perianth. 1-phyllum, album, punctatum, minutim pubescens, parviusculum, 5-dentatum: laciniis ovato-acutis, subcarinatis, erectis; 3 proximiорibus. *COR.* alba, carnoſa. *Petala* 5, ſeſſilia, linearis-lanceolata, obtusa, calyce pluries longiora, utrinque plana, glabra, ſubtus punctata, patentia. *STAM.* alba, carnoſa. *Fil.* glabra, in orbem poſita, connexa in 5 vel 6 corpora linearia, apice fissâ, corolla breviora, erecta. *Anth.* circiter 20, linearis-cordatae, erectæ, luteæ. *PIST.* Germen ſuperum, globosum, viride, glabrum, ſubangulatum, ſubrugosum. *Stylus* cylindricus, crassus, longitudine ſtaminum. *Stigma* capitatum, globosum, colore aurantio, ſummo apice depreſſum. *Pomum* globosum, apice & baſi compressiusculum, apice umbilico minuto, colore fulvo, magnitudine ovi anſerini vel pugni, undique adſperſum punctis excavatis, glabrum; cortice coriaceo-carnoſo, albido; epidermide crassiusculo, celluloſo: cellulis discretis, ſubrotundis, oleo eſſentiali fœcundis, ſingula terminata poro, membrana tenui tecto. *Parencyma* 8-vel 10-loculare: loculis diſpermis; veſiculatum veſiculis pedunculatis, cylindricis, acutis, parallelis, turgidis ſucco diaphano, limpidiſſimo. *Semina* ſubovata, baſi oblique truncata, apice obtuſiuscula, hinc ſtriata, inde planiuscula, laevia, parencymate cotyledoneo, bipartibili: *Columella* carnoſa, albida.

PROPR. rec. folior. *Odor* debilius fragrans, graviusculus; *sapor* aromaticus, amaricans, calidiusculus; *Florum*: *odor* fragantissimus, ſvaveolens, temulentans; *sapor* amaricans, gratus, aromaticus; *masticati* amari, mox aromate o-
do-

dori congruente, tum aromate corticis fructus, debiliore tamen. *Mali flavedinis odor* fragrans, ingratior citro; *sapor amarus, aromaticus; masticata* lingvam & fauces calefacit; *caro* corticis amara; *pulpa* acida, amaricans.

VIRTUS: folior. tonica; florum: analeptica; cort. tonica, calefaciens, stomachica; pulpæ: antiscorbutica.

USUS: folior. Convulsiones, Hysteria; corticis: Colica frigida; pulpæ: Scorbutus, Febres putridæ.

OBS. 1. Si flores & Mala aurantia eodem modo tractantur, ut de Malo citreo dictum est, *oleum stillatum & expressum* præstantissimum præbent. E floribus recentibus obtinetur *aqua stillat.* pereximia, si flores recenter collecti & integri immittuntur matellæ, ad dimidium repletæ, & in calore cineris consudare coguntur. Hoc modo elicetur parca quantitate aqua still. limpida, fontanæ simillima, odoris jucundissimi, & saporis svaviter amaricantis. Si vero flores cum adjecta aqua destillantur, obtinetur aqua stillat. fragrans, cum pauxillo *olei stillat.* supernatantis, rubentis & odoratissimi, *Essentia* vel *oleum Neroli* dicti, cari & pretiosi, siquidem Florum libr. 600 vix olei unciam dant. *FERRARIUS* (*). Cortex *Mali aurantii* siccatus s. recens extrahitur menstruo aquoso sive spirituoso. Sub destillatione cum aqua vel spiritu vini adscendit *Spiritus* sive *aqua stillat.* fragrans, grata, aromate corticis.

OBS. 2. *Succus expressus Aurantiorum acidus* est, amaricans, aromaticus. Misceatur spiritu vini, & beneficet evaporationem igne moderato in consistentiam Extracti mollis. Hinc triplici modo servari potest hic suc-

(*) L.c. Cfr. *Philos. transact.* vol. 27. p. 456.

succus, sc. vel inspissatione, vel mixtione cum spiritu vini, vel etiam condimento sacchari.

OBS. 3. Succus Aurantiorum bonum est antiscorbuticum; cortex vero stomachicum insigne. Folia Aurantiorum multum levamini attulerunt 9 epilepticis, e 15, quibus data fuerant, non tamen curarunt. MAX. LOCHER (*).

OBS. 4. De hoc Malo egit P. BURGGRAFIUS (**).

β. Burgamot-Tree. HUGHES *Barbad.* p. 127. *.

Pharm. BERGAMOT Oleum.

Locus. Insula Barbados. *Arbor.*

FORMA & PROPR. Oleum essentiale pallide citrinum, odore grato, aromatico, sapore consimili, calido.

VIRTUS: calefaciens, excitans.

USUS. Odoramenta.

ORDO POLYANDRIA.

398. MELALEUCA Leucadendra. LINN. *Mant.*

1. p. 105.

Arbor alba Cayputi. RUMPH. *Amboin.* 2. p. 72.
t. 16. 17. f. 1.

Pharm. CAJEPUTI Oleum.

Locus. India orientalis. *Arbor.*

FORMA & PROPR. Oleum stillatitium liquidum, citrinum vel viridescens, odore perquam fragrante, in Cardamomum incidente; sapore calido, odori congruente. Hoc oleum, tempori-
bus

(*) *Observat. pract.* p. 47.

(**) *Dissert. de Malo Sinensi aureo,* in VALENTINI *Simpl.*
p. 647.

bus illinitum, stricturam facit super bulbum oculi, instar fatus frigidi.

VIRTUS: calefaciens, roborans, resolvens.

USUS: Luxatio, Visus obfuscatio, Odontalgia.

OBS. De oleo Cajeputi varia curiosa profert VAN DER BECK (*).

399. *HYPERICUM quadrangulum*. LINN. *Sp. pl.*
1104.

Aescyon. DODON. *Pemptad.* 78.

Pharm. HYPERICI Herba.

Locus. Europa, in pratis. *Perenne*.

FORMA. rec. *Radix* repens, horizontalis, cylindrica, extus rubra, subtus instructa fibris carnosis, descendantibus, undique pulchre sanguineis; *parenchymate* albo. *Caulis* erectus, glaber, tetragonous: angulis acutis, adspersis punctis parvis, nigricantibus, sparsis; *pedalis*, inferne simplex, superne ramosus: ramis alternatim oppositis, breviusculis, inferne tetragonis, superne ancipitibus. *Folia* opposita, sessilia, ovali-oblonga, obtusa, pollicaria, internodii longitudine, glabra, supra viridia, lineata, rugosa, utrinque nervulosa, subtus pallidiora, nervosa, patentia, adspersa punctis diaphanis, parcus sparsis per discum, & punctis aliis nigris undique sub margine; *ramea* folia minora. *Corymbus* terminalis glaber, fastigiatus, simpliciusculus, foliosus, constructus e ramis caulis erectis, superne floriferis, pedunculis alternatim oppositis, bifloris, intermedio flore solitario, priore. *Bracteæ* ovali-oblongæ, obtuse, oppositæ, ad pedicellos, patentes. *CAL.* *Perianth.* 5-partitum: laciniis ovali-oblongis, obtusis, glabris, trinerveis, nigro-punctatis.

COR.

(*) *Act. phys. med. A. N. C.* vol. i. app. p. 123.

COR. Petala 5, ovali-oblonga, obtusa, sessilia, patentia, calyce duplo longiora, lutea, venosa, subtus adspersa punctis parvis, nigris, polymorphis, frequentibus. **STAM.** Filam. plurima, lutea, basi in fasciculos coherentia, corolla breviora. **Antb.** subrotundae, didymae, singulæ terminatae puncto nigro. **PIST.** Germen superum, viride, ovatum, glabrum, majusculum, longitudine calycis, trigonum: angulis rotundatis; desinens in **Stylos** 3, subulatos, longitudine staminum. **Stigmata** simplicia, nigricantia.

PROPR. rec. Florum: Odor debilis; sapor amaricans, balsamicus; masticata salivam purpureo tingunt. Foliorum: odor debilis, in odorem angelicæ sylvestris incidens; sapor amaricans, substypticus, subbalsamicus; masticata salivam viridescenti tingunt.

VIRTUS: balsamica, vulneraria, antihelminthica, tonica.

USUS: Hæmoptysis, Ulcera interna, Vulnera.

OBS. 1. In pharmacopoliis nostris indiscrete colligunt Hypericum perforatum & quadrangulum; quod perinde quoque esse poterit, cum ambæ species puncta nigricantia gerant; quadrangulum vero plurima. Haec puncta sunt totidem vesiculae, turgidae liquore resino-fo-oleoso, purpureo; qui, oleo expresso vel spiritu vi-ni extraestus, sangvineam tinteturam producit. In floribus semieruptis liquor tingens valentior est, quam in eruptis, ubi fere exsiccatæ & vacuae sunt haec vesiculae. Itaque flores ante eruptionem colligendi. **Infusum** aquosum florum recent. & nondum eruptorum, in B. M. digestum, rubro-purpureum fit, odore nullo, sapore debilissimo; cum Spiritu vitrioli itemque succo Citri gelato rubescit, & id quod purpureum est evane-

scit; cum solut. aluminis purpurascit, & omne quod rubrum est evanescit; cum vitr. martis subito nigrescit.

OBS. 2. *Radix* recens Hyperici quadranguli decoctum dat sapore debili, subausto, colore fere infusi florum, & cum reagentibus eadem fere phænomena monstrans ac Flores. *Folia* viridia Infusum dederunt citrino-subrubicundum, odore balsamico, sapore amaricanti-salso, austero, lingvæ fortiter se imprimente, vitriolo martis subito nigrescens.

OBS. 3. De Hyperico scripsit cl. C. N. HELLENIUS (*), botanice. Enumerat 35 species hujus generis. Laudat Hypericum in phthisi pulmonali, decocto vinoso, sc. Rc. Summitat. Hyperic. manip. I, coque in Vini hisp. libr. 4 ad tertiae partis remanentiam; hujus colaturæ libr. § svadet propinari omni mane & vespера.

CLAS-

(*) *Diff. de Hyperico*, Plas. ill. v. LINNÉ. Upl. 1776.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

ORDO

POLYGAMIA ÆQUALIS.

Tragopogon pratense. LINN. Sp. pl. 400.

Kniph. Bot. orig. cent. 9.

Tragopogon. Dod. Pempt. 256. Lob. Hist. 297.

Pbarm. BARBÆ HIRCI Radix.

Locus. Europa, in pratis. Biennie.

FORMA. rec. Radix simplex, fusiformis, spithamæa vel ultra, fibrillosa, descendens, extus fusca in spontanea, albida in culta, rugis transversalibus, annularibus, approximatis; parenchymate albido, carnosæ, lutescente; post sectionem transversalem distincto centro medullari orbiculato, minutim striato, striis radiantibus, obducto corticali parte incarnata in spontanea, alba vero in culta.

PROPR. Odor nullus; sapor subdulcescens.

VIRTUS: aperiens, mundificans.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Lac radicis recentissime sectæ e corticali parte profluit, album, spissum, cremori lactis simillimum; quod, æri expositum, brevi fit sangvineo-fuscescens, sapore dulci-amaricante. Si lac hoc chartæ albæ illinitur, illam maculat & tingit colore rubicundo; in cute vero maculas sangvineas relinquit, aqua frigida facile eluendas, tenaxque sit, adhærens, in fila ductile. Hoc

lac, vasculo exceptum & exsiccatum, abit in massam rubro-fuscum, gummi-resinosam, inter digitos tenacem, sapore debili, substyptico, in aqua solubilem: solutione sangvinea. Atque haec causa est, cur radix recens, in taleolas secta, & in aere relieta, subito rubescat; sed ut hoc evitetur, expedit taleolas sectas statim in aquam frigidam immittere, quae succum absorbet, ipsa rubicunda evadens.

OBS. 2. Radices primo autumno vel subsequente vere effodiendæ, antequam in caulem excrescant; postea nil valent.

OBS. 3. Folia, primo vere nuper erupta, refescantur prope radicem, & inter laturas sapidas locum tenent.

401. SCORZONERA hispanica. LINN. *Sp. pl.* 1112.

KNIPH. *Bot. orig. cent.* 7.

Scorzonera major hispanica 1. CLUS. *Hift.* 2.
p. 137.

Scorzonera s. viperaria. BLACKW. *Herb.* t. 406.

Scorzonera. DOD. *Pempt.* 256. LOB. *Hift.* 298.

Pharm. SCORZONERÆ Radix.

Locus. Europa. Colitur in hortis. Perennis.

FORMA. rec. Radix fusiformi-cylindrica, spithamæa, descendens, extus vestita nigro cortice & rugoso; rugis annularibus, parce fibrillosa; parencymate carnosæ, albo; post sectionem transversalem notato centro medullari orbiculato, ampio, striato: striis radiantibus, obsoletis; obducto annulo incarnato, punctato; corticali parte alba, lactescente. *Sicc.* Radix in officinis secta in taleolas longitudinales occurrit, extus rubras, intus albas, flexili-fragiles.

PROPR. rec. Odor nullus. Sapor aquosofucculentus, subinsipidus. *Siccata* radix, conscisfa

sa & inter digitos tractata, subadhæret, quod ex principio melligineo derivatur; *masticata* comminuitur, pulposa fit, sapore dulcescente, grato, absque omni aromate.

VIRTVS: nutriend, aperiens, temperans.

USUS: culinaris; Apozemata.

OBS. 1. Radices recentes resectæ ferrugineæ evadunt, si in aëre linquuntur; si vero mox, ubi resectæ fuerunt, in aquam frigidam immittuntur, albæ manent, & aquam tingunt colore ferrugineo. *Lac*, e radice incisa emanans, spissum est, album, tremori lactis simillimum; si chartæ albæ illinitur, maculis rubro-ferrugineis eam inquinat. Hoc lac, vasculis exceptum, quando siccescit, colorem assumit ferrugineum, spissescit, induitur pellicula fusca, tandem abit in Gummi-resinam, sicciorē, fragilem, superficie fusca, fragmentis albidis, odore nullo, sapore styptico. Hæc massa, fricata cum aqua pura, solvitur: solutione rubra. In aqua pura trituratione maximam partem solvitur: solutione primum lactescente, cinerea, deinde mora & quiete sensim rubra evadente, turbida, cum sedimento in fundo vasis; vitriolo martis huic solutioni addito, fusecscit, præcipitatur. In spiritu vini solvitur minor ejus pars, quam in aqua: solutione turbida, lactescente, non rubra. Massa ipsa, in parca aquæ quantitate traetata, emollitur; tenax fit, digitis paululum adhæret. In candelæ flamma accenditur hæc gummi-resina, flagrat, flamma vivida, non fumante, non fuliginosa, relicta favilla. Si vero sub accensione flamma extinguitur, fumat, nidore olei olivarum accensi. *Infusum* rad. siccatae aquosum, citrinum, limpidiusculum, dulce, cum vitr. martis vix fusecscit.

OBS. 2. Radices Scorzonerae pariter ac Barbæ hirci in culinis invaluerunt, mensisque apponuntur in aqua elixatae, cum tali embamniate, quali utimur ad asparagos.

OBS. 3. De Scorzonera scripsit J. M. FEHR (*). Præmissis præparatis, formulis, descriptioneque Scorzonerae, usum ejus in morbis malignis & febribus, in epilepsia & convulsionibus, atque in melancholia laudat. Scripsit bene & ex propria experientia: imprimitus legi merentur ea, quæ de febribus immiscerunt, observata, revera utilia & vere practica. His addi possunt, quæ de diebus criticis commentatur, ubi diem quartum in febribus magni facit. Scorzoneram in febribus adhibet sub forma decocti, malis citreis acidulati, vel pisanam parat ex Hordeo mundato, radic. Scorzonerae & Acetosæ, cum syrupo limonum & aceto rosaceo.

402. LACTUCA sativa. LINN. Sp. pl. 1118. Mat. m. 370.

Lactuca sativa sessilis sive capitata. LOB. Icon. 242.

Lactuca capitata crispis Brassicæ foliis. LOB. Hist. 121.

Lactuca capitata. DOD. Pempt. 634.

Culinis LACTUCÆ caput.

Locus. Colitur ubique in hortis. *Annua.*

FORMA. rec. *Radix* fibrosa. *Caudex* brevisimus. *Folia* petiolata, approximata, subrotunda s. ovalia, apice obtuso-rotundata, utrinque glabra, luteo-viridescentia, basi pallida, disco bulbata s. plicato-rugosa, margine-plana, vix plicata, tenuia, repanda, denticulato-serrata; exteriora magis rotunda, patentia, interiora magis oblonga, obovata, pallidiora, citrina, conniventia in caput laxiusculum, magnitudine pugni vel ultra. *Petioli* breviusculi, lineares, supra plani, subtus carinati, albi, fragiles, in caudice imbricati.

PROPR. rec. *Odor* nullus; *sapor* debilissime ole-

(*) *Anchora sacra* vel *Scorzonera*. Jenæ 1666.

oleraceus, vix subamaricans. *Masticata* folia trahilia, subsucculenta, comminuantur: saliva subviridescente, sc. e foliis comminutis.

VIRTUS: temperans, subrefrigerans.

USUS: culinaris; Ardor viscerum, Hypochondriasis.

OBS. 1. *Infusum* aquos. Laetitia recentis lutescens, debilius odoratum, sapore Laetitia; a vitr. martis nil demutatum.

OBS. 2. Laetitia inter antiquissima oleracea merito numerari potest. Apud priscos Romanos e primariis deliciis fuit, saepeque cœnam inchoaverunt Laetitia: *Claudere quæ cœnas Laetitia solebat avorum, Dic mihi, cur nostras inchoat illa dapes?* MARTIALIS. Apud nos Laetitia plerumque editur recens crudaque, cum oleo, aceto & sale. Satis facilis est digestionis; si vesperi comedatur, noctes tranquillas facit. Coquitur etiam ut alia oleracea, & tenerima fit.

403. LEONTODON Taraxacum. LINN. Sp. pl.

1122. Mat. m. 368. OED. Icon. t. 574.

Dens leonis. BLACKW. Herb. t. 1. LOB. Hist. 117.

ZANNICH. Venez. t. 288. DOD. Pempt. 625.

Taraxacon. MERIAN. Eruc. ort. p. 4. t. 9.

Pissenlit. vulgo.

Pbarm. TARAXACI Radix, Herba.

Locus. Europa, Virginia, in pascuis Perenne.

FORMA. rec. Radix cylindrica, albido-cinerrea, rugis transversalibus, subannulatis, crassitie vix digitii minimi, spithamea, subramosa, fibris capillaribus serie longitudinali simplici utrinque disposita. *Parencyma* carnosum, e tunicis congestis constans, fibra centrali rigida, tenaci, post sectionem transversalem toto dilico annulatum: annulis concentricis, punto centrali, e fibra ab-

scissa; lactescens. *Folia* cuncta radicalia, plura congesta, petiolata, palmaria, utrinque pubescentia, patentia, acuta, runcinato-pinnatifida: lobis oppositis, confluentibus, triangularibus, acutis, sursum excurrentibus, basi rectis, undique dentatis; costa tenaci, albida, teretiuscula. *Petoli* marginati, basi vaginato-plani, albi. *Scapi* plures ex una radice, erecti, teretes, vix tomentosi, nudi, uniflori, longitudine vix foliorum. *CALYX* communis glaber, duplex: *exterior* pallidus, polyphyllus: squamis linearibus, planis, acutis, imbricatis, reflexis; *interior* viridis, polyphyllus: squamis parallelis, linearibus, contiguis, erectis, carinatis, apice fuscis, calyce exteriore paullo longioribus. *COR.* composita, æqualis, hermaphrodita. *Propria* ligulata, truncata, 5-crenata, supra lutea, subtus purpurascens. *STAM.* syngenesiæ, lutea. *PIST.* Germen ovatum, scabridum; pappo stipitato, simplici. *Stylus* statinibus longior. *Stigmata* 2, revoluta, lutea. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. & sicc. rad. Odor nullus. *Sapor* initio obscure dulcescens, tum amarus. Primo vere minus amaricans, magis abundans fucco melligineo; æstate magis amaricans. *Herba* *odor* debilis; *sapor* amarus.

VIRTUS: aperiens, diuretica.

USUS. Obstructio hepatis, Hypochondriasis, Icterus.

OBS. I. Tota planta vegetans lactescit: *lacte* spiso, albissimo, tremori lactis simillimo, sapore amaro. Radix recentissime effossa admodum lactescit, sed ante desinit lac fundere, quam evidenter marcescere occipit planta. Radix, scapus, petioli, nervique foliorum lactillant, sed ipsa substantia folii minime. Hoc lac prorum.

rumpit intra tunicas radicis, ipsis tunicis non laetificans. Neque fibra centralis lacte fructuosa. Si lac istud chartae albæ tenuiter illinitur & siccatur, maculam relinquit splendentem; si crassius inungitur charta, eadem macula rubicunda inquinatur. Lac, in vasculo receptum & exsiccatum, pariter se habuit, ac de lacte Scorzoneræ dictum est.

OBS. 2. *Succus*, e radicibus Taraxaci, tempore vernali vel autumnali effossis, expressus cauteque insipidus, tenax fit, in fila ductilis, melligineus, limpidiuscus, colore rubicundo, sapore decocti maltæ insipidus. Qui vero e radicibus, sub aëtate collectis, paratur, turbidus fit, subfuscus, americans.

OBS. 3. Principio suo dulci nutrientem vim exserit hæc radix, quare etiam in culinas introduci jam pridem cœpit. Petioli teneri crudi eduntur in satura herbaria. Radices a Talpis colliguntur, quemadmodum aliæ radices esculentæ.

OBS. 4. *Infusum* aquos. radicis siccatae limpidum, lutescens, sapore radicis; vitr. martis paullulum fuscescit. *Infusum foliorum* siccatae lutescens, leniter americans; vitriolo martis nigreicit.

OBS. 5. In hepatis morbis præstantissima est radix hæc recens, sero lactis, jusculis & apozematibus incocta. Praeclera identidem inde vidi, ubi alia fecellebant. Sæpe mihi successit resolvere duritiem hepatis cum juscule, parato e radice rec. Taraxaci & fol. rec. Acetosæ, in sero lactis cocta, vel in aqua, addito vitello ovi, quod jusculum quotidie per plures septimanas, immo menses, sumferunt ægroti, propinato simul cremore Tartari. Hoc regimen exoptata præstabilit etiam in calculo felleo & in ascidine.

404. CICHORIUM Intybus, LINN. Sp. pl. 1142.
Mat. m. 373.

Intybus sylvestris. CAMER. Epit. 285.

Cichorium sativum. BLACKW. Herb. t. 177.

Cichorium sylvestre. BLACKW. Herb. t. 183.

DOD. Pempt. 624.

Pharm. CICHORII Radix.

Culinis —— Folia tenera virentia.

Locus. Europa, ad margines agrorum. Perenne.

FORMA: rec. Radix fusiformi-cylindrica, crassitie digitii, spithamæa, saepe pedalis, descendens, fibrillosa, fibrillis sparsis; parenchymate albo, post sectionem transversalem notato centro medullari orbiculato, duriusculo, striato-radiato; corticali parte carnosa, lactescente: lacte albo. Folia radicalia primi anni tenera, longius petiolata, cuneiformi-oblonga, obtusa, subsucculenta, integra, subdentata, pollicaria vel ultra, untrinque glabra, inferne attenuata, in petiolum decurrentia. Petioli supra concavi, subtus convexo-teretes.

PROPR. rec. rad. Odor nullus; sapor intensius amarus. Folior. tener. Odor nullus; sapor grate amaricans; masticata tenera, comminuntur: saliva viridi-lutescente.

VIRTUS: aperiens, tonica, diuretica.

USUS. Hypochondriasis, Obstructio hepatis, Icterus.

OBS. 1. Infusum radic. sicc. aquosum limpidum, citrinum, odore nullo, sapore primum dulcescente, mox amaro; cum vitr. martis color sibi constat.

OBS. 2. Folia tenera secantur pro satura herbaria, sapida amaritie grata.

405. CICHORIUM Endivia. LINN. Sp pl. 1142.
Mat. m. 374.

In-

Intybum sativum. Dod. *Pemptad.* 623. *Lob.*
Hift. 117.

Endivia crispa. BAUH. *Pin.* 125.

Endivia. BLACKW. *Herb.* t. 378.

Culinis ENDIVIÆ Herba virens.

Locus. Colitur ubique in hortis. *Bienne.*

FORMA. rec. *Radix* cylindrico-fusiformis, fibrillosa. *Caulis* dodrantalis, erectus, simplex, teres, glabriusculus, vix lanuginosus, pallide viridescens. *Folia* alterna, lanceolato-cuneiformia, inferne attenuata, apice obtusa, dilute viridia, utrinque glabra, sed costa scabrida, fragili; spithamea, erecta, venosa, margine undique dentata: dentibus linearibus, inæqualibus, acutiusculis, ciliato-scabris, subdenticulatis, parvis interjectis; *superiora* folia sessilia, amplexicaulia, magis linearia; *suprema* inferne ovato-oblonga, dentata, superne sensim linear-lanceolata, ferrata, ciliata; *inferiora* ut & *radicalia* longius petiolata. *Petioi* profunde canaliculati, subtus convexi, supra concavi, margine utrinque denticulato-ferrato. *Flores* axillares, solitarii, pedunculati.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* grata amaricans; *masticata* comminuantur: *saliva* viridi.

VIRTUS: aperiens, temperans.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquosum herbæ recent. lutescens Theæ instar, odore nullo, sapore amaricante; cum vitr. martis paullulum fuscescit.

OBS. 2. Si l. a. curabitur planta, in fasciculum liganda, unde folia magis albida teneraque evadunt, & flores vix erumpunt. Editur cruda, quasi *Laetula*, in satura herbaria.

406. ARCTIUM Lappa. LINN. *Sp. pl.* 1143. *Mat.*
m. 375. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 3. OED. *Icon.*
t. 642.

Bardana f. Lappa major. DOD. *Pempt.* 38.
 Lappa major f. Arctium Dioscoridis. ZANNICH.
Venez. *t.* 257.

Personata. CAMERAR. *Epit.* 887.

Pharm. *BARDANÆ* Radix, Herba, Semina.

Locus. Europa, Virginia, Canada, in cultis.
Perenne.

FORMA. rec. *Radix* cylindrico-fusiformis, ma-
 juscula, subpedalis, descendens, instructa fibris fi-
 liformibus, serie longitudinali, opposita; extus
 fulco-cinerea, apice squamis deustatis, emarcidis.
Parencyma album, post sectionem transversalem
 distinctum centro medullari orbiculato, spongio-
 so, in annosioribus cavo. *Caulis* erectus, tere-
 tiusculus, undique striato-sulcatus, grosse villo-
 sus, tripedalis, ramosus, diffusus. *Racemi* alter-
 ni, axillares e foliis, erecto-patentes, ramulosi.
Folia alterna, patentia, petiolata, cordata, su-
 pra obscure viridia, rugosa, subtus cinerea, vil-
 losa, nervosa, venulo-so-reticulata, nervis & ve-
 nulis hispidiuscula, pedalia, margine undulata,
 grosse crenata, repanda, angulis posticis rotun-
 datis, erectis, unde concava basi apparent. *Pe-
 tioli* dodrantales, undique villoso, subtriquetri,
 subtus sulcato-angulati: angulis purpurascenibus;
 supra plani, purpurei, basi latiores, subvaginati,
 subamplexicaules. *Corymbulus* florum terminalis,
 contractus, foliosus, floribus brevius peduncula-
 tis. *Foliolum* loco bracteæ, ad quemvis calycem,
 calyce paullo longius. *CAL.* communis ovatus,
 imbricatus, glaber, sed filis araneosis implexus,
 viridi-purpurascens, undique squarrosum: squa-
 mis

mis apice hamatis ; quarum inferiores subulatae ; interiores lineares, adpressae, summo apice subulato-hamatæ. *COR.* composita, cærulea, longitudine calycis, tubulata. *Propria* infundibuliformis; tubo filiformi, albo; limbo tubulosocompanulato, violaceo, 5-fido, acuto, erecto. *STAM.* *Filam.* 5, capillaria, alba. *Antb.* tubulosa, cærulea, ore 5-dentato, corolla paullo longior. *PIST.* *Germen* subtriquetrum, album, incurvatum, coronatum *Pappo* brevi, setaceo. *Stylus* albus, staminibus longior. *Stigma* bifidum, subulatum, exsertum. *Semina* oblonga, fusca, striata, crassiuscula. *Receptac.* paleaceum : paleis setosis, albis.

PROPR. rec. rad. *Odor* vix ullus; *sapor* debilis, vix amaricans, sicc. in taleolas longitudinales scissa, dura, fragilis, colore sordido; *masticata* emollitur in ore, comminuitur, non integrata; *Herbæ* rec. *odor* nullus; *sapor* amarus; *masticatur* saliva viridi; *Seminum*: *sapor* amarus.

VIRTUS radicis : mundificans, diuretica, diaphoretica.

USUS radicis : Arthritis.

OBS. 1. *Infusum aquosum rad.* sicc. tenui, lutescens, odore & sapore debili; vitriolo martis non nigrexit, sed turbidum fit & opalescit.

OBS. 2. Radix junior effossa tenera est & esculenta, & si, tanquam radix Scorzonerae, pro mensa paratur, satis sapida fit. Vernali tempore colliguntur etiam caules juniores, & parantur ut turiones asparagi, ipsa radice sapidiores.

OBS. 3. De radice Bardanæ ejusque in Arthritide usu legisse juvat libellum cl. J. HILL (*). Folia Bardanæ

(*) *Management of the Gout, with the virtues of Burdock root.* London 1758.

næ recentia laudat J. H. SCHOENHEYDER (*) in excoriationibus & ulceribus apertis, extus adhibita; narratque, hæc folia opem tulisse, ubi remedia heroica fefellerunt.

OBS. 4. Sunt qui semina in nephritide magni aestimant, sub forma emulsionis propinata.

407. CARDUUS marianus. LINN. Sp. pl. 1153.

Mat. m. 316. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Carduus Mariæ. BLACKW. Herb. t. 79. DALECH. Hist. 1475.

Sylbum, Carduus Mariæ. LOBEL. Icon. 2. p. 7.

Carduus leucographus. DOD Pempt. 710.

Pharm. CARDUI MARIÆ Herba, Semina.

Locus. Europa australis, Anglia, locis ruderatis. Annuus.

FORMA. rec. Radix cylindrica, descendens, undique fibrosa. Caulis erectus, angulatus, undique striatus, minutim lanuginosus, simpliciusculus, bi- vel tripedalis, superne ramosus. Folia ovali-lanceolata, alterna, frequentia, sessilia, amplexicaulia, glabra, nitida, supra ex albido & viridi variegata, subtus viridia, nervis hirsuta, subfragilia, margine ciliato-spinosa; inferiora pedalia, petiolata, runcinata: lobis oppositis, subovatis, concavis marginibus undique erectis, quorum inferiores sensim minores; superiora sinuata, dentata, dentibus oblongis, ciliatis; suprema lanceolata, acuta, ciliato-spinosa, concava. Petoli foliis breviores, pilosi, crassi, succulenti, trigoni, supra concavi, albo-hirsuti, subtus convexi, utrinque compressi, margine utrinque vestiti lobis foliaceis, oppositis, subcordatis, pariter ciliato-spinosis, sursum currentibus, basi liberis, erectis. Flores in ramis terminales, pendun-

(*) Collectan. Societ. med. Havnienf. vol. 1. p. 223.

dunculati, solitarii: pedunculis foliosis. *CAL.* communis ovato-subrotundus, imbricatus: squamis infimis minoribus, cuneiformibus, obtusis, minutim lanuginosis, ciliatis, inaequalibus; mediis majusculis, oblongis, adpressis, apice auctis foliolo ovato-oblongo, patentissimo, concavo, ciliato-spinoso, terminato spina rigida, recta; supremis longioribus, auriculis sensim minoribus. *COR.* cærulea, æqualis, tubulosa, calyce longior, hermaphrodita. *STAM.* syngenesiae. *Semina* obovata, obtusa, utrinque compressiuscula, ex albido & fusco nebulosa, nitida, coronata *Pappo* setaceo, simplici, instar penicilli. *Receptac.* carnosum, setaceum.

PROPR. rec. herbæ: *Odor* nullus; *sapor* herbaceus; *masticata* folia succosa: *saliva* viridisstima; *seminum*: *odor* debilis; *sapor* dulcescenti-leniter subamaricans, vix acriusculus.

VIRTUS seminum: diaphoretica.
USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquosum folior. rec. obscure vi-
ride, herbaceum; vitriolo martis nigro-fuscescit. *Infusum seminum* coniisorum aqueo-emulsivum, super-
ficie pingvi, odore & sapore nullo, a vitriolo martis
non alteratur.

OBS. 2. Semina in praxi quotidiana pulveribus re-
frigerantibus contra Pleuritidem immiscuntur. Folia,
utut saporis debilis herbacei, acidum tamen sal esse-
tiale continent, Tartaro vini analogum, ut observavit
cl. MARGGRAF (*).

408. CYNARA Scolymus. LINN. Sp. plant. 1159.
SCHWENCK. Gewass. 442.

Ci-

(*) Memoir. de l' Academ. des Scienc. de Berlin, 1747.
p. 79.

Cinara hortensis foliis non aculeatis. ZÜCK.
Mat. alim. 198.

Cynara. BLACKW. *Herb.* t. 458. DOD. *Pempt.*
712.

Culinis CYNARÆ capita virentia.

Locus. Europa australis. *Colitur in hortis.* Per-
ennis.

FORMA. rec. *Flores* (capita) subsolitarii, pedunculati: pedunculis crassis, teretibus, striatis, minutim lanuginosis, foliosis; foliis petiolatis, cuneiformi-lanceolatis, obtusis, retusis, supra venosis, glabriusculis, subtus reticulatis, villosis. *CAL.* communis ovatus, obtusus, polyphyllus, imbricato-squarrosus, magnitudine fere pugni: squamis lanceolatis, bipollicaribus vel ultra, glabris, carnosis, ad medium arcte adpressis, tum divaricatis, concavis, apice mucronatis, pungentibus; inferioribus sensim brevioribus. *COR.* composita, æqualis, tubulosa, calyce vix longior; *propria* tubo longissimo, cylindrico, albo, apice clavato; limbo 5-partito: laciniis subulatis, superne planiusculis, obtusis, sordide ferrugineis, erectis. *STAM.* Filam. 5, setacea, clavæ tubi inserta. *Anth.* cylindrica, ore 5-fido: laciniis linearibus, obtusis. *PIST.* Germen ovato-tetragonum, glabrum, instructum *Pappo* simplici, setaceo, corolla breviore, albo. *Stylus* filiformis, corolla paullo brevior. *Stigmata* 2, subulata, conniventia, erecta, corolla longiora, cærulea, exstantia. *Receptac.* carnosum, setosum: letis albis, longitudine fere Pappi.

PROPR. squamar. crud. Oder vix ullus; sa-
por amaricans, ingratus; coctar. sapor vix ama-
ricans, gratus; masticatæ carne tenera, abrasili.

VIRTUS: diuretica.

USUS: culinaris.

OBS.

OBS. 1. Calyces ante florescentiam resecti elixantur in aqua subsalsa, & eduntur squamæ calycinæ, vehiculo embammatis, abradendo carnem lateris interioris; receptaculum, ut tenerimum & magis carnosum, maxime sapidum est. Estantur etiam cocti & refrigerati, cum oleo, aceto & pipere.

OBS. 2. Corollæ rec. in aqua frigida per 48 horas infusæ, addito pauxillo salis culinaris, lac coagularunt, fere ut coagulum animale, uti docet cl. YOUNG (*). Flores Cardui vulgaris, Jaceæ, succus Acetosæ, & Galium luteum, lac non coagularunt. In Barbaria utuntur Arabes & Mauri floribus Cynaræ ad caseum conficiendum; SHAW (**).

409. CYNARA Cardunculus. LINN. Sp. pl. 1159.
Carduus esculentus. ZÜCK. Mat. alim. p. 184.
Scolymus aculeatus. TABERNÆM. Hist. 1075.
Culinis CARDUNCULI Herba.

Locus. Creta; colitur in hortis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, teretiusculus, bipedalis, crassitie pollicis, undique sulcatus, adspersus pube rara, superne ramosus. *Rami* alterni, erecti, magis lanuginosi, subviscidi, digitis compressi debilius adglutinantes, compressiusculi, striati. *Folia* radicalia petiolata, subtus villosa, albido-cinerea, reticulata, supra glabra, saturate viridia, nitidiuscula, tripedalia, duplato-pinnatifida: pinnis oppositis, oblongis, apice productis, basi in costam decurrentibus, margine foliaceo, erecto, integro; singulis pinnatifidis; finibus subtus reflexis; lacinias lanceolatis, integris; *Caulina alterna*, sessilia, brevius de-

T t

cur-

(*) *Dijert. de Laëte*, in cl. SANDIFORT *Thesaur. differt.*, vol. 2, p. 534.

(**) *Voyage dans la Barbar.* &c. tom. 1, p. 311.

currentia: decursu pinnatifido; longa, pedalia vel ultra, supra obscure viridia, subviscida, pubescentia, subtus albido-cinerea, villosa, utrinque nervis reticulata, juxta costam supra concava, pinnatifida: laciniis oppositis, lanceolatis, acutiusculis, obtuse dentatis: dentibus rotundatis, instructis aculeis fragilibus. *Costa* valida, subtus convexa, striata, supra concava. *Petoli* crassi, pubescentes, folio breviores, subtus convexi, undique sulcati, supra concavi, margine utrinque dentati. *Flores* in ramis terminales, erecti, solitarii, pedunculati. *Pedunculi* crassi, subfoliosi, uniflori. *CAL.* communis ovatus, imbricatus: squamis ovato-oblongis, glabris, vix pollicaribus, subcarnosis, ultra medium adpressis, tum divaricatis, plano-concavis, apice mucronatis, pungentibus; inferioribus sensim minoribus. *COR.* composita æqualis, tubulosa, calyce longior; *propria* tubo cylindrico, longissimo, albo, longitudine calycis, apice clavato: limbo 5-partito: laciniis setaceis, ferrugineis, apice planiusculis, obtusis, erectis. *STAM.* *Filam.* 5, setacea, clavæ tubi inserta. *Anth.* cylindrica, ferruginea, ore 5-fido, erecto, obtusiusculo. *PIST.* *Germ.* oblongum, subtetragonum, glabrum, instructum *Pappo* setaceo, corolla duplo breviore. *Styl.* filiformis, corollæ vix longitudine. *Stigm.* 2, cœrulea, cylindrica, conniventia, erecta, exstantia. *Receptac.* carnosum, setosum: setis longitudine pappi, albis.

PROPR. rec. *Odor* debilis, graviusculus, balsamicus; *sapor* amarus, odori congruens; *cœct.* sapidus.

VIRTUS: diuretica.

USUS: culinaris.

OBS.

OBS. Folia virentia colliguntur in fasciculum, circumvolvuntur stramine, & postquam lutecentia evanescunt, esitantur tamquam turones Asparagi, prævia infusione in aqua calida, abjicienda, subsequente decoctione in aqua subsalsa; eduntur cum embammate, ad asparagos usurpari solito, vel condimento ex jure carnium, butyro & pauxillo macis vel piperis.

410. CARLINA acaulis. LINN. Sp. pl. 1160. Mat. m. 378.

Chamaeleon albus. CLUS. Hist. 2. p. 155. CAMER. Epit. 428.

Carlina altera. DOD. Pempt. 715.

Parm. CARLINÆ (Cardopatiæ) Radix.

Locus. Europa australis, in apricis. Perennis.

FORMA. sicc. Radix dodrantalis, cinerea, cylindrica, apice ramosa, extus fusca, longitudinaliter rugosa, tuberculata: tuberculis sparsis, e fibris resectis; parenyma solidiusculum; post sectionem transversalem notatum centro medullari, amplio, striato: striis radiantibus, obducto annulo fusco, saepe tamen carioso.

PROPR. sicc. Odor fragrans, validus, non ingratus; sapor aromaticus, actis, calidiusculus, satis gratus; masticata emollitur in ore, lingvam & fauces labiaque leniter mordet, diu inhærens, halitum oris aromaticum reddens, etiamsi fauces aqua frigida saepius eluuntur.

VIRTUS: alexiteria, sudorifera.

USUS.

OBS. Radix aquam still. dat fragrantem, cum oleo stillatitio pariter fragrante, in aqua subsidente; NEUMANN.

OBS. 2. Flores hujus plantæ, eodem modo ac Cy-

nara solet parati, mensis in Helvetia subinde apponuntur; v. HALLER.

**4II. CARTHAMUS tinctorius. LINN. Sp. pl. 1162.
Mat. m. 377.**

Cnicus indicus. RUMPH. Amboin. 5. p. 215. t. 79. f. 2.

Cnicus vulgaris. CLUS. Hist. 2. p. 152.

Pharm. CARTHAMI Flores, Semina.

Locus. Oriens, India. Annuus.

FORMA. Petala corollæ compositæ rubra, infundibuliformia; tubo filiformi, elongato; limbo 5-partito: lacinis linearibus, acutiusculis, erectis, binerveis: nervo utrinque marginali, fuscō. Semina alba, nitida, conica, subincurvata, subtetragona, basi latiora, apice oblique obtusa, puncto excavato ad latus apicis, magnitudo seminis Pyri Mali vel ultra, ponderosa. Parencypha: nucleus oleosus, intra corticem cartilagineum.

PROPR. sicc. Florum: Odor & sapor debiles. Seminum: Odor nullus; sapor subdulcescens; mastigata leniter nauseosa, acriuscula. Semina, aquæ immissa, subsidunt.

VIRTUS florum: tinctoria; seminum: purgans. **USUS.**

OBS. Petala florum Carthami dupli prædicta sunt parte colorante, altera gummosa, lutea, altera vero resinosa. Prior extrahitur aqua simplici; posterior nonnisi in spiritu Vini vel lixiviis alcalinis solubilis. Hic color ruber est, in lutescentem vergens; diluitur & belle ceriseus fit ex addito succo citri. Sericum, bombyx & linteal hoc colore imbuentur, si juscule Carthami alcalino, succo citri saturato, frigide immittantur, præcipue si Orleana pro basi s. fundamento sup-

Supposita sit. Repetitis infusionibus, alternatim exsiccando, in materia tingenda color exaltari potest. Verum Carthami color fugax est, brevique evanescit a radiis solis, vel etiam ab aëre libero; destruitur porro ab omnibus alcalinis, acidis mineralibus, immo etiam a purissimo spiritu vini. Reducitur succo citri, quando caussa fuit alcalina.

412. SANTOLINA Chamæcyparissus. LINN. Sp.

pl. 1179. Mat. m. 383.

Abrotanum femina vulgaris. BLACKW. Herb.

t. 346. CLUS. Hist. 1. p. 341.

Santolina. DOD. Pempt. 269.

Santolina foliis teretibus. DUHAM. Arbr. 2. p.

258. t. 67.

Pharm. SANTOLINÆ Herba.

Locus. Europa australis. Fruticulus.

*FORMA. rec. Caulis fruticosus, pedalis vel ultra, teres, brunneus, cortice rimoso, erectus, ramosus, diffusus. Rami sparsi, patuli, simpli-
-ces, teretes, erecti, inferne brunnei, superne
minutim tomentosi, albi, foliosi, ramulosi: ra-
-mulis brevissimis, internodiis vix longioribus,
subpatentibus, vestitis foliis. Folia ramorum al-
-terna, frequentia, internodiis longiora, petiola-
ta, vix minutim pubescentia, pinnato-dentata:
dentibus cylindricis s. turbinatis, obtusis, brevi-
bus, patulis, utrinque geminis, unde quadrifari-
-am spectant; tenera, h. e. ramulorum, tomen-
tosa, quadrifariam imbricata: dentibus subglobo-
-sis. Petiolus (s. rachis) compressus, supra versus
marginem utrinque longitudinaliter sulcatus. Pe-
-dunculi laterales, solitarii, longissimi, dodrantales,
teretiusculi, striati, inferne pubescentes, foliosi:
foliis sparsis; superne glabri, nudi, uniflori. CAL.*

T t 3

com-

communis glaber, hemisphæricus, arcte imbricatus: foliolis subcarnosis, convexis, linearibus, obtusis, incurvis, adpressis, margine membranaceo-scariosis, minutim ciliatis, apice obtusis. *COR.* composita æqualis, discoidea, lutea, hemisphærica, magnitudine fructus Cerasi minoris; *propria* infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, incurvus, calyce longior. *Limbus* 5-fidus: laciniis ovato-acutis, reflexis. *STAMINA* syngenesiae, longitude vix corollæ. *PIST.* *Germ.* oblongum, obsolete tetragonum, glabrum, nudum. *Stylus* setaceus, corolla longior. *Stigm.* 2, subulata, revoluta, exserta, lutea. *Receptac.* paleaceum: paleis membranaceis, linearibus, concavis, carinatis, obtusis, germine paullo longioribus, apice ciliato-pilosis.

PROPR. rec. Odor fragrans, graviusculus, non ingratus; sapor amarus, aromaticus: aromate in Angelicam Iylvestrem incidente.

VIRTUS: stomachica, antihelminthica.

USUS.

ORDO

POLYGAMIA SUPERFLUA.

413. *TANACETUM vulgare.* LINN. *Sp. pl.* 1184.
Mat. m. 381. KNIPH. *Botan. orig. cent.* 2.
Gmel. Sibir. 2. *p.* 133. *t.* 65. *f.* 1.
Tanacetum vulgare luteum. ZANNICH. *Venez.*
t. 283. BLACKW. *Herb.* *t.* 464.
Tanacetum. DOD. *Pempt.* 36. LUDW. *Etyp.*
p. 11. *t.* 22.
Pharm. *TANACETI* Herba, Flores, Semina.
Locus. Europa. Perenne.

FOR-

FORMA. rec. *Caules* plures ex una radice, erecti, teretes, striato-angulati, glabri, bi-vel tripedales, superne ramosi. *Rami* alterni, erecti, simplices, pariter striato-angulati. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, utrinque viridia, glabra, punctata: punctis excavatis, opacis; pinnata: pinnis sessilibus, linear-lanceolatis, inciso-pinnatifidis, serratis; inferioribus sessilibus, superioribus in rachi communi usque ad pinnam proximam decurrentibus; costa plana, utrinque dentata, ferrata. *Corymbus* terminalis, in caule & ramis, sessilis, fastigiatus. *Bracteæ* linearifubulatæ, in pedunculis. *CAL.* communis hemisphæricus, glabriusculus, luteo-viridescens, imbricatus: squamis adpressis, lanceolatis, acutis, apice scariosis, cinerascentibus. *COR.* composita convexa, lutea, subæqualis, discoidea, calyce paullo longior. *Propria* hermaphrodita, tubulata, striato-angulata; ore truncato, 5-fido, acuto, erecto; *fæmineæ* paucissimæ in radio, angustiores, trifidæ. *STAMINA* syngenesiæ, corolla breviora. *PIST.* *Germen* oblongum, glabrum, nudum. *Stylus* setaceus, corolla longior. *Stigma*ta 2, revoluta. *Receptac.* nudum. *Semina* parva, cylindrico-turbinata, angulata, utrinque truncata.

PROPR. rec. folior. *Odor* fortis, gravis, acutus; *sapor* aromaticus, odori congruens, amarus, acutus. *Florum* rec. & siccata. *Odor* foliis conveniens, paullo tamen gratior; *sapor* a foliis vix abludens, sed magis aromaticus, magis calidus. *Seminum*: *odor* fragrans, fortis; *sapor* amarus, acutus.

VIRTUS: tonica, stomachica, anthelmintica, emmenagogue, diuretica, resolvens.

USUS: Hysteria, Cachexia, Lumbrici.

OBS. 1. Extrahitur menstruo aquoso & spirituoso.

Aqua still. fragrans. *Infusum* aquosum folior. rec. rubro-aurantium, odore fragrante Tanaceti, forti; ex vitr. martis nigrescit. *Infusum flororum* recent. limpidiusculum, luteum, odore & sapore foliorum, infuso congruente, magis tamen aromatico; vitriolo martis nigrescit. *Extractum flororum* aquosum ad unam quartam partem obtinetur; spirituosum vero ad unam sextam partem; *CARTHEUSER*. *Oleum stillat.* flavum, acre & amaricans.

OBS. 2. Lumbricis validum est antidotum *Tanacetum*, præcipue semina, in praxi medica usitatissima.

414. TANACETUM Balsamita. LINN. Sp. pl.

1184. Mat. m. 382. KNIPH. Bot. orig. cent. 2.

Mentha sarracenica. LUDW. Eclyp. p. 8. t. 16.

Balsamita mas. BLACKW. Herb. t. 98.

Costus hortensis. DALECH. Hist. 678.

Balsamita major. DOD. Pempt. 293.

Pharm. BALSAMITÆ Herba.

Locus. Europa australis. *Perenne*.

FORMA. rec. *Caules* plures ex una radice, bipedales, erecti, teretiusculi, angulati, minutim pubescentes, ramulosi, ramis alternis, breviusculis. *Folia* alterna, petiolata, integra, ovata, obtusa, margine undique obtuse ferrata, utrinque viridia; punctata, minutim pubescentia, palmaria vel ultra, erecto-patentia; *tenera* villosa. *Petiolae* foliis multo breviores, latiusculi, supra plano-concavi, subtus carinati, basi subdecurrentes. *Stipulae* 2, oppositæ, subcuneiformes, inciso-dentatae; sæpe stipulae 2 aliæ, inferiores, parva;

væ, lineares, oppositæ, integræ. *Corymbus* terminalis, erectus, minutim lanuginosus, sessilis, fastigiatus, compositus e ramis alternis, inferne foliosis, superne singulis corymbulosis. *Bracteæ* lineares, acutæ, solitariæ ad ramulos corymbi, & in pedunculis. *CAL.* communis hemisphæricus, lanuginosus, undique imbricatus: squamis plurimis linearibus, adpressis, subciliatis. *COR.* composita lutea, æqualis, tubulosa, longitudine calycis; *propria* tubo rugoso, ore quinquefido, acuto, patente. *STAMINA* syngenesiæ, longitudine vix corollæ. *PIST.* *Germen* subcylindricum, striatum, angulatum, glabrum, nudum. *Stylus* filiformis. *Stigm.* 2, linearia, truncata, patentia, corolla vix longiora. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, in Salviam incidens, sed longe gratior; *sapor* amaricans, aromaticus, ab odore non abludens, calidus; *masticata* folia rec. in lingva calefaciunt, tere ut Camphora, sed debilius.

VIRTUS: stomachica, tonica, resolvens, emmenagoga.

USUS. Hysteria.

OBS. *Infusum* aquos. viridi-rubicundum, odore fragrante, sapore amaricante, aromatico; vitriolo martis fusco-nigrescens.

415. ARTEMISIA Abrotanum. LINN. *Sp. pl.* 1185. *Mat. m.* 385.

Abrotanum mas *angustifolium* majus. DUCHAM. *Arbr.* 1. p. 20. t. 4.

Abrotanum mas. DOD. *Pempt.* 21.

Pharm. ABROTANI Herba.

Locus. Europa australis, Oriens. *Suffrutex*.

FORMA. rec. *Caulis* inferne fruticosus, fuscus, glabriusculus, teretiusculus, superne her-

baceus, undique striato-angulatus, tectus foliis & ramis, pedalis, minutim lanuginosus. *Rami* sparsi, frequentes, erecti, foliosi. *Folia* sparsa, petiolata, utrinque punctata, minutim lanuginosa, duplicato-pinnatifida: lacinias linearis-angustis, elongatis, obtusis, integerrimis, supra bisulcatis, subtus obsolete carinatis; *ramea* simpliora, longius petiolata. *Petioli* lineares, supra plani, bisulcati, subtus convexiusculi. *Axillæ* omnes foliorum fœcundæ ramulis & eorum rudimentis. *Flores* racemosi, subrotundi, nutantes, magnitudine seminis Raphani.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, validior, subtemulentans, gratus; *sapor* aromaticus, odori congruens, amaricans, calidiusculus.

VIRTUS: tonica, stomachica, resolvens, emmenagogia.

USUS. Cachexia, Gangrena.

OBS. Extrahitur potius menstruo spirituoso, quam aquoso. *Infusum* aquosum lutescens, odore fragrante, sapore aromatico, amaricante; vitriolo martis nigrefcit.

416. ARTEMISIA tota cinerea. GRONOV. Orient.

t. 259.

Artemisia contra. LINN. *Mant.* 2. p. 282?

Absinthium Santonicum. RAUW. *Rais.* p. 456.

t. 42.

Absinthium Santonicum Judaicum. ZANON.

Hift. p. 1. t. 1.

Absinthium Seriphium ægyptium & semen sanctum, Scheba Arabum. CAMER. *Epit.* 457.

t. 457. fig. infer.

Sementina. JAGER *Epist.* 388. 390.

Pharm. CINÆ (Santonici) Semina.

Locus. Regnum Mogol, Persia, Perennis.

FOR-

FORMA. sicc. Summitates plantæ deraſæ, constantes e frustulis ramulorum & foliis plantæ vi-ridulis, parvis, subulatis, obtusis, utrinque com-pressis, supra & infra linea elevata carinatis, gla-briusculis, atque e capitulis parvis, subaggrega-tis, viridulis, subrotundis, obtusis s. turbinatis, minutim pubescentibus, imbricatis: squamis o-vatis, obtusis, concavis, vix ciliatis, erectis, ad-preßiusculis; quarum inferiores sensim minores.

PROPR. sicc. *Odor* fragrans, fortis, graviu-scus, subnauseofus, balsamicus, fere Chenopo-dii Botryos; *sapor* odori congruens, amaricans, calidiusculus, aromaticus, inhærens; *masticatæ* facile comminuuntur, calent in lingua, subse-quente sensu quasi frigoris.

VIRTUS: stomachica, antihelminthica, em-menagogia.

USUS. Lumbrici.

OBS. 1. Extrahitur menstruo aquoso & spirituoso. *Extractum* aquosum vix aromaticum; spirituoso ve-ro totum ferme aroma continens. *Infusum* aquosum rubicundum, odore & sapore fragrante; vitr. martis addito nigro-fuscescit. Hujus infusi guttæ 40, aquæ font. unc. § instillatæ, addito vitr. martis, colore fuso-rubicundum protulerunt.

OBS. 2. Ad lumbricos profligandos revera multum valent semina Cinæ. Propinari debent in substantia, adultis drachm. 1 vel 2, bis de die. Pellunt commu-niter lumbricos, sed larvas insectorum minus certo; nec Tænia illis cedit, nisi in larga dosi sumantur, & tunc solummodo frustula Tæniæ divulsa abeunt.

OBS. 3. Puellæ cuidam decenni, vermis confli-ctanti, semina Santonici exhibui, sed per illud tempus, quo iis utebatur, menses fluxerunt, qua re cognita, u-

sum

sum eorundem diffusasi, unde etiam fluxus sponte cessavit.

OBS. 4. Inter merces, quas mercatores Armeni per Orientem circumferre solent, semina Cinæ locum occupant, quæ e regno Mogol petita esse afferit TOURNEFORT (*).

417. ARTEMISIA pontica. LINN. Sp. pl. 1187.

Mat. m. 387. KNIPH. Bot. or. cent. 6.

Absinthium tenuifolium incanum. DUHAM.

Arbr. 1. p. 24. t. 5. DED. Pempt. 24.

Pharm. ABSINTHII PONTICI Herba.

Locus. Austria. Colitur in hortis pharmaceuticis. Perennis.

FORMA. rec. Caules plures ex una radice, teretes, minutim angulati, pedales, superne pubescentes, ramulosi. Rami alterni, breviusculi, axillares e foliis, patentes. Folia alterna, petiolata, plana, supra minutim villosa, viridescentia, obsolete punctata, subtus cinerea, minutim tomentosa, pollicaria vel ultra, duplicato-pinnatifida: laciis linearis-subulatis, acutiusculis, simplicibus vel dentatis; superiora trifida. Petioli foliis breviores, supra canaliculati. Stipulae loco foliola 2, opposita, pinnatifida, laciis subulatis, petiolo breviora, erecta. Racemi florum virgati, in ramis terminales, elongati, patentes, singuli secundi, compositi e racemulis brevibus, foliosis: foliolis trifidis s. simplicibus, breviusculis, vix patentibus. Flores subglobosi, nutantes, breviter pedicellati: pedicellis foliosis. Calyces tomentosi. Corolla composita, calyce vix longior.

PRO-

(*) Voyage du Levant, T. 3. p. m. m.

PROPR. rec. & sicc. Odor fere Abrotani, sed gravior, in Absinthium vulgare incidens, verum gratior; sapor aromaticus, calidiusculus, in Tannacetum incidens, amarus; masticata folia recentia debilius calent in ore & faucibus, saliva virideſcente.

VIRTUS: tonica, stomachica, emmenagogue, reolvens.

USUS. Atonia.

OBS. *Infusum aquoſ. herbae rec. pulchre luteum, aurei coloris, odore fragrante, ſapore aromatico, amaricante, grato; vitriolo martis ſubito fuſco-nigreficit; huius in fuſi gutaꝝ 20, cum aquaꝝ puraꝝ unc. 3 & vitriolo martis, colorem obſcure virideſcentem ſtiterunt.*

418. ARTEMISIA Absinthium. LINN. Sp. pl. 1188.

Mat. m. 386. KNIPH. Bot. orig. cent. 4.

Absinthium vulgare majus. DÜHAM. Arbr. 1.

p. 24. t. 5.

Absinthium vulgare latifolium. FEHR. Absinth.
p. 11. t. 1.

Absinthium. CAMER. Epit. 452. BLACKW. Herb.
t. 17.

Absinthium latifolium. DOD. Pempt. 23.

Pharm ABSINTHII VULGARIS Herba.

Locus. Europa, in ruderatis. Perennis.

FORMA. *rec. Caulis erectus, bipedalis, teres, villotus, albidus, striato-angulatus, paniculatim ramosus. Rami sparsi, axillares e foliis, simplices, striati, superiores breviores. Folia alterna, petiolata, plana, minutim punctata & villosa, mollia, pinnatifida: pinnis alternis, cuneiformibus, pinnatifidi: laciniis linearibus, obtusiusculis; summa ſeffilia, cuneiformia, trilobata; ju-prema integra, lineari-lanceolata. Racemi flo-*
rum

rum terminales in ramis, compositi, foliosi, secundi, virgati, floribus pedicellatis, nutantibus, magnitudine seminis Cannabis. *Braeæ* linearisubulatae, ad pedicellos. *CAL.* communis subglobosus, imbricatus: squamis exterioribus subulatis, obtusis, superne concaviusculis, tomentosis, paucioribus; interioribus ovatis, scariosis, ferrugineis, carina villosis, adpressiusculis. *COR.* composita convexiuscula, calyce paullo longior, ferrugineo luteescens; *propria disci* hermaphrodita, tubulosa, ore 5-fido; *radii* toeminea, subulata, obtusa. *STAM.* *Filam.* 5, capillaria. *Anth.* tubulosa, corolla brevior. *PIST.* utrisque: *Germen* obovatum, glabrum, nudum. *Stylus* subulatus, corolla paullo longior. *Stigm.* 2, patentia; *disci* linearia, truncata; *radii* subulata. *Receptac.* villosum.

PROPR. *rec.* & *sicc.* *Odor* fortis, fragrans, graviusculus, temulentans; *sapor* intensius amarus.

VIRTUS: antiputredinosa, antacida, anthelmintica, resolvens, tonica, stomachica.

USUS. Vermes, Cachexia, Colica frigida, Appetitus langvidus.

OBS. 1. *Infusum* aquosum luteum, odore fragrante Absinthii, sapore amarissimo; vitriolo martis fuso-nigricans. *Oleum still.* fuso-viride, odore Absinthii debiliore, sapore debili Absinthii, calidiore, terebinthinato. Ex herb. absinth. libr. 25 olei ess. a drachm. 6 ad drachm. 10 obtinuit cl. BAUMÉ. Inter decoquendum, id, quod in Absinthio temulentiam facit, avolat; hinc *extractum* aquos. bonum, perquam amarum, $\frac{1}{3}$ febre ponderis foliorum.

OBS. 2. De Absinthio scripsit J. M. FEHR (*). Laudat Absinthium ut optimum ventriculo, & reliquis a-

(*) *Hiera picra*, vel de *Absinthio analœcta*. Lips. 1668.

maris præstabilius, cum primis utile in hydrope, vermisibus, obstructionibus hepatis, scorbuto, calculo, podagra, febribus intermittentibus. Nocere vero dicit absinthium epilepticis & apoplecticis. Scripsit pro tempore bene, & proprias observationes immiscauit plurimas.

419. ARTEMISIA vulgaris. LINN. Sp. pl. 1188.

Mat. m. 384. ZANNICH. Venez. t. 237. BAUH.

Hist. 3. p. 184.

Artemisia. BLACKW. Herb. t. 431.

Pharm. ARTEMISIÆ RUBRÆ Herba.

Locus. Europa, in cultis. Perennis.

FORMA. rec. *Caulis* erectus, bi-vel tripedalis, teres, striato-angulatus, lanuginosus, ramosus. *Rami* virgati, simplices, striati, pubescentes, erecto-patentes; inferiores sensim minores. *Folia* plana, alterna, sessilia, bipinnicaria, superne viridia, glabra, lineata, subtus tomentosa, cinerea, pinnatifida: lobis suboppositis, lanceolatis, acutis, pinnatifidis: lacinias linearis-lanceolatis, acutiusculis, subdentatis; lobis inferioribus integris; infimis lunulatis, stipulae loco circum cauem flexis. *Panicula* florum terminalis, virgata, composita e racemis compositis, elongatis, foliosis, in ramis terminalibus, constantibus e racemis axillaribus, simplicibus, secundis, erectis, floribus brevius pedicellatis. *Folia* floralia longitudine fere racemi, reflexo-patentia, integra; inferiora simpliciter pinnatifida; suprema simplicia, linearia. *Bracteæ* linearis-lubulatae, ad pedicellos sitæ, longitudine fere florum. *Cal.* communis subglobosus, magnitudine seminis cannabis, subtomentosus, imbricatus: squamis erectis, adpressiusculis; inferioribus linearibus; superioribus

bus ovali-oblongis, obtusiusculis, membranaceis.
COR. composita discoidea, longitudine calycis, truncata; *propria* disci hermaphrodita, cinerea, tubo filiformi, limbo turbinato, ore 5-fido, acuto, revoluto; *radii* foeminea, setacea, ore bifido. *STAM.* Filam. 5, capillaria. *Anth.* cylindrica, corolla brevior. *PIST.* Germ. utrisque ovale, obtusum, glabrum, nudum. *Styl.* setaceus, corolla longior. *Stigm.* 2, linearia, latere superiore sulcata, revoluta; *radii* subulata, acuta; disci truncata, apice villosa. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. fol. Odor subfragrans, subrancidus; florum odor fortior; sapor herbaceus, vix amaricans; masticata folia tenacia, saliva viridi.

VIRTUS: emmenagogue, tonica.

USUS. Menes difficiles, Obstructio mensium.

OBS. Infusum aquosum herbæ rec. obscure rubro-aurantium, odore forti herbæ, sapore odori congruente, vix amaricante; vitriolo martis nigro-fuscellens.

β. Artemisia orientalis vulgaris facie, Asia pat-tree malab. *BROWN.* *Philos. transact.* vol. 22.

p. 1020.

Artemisia chinensis cuius mollugo Moxa dicitur. *PLUK.* *Almag.* 50. t. 15. f. 1.

Ambrosia, forsan e China, anguriæ foliis accedens. *PLUK.* *Alm.* 27. t. 10. f. 6.

Pharm. MOXA.

Locus. China, Japonia. *Perennis:*

FORMA. Fomes tomentosus, viridescenti-brunneus, levissimus, mollis, constans tomento conglomerato: pube tenui.

PROPR. Odor nullus, neque sapor. Moxa optimo fomiti inservit; accenditur facilime ex scintillis, absque flamma, igne glacente & serpente,

te, usque dum consumta fuerit, fumat: fumo non ingrato, remanente favilla molliissima, sub-tomentosa, nigra, inquinante. In ignis flamma accenditur & flagrat absque flamma. Moxæ frustulum magnitudine semenis Pisii majoris, foliis libri cuiusdam impositum, accensum & crematum, folium primum comburendo perforavit, maculamque nigram subjacenti folio impressit.

*VIRTUS.**USUS. Cauterium actuale.*

OBS. 1. Japonenses sequenti modo Moxam præparant. Sumunt Artemisiæ, in umbra exsiccatam, potissimum ejus summitates, tundunt, & inter anibas manus tamdiu conterunt, quoad nihil amplius quam fibræ internæ lanuginosæ remanent, cortice externo deejidente. Abhinc carminantur pectine, ita ut qui processum non conspexit, Artemisiæ amplius esse vix credere posset. A. CLEYERUS (*).

OBS. 2. De Moxa illiusque usu bene scripsit E. KÆMPFERUS (**). Gentibus plerisque Asiaticis moris antiqui fuit, ut morbos doloresque cauterizando levarent ac depellerent. Arabes, Persæ & Indi Muhamedani solent panum gossypinum cæruleum convolvere, & supra cutem comburere, ex quo sequuntur ulcera, sœpe consolidatu difficillima. Indi gentiles medullam adhibent Junci, oleo Sesami imbutam, & post accensam. Chinenses & Japonenses, revellendi scopo, Moxa ignescenti pro cauterio utuntur. Scilicet portionem Moxæ in eorum convolvunt, altitudinis pæne uncialis, quem loco inurendo affigunt, & illata fastigio scintilla accendunt, atque sic despaci finunt. Imbecillibus 3' duntaxat Moxæ turundas singulis in locis applicant, robustioribus vero 10, 15,

U u.

20

(*) Epistol. apud VALENTINI l. c. p. m. 432.

(**) Amœnit. exot. p. 589* seq.

20 vel plures imponunt. Hic mos arthritidem, podagram & rheumatismum ope cauterii actualis curandi, ad alias migravit gentes. Sic Arabes Beduini gossypium loco moxæ supra cutem accendunt (*). Lappones vero fomite ex Boleto igniario utuntur (**). Experimentis institutis LEEUWENHOEK (***)) invenit, Gossypii concisi turundam, juxta Moxam chartæ impositam & acceniam, illi exacte respondere; sic parum refert, utrum cum Moxa vel Gossypio cauterium applicetur.

420. ARTEMISIA Dracunculus. LINN. Sp. pl. 1189.

GMEL. *Sibir.* 2. p. 126. t. 59. 60. f. 1.

Dracunculus hortensis. BLACKW. *Herb.* t. 116.

Draco herba. DOD. *Pempt.* 697.

Pharm. *DRACUNCULI* Herba.

Locus. Sibiria, Tartaria. Perennis.

FORMA. rec. *Caules* plures ex una radice, bipedales vel ultra, erecti, teretes, superne subangulati, glabri, ramosi. *Rami* alterni, erecti; inferiores breviores. *Folia* alterna, sessilia, integra, lanceolata, acuta, utrinque glabra, atomis minutissimis adspersa, supra venulosa; *caulina* biplicaria, dependentia; *ramea* minora, patentia. *Stipulae* 2, oppositæ, linearis-subulatae, obtusæ, erectæ, arcuatæ. *Racemus* terminalis, compositus, paniculatus, foliosus: foliolis linearibus. *Flores* pedunculati, parviusculi, gemini, ovati, nutantes, magnitudine vix seminis Cannabis. *CAL.* communis imbricatus, ovatus, saturate viridis, vix minutum pubescens: squamis ovato-oblongis, convexis, obtusis, concaviusculis, margine tenui, mem-

(*) D' ARVIEUX *Voyage dans la Palest.* p. 254.

(**) CAN. LEEM de *Lapponib.* Finmarch. p. 378.

(***) Vide ROB. HOOKE'S *Philos. experim. and observat.*

membranaceo; quartum inferiores minores. *COR.* *composita* calyce paullo longior, ferruginea, tubulata, mixta e floribus hermaphroditis & fœmineis; *propria* hermaphrodita, cylindrica, tubo subdiaphano, ore 5-fido, acuto; fœminea ova-ta, subdiaphana, acuta, hermaphroditis duplo brevior. *STAMINA* syngenesiæ, corolla breviora. *PIST.* *Germen* hermaphroditis obsoletum; fœmineis cylindricum: *Stylus* cylindricus. *Stigma* hermaphroditis simplex, inclusum; fœmineis bifidum, revolutum, corolla longius. *Receptaculum* nudum.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, sive olens, subambrosiacus; *sapor* aromaticus, odori congruens, gratus, vix amaricans; *masticata* folia calidiuscula, lingvam & fauces leniter calefacientia, saliya viridescente.

VIRTUS: tonica, stomachica, emmenagogica.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquosum herbæ rec. lutescens, odore fragrante, valido, sapore aromatico; vitriolo martis fusco-nigrescit. *Acetum* Dracunculi gratissimum, fragrans.

OBS. 2. Folia Dracunculi siccata s. recentia adhibentur in culinis nostris ad cibi condimentum, omnino gratum. In Persia usus culinaris hujus herbæ ab antiquissimis retro temporibus adeo invaluit, ut in omni mensa spargantur hujus folia, quæ a discumbentibus inter prandendum arripiuntur edunturque, ad appetitum excitandum. Immo pauperes Persarum cibi loco Dracunculum adhibent, contenti solo pane, cum Dracunculo & oxylaccharo. P. DELLA VALLE (*).

(*) Reiß-beschreib. part. 3. p. 54.

421. GNAPHALIUM arenarium. LINN. Sp. pl. 1195. Mat. m. 389.

Chrysocoma aureave coma. LOB. Hist. 256.
Stoechas citrina germanica. BAUH. Hist. 3.p. 153.
Pharm. STOECHADIS CITRINÆ Flores.
Locus. Europa, in campis arenosis. Annum.
FORMA. rec. Corymbus cyinosus, terminalis,
subquarrosum: squamis alternis, linearibus, acutis, minutim tomentosis, remotis. CAL. communis luteo-citrinus, subrotundus, imbricatus: squamis scariosis, lanceolatis, acutis, laxiusculis; inferioribus minoribus. COR. composita tubulata, calyce paullo longior, planiuscula, lutea, uniformis, hermaphrodita; propria cylindrica, ore 5-fido, erecto. STAM. syngenesiae. PIST. Germen cylindricum, scabriusculum, coronatum Pappo simplici, sessili, longitudine corollæ. Stylus setaceus. Stigm. 2, subulata. Receptac. nudum.

PROPR. sicc. Odore & sapore caret. Recens odoris est debilis, at grati.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS. Suffimenta.

OBS. Infusum aquos. lutescenti-rubicundum, sapore & odore debili; vitriolo martis fusco-nigrescit.

422. GNAPHALIUM dioicum. LINN. Sp. pl. 1199.

Mat. m. 388. KNIPH. Bot. orig. cent. 3.

Pilosella minor. DOD. Pempt. 68.

Pharm. GNAPHALII Flores.

Locus. Europa, in apricis. Perenne.

FORMA. rec. Flores pedunculati, corymbosi: corymbo terminali, simplici, tomentoso, folioso. CAL. communis imbricatus: squamis linearibus, viridescentibus, tomentosis, apice coronatis squama scariosa, obovata, obtusa, incarnata vel

vel purpurascente, erecta, radium efformante.
COR. compos. hermaphrodita, longitudine calycis; *propria* infundibuliformis; tubo cylindrico, viridescente; limbo campanulato, villoso, dia-phano, 5-fido, acuto. *STAM.* syngenesiæ. *PIST.* Germ. turbinatum, coronatum *Pappo* simplici, subcrispo. *Styl.* cylindricus. *Stigma* simplex. *Fæminei* flores in distincta planta, corollulis cylindricis, angustis. *Receptac.* nudum, faveolatum.

PROPR. rec. *Odor* debilissimus; *sapor* her-baceus, debilis.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS. Suffimenta.

OBS. I. *Infusum* aquos. colore potus Thæ, odore debili, sapore substyptico; vitriolo martis nigrescit.

423. TUSSILAGO Farfara. LINN. *Sp. pl.* 1214.

Mat. m. 391. *OED.* *Icon.* t. 595. *KNIPH.* *Bot.* orig. cent. 6. *BLACKW.* *Herb.* t. 204.

Tussilago vulgaris. ZANNICH. *Venez.* t. 266.

Tussilago. CLUS. *Hist.* 140. CAMER. *Epit.* 590. 591.

Tussilaginis flores & folia. LOB. *Hist.* 320.

Bechii sive Farfaræ flores & folia. DODON.

Pempt. 586.

Pbarm. *FARFARÆ* Radix.

TUSSILAGINIS Folia, Flores.

Locus. Europa, locis humidiusculis, argillosis,

Perennis.

FORMA. rec. *Radix* vivax, cylindrica, teres, repens, tuberosa: tuberculis sparsis, subrotundis, subpeltiformibus; ramosa, fibrillosa. *Scaji* vernales, radicales, plures ex una radice, ereceti, simplices, subspithamæi, teretiusculi, undique angulati, pubescentes, uniflori, squamosi: *squamis* sparsis, membranaceis, viridescentibus

lanceolatis, coneavis, obtusiusculis, subpatentibus, glabris. *Folia* post florem, æstivalia, radicalia cuncta, longius petiolata, subrotundo-cor data, margine undique obsolete lobata, denticulata; denticulis subpurpurascensibus; spithamea vel ultra, plana, patentia, supra glabra, venosa, subtus tomentosa, cinerea. *Petoli* teretes, supra plani, tomento raro adspersi. *CAL.* communis cylindricus, undique sulcatus, pubescens, utrinque truncatus, basi tumidiusculus, multipartitus; segmentis linearibus, parallelis, subæqualibus, convexis, marginibus membranaceis inflexis, apice pariter membranaceo, explanato, erecto, obtuso. *COR.* composita radiata, lutea, calycis longitudine. *Radius* foemineus, multiflorus, corollis linearibus, angustis. *Discus* hermaproditus, corollis infundibuliformibus, tubo filiformi, elongato, limbo subdiaphano, campanulato, 5-fido, revoluto. *STAM.* syngenesiae, corolla paullo longiora. *PIST.* Germ. utrisque cylindricum, coronatum *Pappo* piloso. *Styl.* cylindricus, foemineis elongatus. *Stigma* hermaprod. simplex; foemineis 2, acuta, *Receptaculum* nudum.

PROPR. rec. *Radicis*: *Sapor* substypticus, leniter amaricans; sicc. odor debilior, non ingratius, *sapor* ut in recente. *Folior.* rec. *odor* debilis; *sapor* amaricans; *masticata* folia lubriciuscula. *Florum* rec. *odor* debilis; *sapor* amaricans, subgrayiusculus.

VIRTUS: pectoralis.

USUS. Tussis.

OBS. I. *Infusum* aquosum *radicis* luteo-rubescendum, sapore radicis; vitriolo martis nigrescens. *Folio rum*

rum infusum luteum, leniter amaricans, satis gratum; vitriolo martis subito fusco-nigrescit.

OBS. 2. Folia & flores Tussilaginis sub forma infusi frequenter adhibent nostrates in Tussi. Cl. TH. PERCIVAL (*) usum hujus herbæ comprobat in hectica & diarrhœa colliquativa.

424. TUSSILAGO *Petasites.* LINN. *Sp. pl.* 1215.

Mat. m. 390.

Tussilago major. CAMER. *Epit.* 592.

Petasites. DOD. *Pempt.* 487. LOBEL. *Hist.* 321.

BLACKW. *Herb.* t. 222.

Pharm. *PETASITIDIS* Radix, Herba, Flores.

Locus. Europa, solo pingviore. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix* vivax, majuscula, crassifie digiti, longa, descendens; nudiuscula, glabra, apice incrassata, ovata, fibris plurimis filiformibus, descendantibus, e capite radicis excurrentibus. *Parencyma* carnosum; post transversalem sectionem notatum disco medullari orbiculato, cincto annulo composito e punctis geminis, oblongis. *Petioli* radicales, teretiusculi, striati, villosi, canaliculati, basi vaginati. *Folia* cordata, subtomentosa, quinquenervia: nervis ramosis; margine inæqualiter serrato-dentata: denticulis fuscouscentibus; post flores increcentia, tandem magna. *Scapus* radicalis, angulatus, subtomentosus, dodrantalis, adspersus *squamis* lanceolatis, nervosis, glabris, purpurascenscentibus. *Thyrsus* terminalis, simplex, ovatus, obtusus, pedunculis unifloris. *Bracteæ* linear-lanceolatae, acutæ, ad basin pedunculi inque ipso pedunculo sitæ, longitudine pedunculi. *CAL.* communis turbinatus,

U u 4

gla-

(*) *Essays medical and experimental*, vol 2. p. 224.

glaber, multifidus; segmentis linear-lanceolatis, obtusiusculis, parallelis, imbricatis, erectis, subæqualibus. *COR.* composita discoidea, hermaphrodita, violacea; *propria* infundibuliformis, tubo filiformi, elongato, limbo campanulato, 5-fido, revoluto. *STAM.* syngenesiæ. *PIST.* *Germ.* teres, glabrum, coronatum *Pappo* simplici, paucissimo. *Stylus* staminibus longior. *Stigma* ovatum, obtusum, exsertum. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. *Radic.* *Odor* gravis; *sapor* ingratus, amaricans, leniter stypticus. *Foliorum:* *sapor* nauseosus, radice fortior, ingratus, amaricans; *odor* ingratus. *Flores* odore & sapore conveniunt, sed debiliores sunt.

VIRTUS: tonica, alexiteria, sudorifera, emmenagoga.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum radicis sicc. rubicundo-lutescens; cum vitr. martis nigrum. *CARTHEUSER* dicit, aquam still. odoram esse, & parum olei still. præbere; *Extractum* aquosum ad unam quartam partem; spirituosum vero ad unam octavam partem dare.

425. SOLIDAGO Virgaurea. LINN. *Sp. pl.* 1235.

Mat. m. 393. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 7.

Virga aurea vulgaris latifolia. BAUH. *Hist.* 2.
p. 162.

Virga aurea altera ferrato folio. LOB. *Hist.* 159.

Virga aurea. DODON. *Pempt.* 142.

Pharm. *VIRGÆ AUREÆ* Herba.

Locus. Europa, in pratis sylvaticis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, *pedalis* vel ultra, simplex vel ramosus, striato-angulatus, glaber. *Folia* alterna, ovali-oblonga, acuta, argute serrata, minutim ciliata, venosa, utrinque glabri-

briuscula, supra adspersa atomis cinereis, bipinnicaria; inferiora caulina petiolata, superiora spatulata, summa sessilia, ovato-lanceolata, utrinque attenuata, integerrima; radicalia, h. e. folia primi anni novi surculi, longe majora, palmaria vel ultra, longius petiolata: petiolo profunde canaliculato. *Racemus* terminalis, pubescens, subsecundus, foliosus, erectus, compositus e racemulis axillaribus, foliis brevioribus, erectis, pedicellis instructis bracteis linearis-subulatis. *CAL.* communis imbricatus: squamis submembranaceis, glabris, linearis-lanceolatis, acutiusculis, carinatis, erectis, squarrosois; interioribus paullo majoribus. *COR.* composita lutea, radiata; *propria radii* ligulata, linearis, obtusa, emarginata, calyx paullo longior, erecta; *disci* tubulata, ore 5-fido, erecto, acuto. *STAM.* syngenesiae, longitudine corollae. *PIST.* *Germen* utrisque oblongum, glabrum, coronatum *pappo* simplici, erecto. *Stylus* filiformis. *Stigm.* 2, subulata, revoluta. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. *Odor* debilis, aromaticus; *sicc.* fortior. *Sapor* amaricans, calidiusculus.

VIRTUS: tonica, vulneraria, diuretica.

USUS. Ulcera interna.

OBS. *Infusum* aquosum rubicundum, odore subbalzamico, sapore herbaceo, subamaricante; cum vitr. martis nigro-fuseescit.

426. INULA Helenium. LINN. *Sp. pl.* 1236. *Mat.*

m. 392. KNIPH. *Bot. orig.* cent. 7.

Helenium. CAMER. *Epit.* 35. DOD. *Pempt.* 342.

BLACKW. *Herb.* t. 473.

Pharm. ENULÆ Radix.

Locus, Europa australis, Virginia, Perennis.

U u 5

FOR-

FORMA. rec. *Radix* alba, majuscula, superne ramosa: ramis teretibus, breviusculis; undique obsessa fibris filiformibus, albis. *Parencyma* carnolum, transversaliter sectum centro medullari albo, uniformi, circumdato annulo punctato, peripheria incarnata, striis radiata.

PROPR. rec. *Odor* gravis, validiusculus; *sapor* amarus, ingratus, in Acorum incidens, diu inhærens; *masticata* comminuitur, lingvam faucesque leniter calefaciens.

VIRTUS: tonica, stomachica, pectoralis, alexiteria, pellens, emmenagoga.

USUS. Tussis, Asthma humidum.

OBS. *Infusum* aquosum luteo-rubicundum, odore & sapore radicis; cum vitr. martis nigrescens. Rad. recent. libræ 3 dant extr. aquosi unc. 7. Destillatione aqua still. fragrans obtinetur, una cum pauxillo camphoræ, sub forma floccosa, ut observavit cl. MALQUIN. Ex radic. rec. Enulæ libr. 12, drachm. § olei still. facile crystallibilis, obtinuit cl. BAUMÉ.

427. ARNICA montana. LINN. *Sp. pl.* 1245. *Mat.* m. 395. *OED.* *Icon.* t. 63.

Diuretica. RENEALM. *Specim.* 118.

Caltha alpina. TABERNÆM. *Icon.* 336.

Pharm. ARNICÆ Herba, Flores.

Locus. Europa frigidior, in pratis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Caulis* teretiusculus, subnudus, undique striatus, pubescenti-scaber, erectus, pedalis, simplex vel subdivisus: ramis binis, oppositis, simplicibus, erectis, nudiusculis, elongatis, unifloris. *Folia* radicalia plura, ovato-lanceolata, obtusiufcula, sessilia vel inferne attenuata in petiolos lineares, palmaria, integerrima, margine minutim ciliata, supra scabriuscula, subtus glabra

bra, trinervia; *caulina* pauca, minora, alterna, linearis-lanceolata, sessilia, ad ramificationem vero opposita. Flores terminales, solitarii, pedunculati, erecti. *CAL.* communis imbricatus, simplici serie: foliolis linearis-lanceolatis, acutis, æqualibus, pubescentibus, erectis. *COR.* composita radiata; *propria radii* ligulata, lanceolata, calyce triplo longior, patens, picta nervis longitudinalibus, parallelis, apice truncata, tridentata; *disci* infundibuliformis, tubo cylindrico, pubescente, limbo cylindrico, glabro, quinquefido, laciniis revolutis, acutis, scabridis. *STAM.* *disci:* Filam. 5, capillaria, minuta; *Antb.* cylindrica, corolla longior, ore 5-fido; *radii:* Filam. 5, tubo corollæ inserta, sterilia, absque anthera. *PIST.* utrisque. *Germ.* subulatum, undique longitudinaliter striato-angulatum, scabrum, coronatum pappo. *Styl.* setaceus, staminibus longior. *Stigm.* 2, subulata, spiraliter revoluta. *Semina* fusca, germini conformia, coronata *Pappo* simplici, albido. *Receptac.* nudum.

PROPR. sicc. Odor debilior; rec. graveolens, sternutationem movens; sapor herbaceus, acris. Folia siccata fragiliuscula, inter manus confricata & olfacta sternutationem excitant.

VIRTUS: emetica, errhina, diuretica, dia-phoretica, emmenagogica.

USUS. Paralysis.

OBS. 1. *Infusum* aquosum rubicundum, herbaceo sapore, substyptico; vitriolo maris nigrescit.

OBS. 2. Putant quidam, Arnicam sanguinem resolvere grumosum, unde *Panaceam lapsorum* vocant. Sed a parca dosi incipientem, ne molestiam creet, & sensim augendum. Propinatur communiter in infuso, initio dosi drachm. 1, mane & vesperi, & prout cir-

cum-

cumstantiae ferunt sensim adscendendo ad drachmas 2 vel ad unc. 3. Cl. H. J. COLLIN (*) pulchra experimenta instituit cum floribus Arnicæ. Laudat illos in paralysi, quod 28 paralyticis profuerunt. In amaurosis 9 casibus usum illorum adstruit, & observat, dolores acerbos in oculis circa finem curationis supervenisse. Præterea etiam antispasmodicos illos deprehendit, quod 7 casibus testatur. Credit, hos flores vascula cerebri obstructa infarctaque, & materiam ibi collectam solvere, atque sic virtute quadam specifica in sensorium commune & nervos agere. Apud plerosque urinam cident, vel sudorem movent, sed identidem curant sine ulla evacuatione sensibili. Sub actione florum communiter sentiuntur formicationes, dolores lancinantes vel urentes, quæ quidem bona sunt signa. Sub initio curæ saepè sentiunt ægri molestiam in regione epigastrica, interdum etiam vomitum experiuntur. Si plethora & spissitudo humorum inflammatoria adest, præmitti debent evanescantia, antiphlogistica & refrigerantia. Alvus sub usu florum semper libera servanda, quare laxantia interponenda. Cl. V. B. AASKOW (**). curiosa experimenta cum floribus Arnicæ instituit, quibus confirmavit utilitatem horum florum, in tenuiori cerevisia infusorum, in paralysi, pro potu ordinario. Rheumatismum chronicum lumborum post 14 dies curavit flor. Arnic. unc. 3, crem. tart. drachm. 2 & Nitri drachm. 3, in cerevisia tenuioris fervidae libris 2 infusis; cuius mixturæ dimidiam portionem omni mane & vespera epotaret æger. Febres intermittentes protractas apud binas mulierculas curavit flor. Arnic. manip. 3, quem in cerevisia infudit, & 2 horis ante paroxysmum propinavit. Valide operatum est hoc infusum, cum vehementibus vomititionibus, sed tamen febrem sustulit apud unam post binas

(*) Observat. part. 4. p. 5. seq.

(**) Socier. med. Hænviens. collectan. vol. 2. p. 162. seq.

nas doses, apud alteram vero post unicam. Ego herbae Arnicae unc. p̄ coquere feci cum cerevisia, cuius colaturam per plures dies omni mane sumserunt ægri, quartana laborantes; sed febrim non fustulit hoc decoctum, verum majorem in modum vexavit ægrotos. Nec radix Arnicae mihi successit in quartana, sub forma pulveris exhibita.

428. DORONICUM Pardalianches. LINN. *Sp. pl.*

1247. *Mat. m. 394. MILL. Figur. t. 128.*

Doronicum maximum, foliis caulem ample-xantibus. CAMER. *Epit. 823.*

Doronicum 7. austriacum. CLUS. *Hist. 2. p. 19.*

Aconitum Pardalianches primum. DOD. *Pempt.*

434.

Pharm. DORONICI Radix.

Locus. Alpes Helvetiæ, Pannoniæ. *Perenne.*

FORMA. rec. *Radix* tuberosa, ovata, vix pollicaris, alba, glabra, rugis annularibus, ciliatis; parenchymate carnosæ, albo, post sectionem transversalem notato disco æquali, annulo concentrico prope peripheriam, e punctis discretis, serie annulari dispositis. *Siccata* dura, fragiliscula.

PROPR. rec. *Odor* debilis, aromaticus, in semen Nigellæ incidens; *sapor* dulcescens, gratius.

VIRTUS.

USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquosum rubieundo-lutescens, odore leniter aromatico, sapore dulcescenti-amaricante, aromatico; cum vitr. martis fuscescit.

OBS. 2. Radices recentes cum voluptate esitabat CONR. GESNERUS (*), inflationem vero præcordiorum inde passus. De vi hujus medica nihil certi statuere possum;

scri-

(*) *Epist. med. fol. 18. 6.*

scripserunt multa veteres medici, sed certa experientia deest. Radicem recentem integrum cum annexis foliis floribusque capi cuidam intrusit W. COURTEN (*), sed nullam noxam insecuratam vidi.

429. *BELLIS arvensis.. LINN.. Sp. pl. 1248. Mat. m. 405. KNIPH. Bot. orig. cent. 1. BLACKW. Herb. t. 200.*

Bellis sylvestris & hortensis. DOD. Pempt. 265.

Bellis hortensis multiplici flore. LOB. Hist. 253. PARM. BELLIDIS MINORIS Flores.

Locus. Europa, in apricis. Colitur in hortis. Perennis.

FORMA. rec. *Flores solitarii, pedunculati, pleni. CAL.* communis polyphyllus: foliolis ovali-linearibus, obtusis, ciliatis, apice barbatis, viridibus, glabris, simplici serie imbricatis, erectis. *COR.* composita, rubro-incarnata, plena: corollis ligulatis, cuneiformibus, retusis, bi-vel tripartitis, basi tubulosis, tubo pubescenti, brevi. *STAM.* nulla. *PIST.* Germ. ovatum, compressum, glabrum. *Styl.* cylindricus, longitudine tubi, albidus. *Stigma* bifidum, acutum, lutescens. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. *Odor nullus; sapor vix ullus.*

VIRTUS.

USUS.

OBS. *Infusum aquosum rubicundum, odore nullo, sapore debili; vitriolo martis fusco-nigrescit.*

430. *CHRYSANTHEMUM Leucanthemum.*

LINN. Sp. pl. 1251. Mat. m. 404.

Grande margarite. BULLIARD Fl. paris. t. 11. Bel-

(*) *Philos. transact. vol. 27. p. 485.*

Bellis major. CAMER. *Epit.* 635. DOD. *Pempt.*
265. BLACKW. *Herb.* t. 42.

Bellis major s. *Consolida media vulneraria-*
rum. LOB. *Hist.* 253.

Pharm. *BELLIDIS PRATENSIS* Herba.

Locus. Europa, in pratis. *Perenne.*

FORMA. rec. *Caulis* erectus, pedalis, sim-
plex, vix ramosus, subpubescens. *Folia* alterna,
subcarnosa, obtusa, subpubescentia, inciso-serra-
ta; inferiora petiolata, obovata; superiora sessi-
lia, amplexicaulia, linearia, extrorsum latiora.
Flos pedunculatus, terminalis, solitarius. *CAL.*
communis hemisphaerico-planus, arcte imbrica-
tus: squamis lanceolatis, obtusiusculis, adpressis,
margine scariosis, violaceis, vix pubescentibus,
carinatis; inferioribus minoribus; intimis majo-
ribus, linearibus, magis scariosis. *COR.* com-
posita radiata. *Discus* luteus, convexus; *radius* al-
bus, patens. *Corollæ disci* hermaphroditæ, tu-
bulosæ, tubo rugoso, pallido, limbo paullo cras-
siore, 5-fido: laciniis ovato-acutis; *radii* fœmi-
næ, lanceolatæ, inferne paullo angustiores, ob-
tusæ, tricrenatæ, nervis parallelis obsoletis in-
structæ, calyce triplo longiores. *STAM.* syng-
enesiæ. *PIST.* utrisque: *Germ.* oblongum, utrin-
que obtusum, striatum, angulatum, glabrum,
coronatum coronula paleacea, tenui, membranacea.
Stylus setaceus. *Stigmata* 2, linearia, trun-
cata, apice minutim ciliata.

PROPR. rec. *Odor* nullus; *sapor* herbaceus;
masticata folia teneriora, saliva viridescente.

VIRTUS.

USUS.

431. MATRICARIA Parthenium. LINN. *Sp. pl.*

1255. *Mat. m.* 400. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5.
Ma-

Matricaria. BLACKW. *Herb. t. 192.* DOD. *Pempt.*
35.

Pbarm. MATRICARIAE Herba, Flores.

Locus. Europa australis, locis ruderatis. *Sub-*
perennis.

FORMA. rec. *Radix* cylindrica, fibris plurimi-
mis aggregatis, longitudinaliter dispositis. *Caulis*
teres, erectus, undique striato-angulatus, glaber,
bipedalis, virgatim ramosus. *Rami* alterni, stri-
ato-angulati, erecti, minutim pubescentes. *Fo-*
lia alterna, ad ramos, petiolata, plana, utrinque
glabra, undique adspersa punctis parvis, exca-
vatis, frequentibus; pinnatifida: pinnis subop-
positis, ovato-oblongis, pinnatifidis, inciso-serr-
ratis. *Petioli* subtriquetri. *Corymbus* terminalis
in ramis, erectus, inferne foliosus, pedunculis
elongatis, sulcato-angulatis, pubescentibus. *Bra-*
cteæ lineares, angustæ, ad basin pedunculorum
& in ipsis pedunculis, solitariae. *CAL.* commu-
nis, hemisphæricus, sulcatus, cinereus, arcte im-
bricatus: squamis parvis linearibus, convexo-
carinatis, margine membranaceis, subciliatis, a-
pice scariosis; adpressis. *COR.* composita, radia-
ta. *Discus* luteus, hemisphæricus, hermaphrodi-
tus. *Radius* albus, deflexus, hermaphroditus.
Propria disci tubulosa, angulata, scabriuscula,
incurvata, calyce paullo longior, ore 5-fido;
radii, ligulata, ovali-orbiculata, apice retusa,
tridentata, supra glabra, carinata, longitudine ca-
lycis, subtus rugosa, tubo breviusculo, utrinque
marginato. *STAM.* *Disci*: *Filam.* 5, capillaria;
Anthera tubulata. *PIST.* utrisque. *Germ.* oblon-
gum, striato-angulatum, glabrum, nudum. *Styl-*
lus filiformis, staminibus paullo longior. *Stigm.*

2, acuta, revoluta. *Semina* oblonga, angulata, nuda. *Receptac.* nudum.

PROPR. totius herbæ: *Odor* fragrans, validus, graviusculus, in Chamomillam & Tanacetum incidens; sed florū odor fortior; *sapor* amaricans, aromaticus, odori congruens, calidiusculus, præcipue florū.

VIRTUS: tonica, stomachica, resolvens, emmenagoga.

USUS. Hysteria.

OBS. 1. *Infusum* aquos. herbæ rec. saturate rubicundum, odore & sapore herbæ; vitriolo martis nigrofuscum. *Aqua still.* fragrans. *Oleum still.* leviter citrinum. Ex herb. Matricariae libr. 56 accepit cl. BAUMÉ olei still. unc. 1 3. *Extractum* aquos. amarum, salinum, vix aromaticum. Extr. aquos ultra dimidium accepit NEUMANN; spirituosi vero tres octonas partes.

OBS. 2. *Variat* floribus suis dupli modo, aut radio excluso, aut disco excluso. Odor plantæ fragrans eximia in praxi medica pollicetur; certe hucusque apud nos neglecta planta.

432. MATRICARIA Chamomilla. LINN. Sp. pl.

1256. Mat. m. 492. KNIPH. Bot. orig. cent. 9.

Anthemis vulgaris. LOB. Icon. 770.

Chamæmelum vulgare. DOD. Pempt. 257.

Pbarm. CHAMOMILLÆ NOSTRATIS Herba, Flores.

Locus. Europa, in agris, cultis. Annua.

FORMA. rec. *Caules* communiter plures ex una radice, erecti, teretes, striati, superne angulati, inferne lăves, superne ramosi, pedales. *Rami* alterni, erecti. *Folia* alterna, subcarnosa, glabra, sessilia, pinnato-multifida: laciniis subulatis, acutis. *Flores* terminales, subpaniculati, pedunculati:

pedunculis striatis, nudis, unifloris. *CAL.* communis hemisphæricus, arcte imbricatus: squamis linear-i-oblongis, obtusis, apice acutis membra-na scariosa. *COR.* composita, radiata; *Discus* hermaphroditus, luteus, conico-hemisphæricus; *Radius* fœmineus, reflexus, albus. *Propria disci:* tubulata, infundibuliformis, tubo crassiore, membranaceo, rugoso, ore 5-fido; *radii* ligulata, linear-i-subcuneiformis, obtusa, retusa, tridentata. *STAM.* syngenesiæ. *PIST.* utrisque. *Germ.* ob-longum, nudum. *Styl.* breviusculus. *Stigm.* 2, revoluta. *Receptac.* nudum.

PROPR. rec. foliorum: *Odor* debilius fra-grans; *sapor* acriusculus, calidiusculus, vix gratus. *Florum*: *Odor* fragrans, gratus, fortior; *sapor* aromaticus, calidiusculus; *sicc.* consimilis.

VIRTUS: discutiens, antiseptica, stomachica.

USUS. Clysmata, Balnea, Pediluvia, Species resolventes.

OBS. I. *Infusum* aquosum lutescenti-rubrum, odo-re fragrante, sapore herbæ; vitriolo martis parum fu-scescit. *Extract.* aquos. dimidium ponderis florum ac-cepit NEUMANN; spirituolum vero ad tres octonas par-tes ponderis florum. *Oleum still.* pulchre cæruleo-sap-phirinum. E florum libr. I olei cærulei drachm. 3 accepit cl. LEWIS, scrup. I NEUMANN, & drachm. I cl. SPIELMANN. Hæsitavi super colore cæruleo, dubitans, annon *vafa* cuprea, sub destillatione usitata, aliquid ad eum conferre possent. Itaque destillavi Summitat. herb. Chamom. rec. libr. 20 cum aqua pura, in vasis vitreis, & accepi scrup. 2 olei still. saturate cærulei, opaci, o-dore fragrante Chamomillæ, sed in oleum Terebinthi-næ insimul leviter incidente, sapore aroniatico chamo-millæ, calido. Hoc oleum, gustatum, salivam cæruleo eo tinxit; chartæ albæ illinitum, eandem cæruleo in-fe-

fecit, qui tamen color temporis tractu sponte obliteratus est, sola quippe ætate pallescit hoc oleum in lagenis vitreis, in quibus servatur. Hinc color cæruleus non ex vasis cupreis proficisciatur, sed huic oleo revera proprius est. Oleum vero Chamomillæ, quod in pharmacopoliis occurrit, subinde oleo Terebinthinæ defraudatum est; quod quidem didici, dum tale oleum in vasis vitreis rectificavi, & purum oleum Terebinthinæ transcendere observavi. Cl. DEMACHY (*) statuit, flores Chamomillæ oleum flavum dare, herbam vero cæruleum; sed repugnat mea experientia.

OBS. 2. Flores chamomillæ frequentissimi sunt usus in balneis, speciebus resolventibus, clysimatibus. Usus internus rarer est; valet tamen identidem in ipsis febribus intermittentibus, si decoctum saturatum propinetur. Pulvis florum cortici Peruviano addi potest, quo quidem efficitur, ut febris, semel curata, adeo facile non repullulet. Oleum still. oppido calidum est, & raro propinatur.

433. ACHILLEA Ptarmica. LINN. Sp. pl. 1266.

Mat. m. 398. KNIPH. Bot. orig. cent. 5.

Ptarmica vulgaris. CLUS. Hist. 2. p. 12. BLACKW.

Herb. t. 276.

Ptarmica folio Taraconis. LOB. Hist. 243.

Draco sylvestris f. Ptarmice. DOD. Pempt. 698.

Pharm. PTARMICÆ Radix, Herba, Flores.

Locus. Europa media, Sibiria, America septentrionalis. Perennis.

FORMA. rec. Radix cylindrica, crassitie pennæ anserinæ, subgeniculata: geniculis sparsis, dimidiatis; alba, horizontalis, repens: fibriculis pluribus a geniculis exeuntibus. Parenchyma album, post sectionem transversalem notatum cen-

(*) Nov. act. phys. med. A. N. C. vol. 4. p. 63.

tro medullari orbiculato, parvo, cincto disco un-
dique striato; corticali parte tenuiore. *Caulis*
pedalis vel ultra, erectus, inferne teres, glaber,
superne subangulatus, villosus, paniculatum ra-
mosus. *Rami* alterni, erecti. *Folia* frequentia,
alterna, sessilia, amplexicaulia, linearia, acuta,
bi-vel triplicaria, utrinque glabra, lucidiuscula,
saturate viridia, margine retrorsum scabra, cre-
nata: crenis minutim ferrulato-aculeolatis; sub-
tus trinervia: nervis longitudinalibus, approxima-
tis, quorum intermedius est costa. *Corymbus*
terminalis, compositus, erectus, villosus, folio-
sus. *Bracteæ* lineares in pedunculis. *CAL.* com-
munis globosus, villosus, undique arcte imbri-
catus: squamis ovato-oblongis, acutis, subcari-
natis, margine membranaceis, apice obtusis, sub-
scariofis, minutim ciliatis. *COR.* composita, al-
ba, plena, corollis ligulatis, foemineis, subrotun-
dis, apice obsolete tricfenatis, obtusis. *Receptac.*
paleaceum; squamis membranaceis, linearilan-
ceolatis, obtusis, longitudine vix florum.

PROPR. rec. radicis: *Odor* nullus; *sapor* nul-
lus; *masticata* tenaciouscula, primum insipida, de-
inde vero acris, in lingua & faucibus mordens;
Foliorum: *odor* & *sapor* herbaceus, leviter ama-
ricans, acris; *masticata* teneriora, acria, mor-
dentia in faucibus, fere ut radix; *saliva* viridi.
Florum: *odor* nullus; *sapor* in *Millefolium* inci-
dens, sed debilior, pariter acris, sed minus quam
folia.

VIRTUS: sialagogæ, sternutatoria.

USUS: Odontalgia.

OBS. In Sibiria decoquunt totam herbam, & pro-
pinant decoctum mihi cruento vel hæmorrhagia u-
teri laborantibus; J. G. GMELIN (*).

434.

(*) *Flor. Sibir.* tom. 2. p. 196.

434. ACHILLEA Millefolium. LINN. *Sp. pl.* 1267.

Mat. m. 397. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5. 7.

Millefolium vulgare album. ZANNICH. *Venez.*

t. 143.

Millefolium purpurei floris. DOD. *Pempt.* 100.

Millefolium. BLACKW. *Herb.* t. 18.

Miliifolium terrestre. MERIAN. *Eruc.* ort. p. 28. *t. 71.*

Pharm. MILLEFOLII Herba.

Locus. Europa, Virginia, in pascuis, agro-rum marginibus. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix* filiformis, descendens, fibrillosa. *Caulis* erectus, pedalis, teretiusculus, striatus, subangulatus, lanuginosus, simplex, superne parce ramosus. *Folia* sessilia, amplexicaulia, linear-lanceolata, alterna, pinnata: pinnulis obovatis, oppositis, bipinnatifidis, acutis, obliquis, supra minutim pubescentibus, subtus lanuginosus; inferiora petiolata: petiolis membranaceis, subvaginatis. *Corymbus* florum terminalis, fastigiatus, lanuginosus. *Bracteæ* lineares, pinnatifidæ vel integræ, pubescentes, parviusculæ, ad ramos corymbi & pedunculos. *CAL.* communis ovatus, pubescens, arcte imbricatus: squamis ovalibus, concavis, pubescentibus, obtusiusculis, superne margine ciliatis. *COR.* composita, radiata. *Discus* 12-florus, longitudine calycis, hermaphroditus, albus. *Radius* 5-florus, albus, fœmineus, laxe imbricatus. *Propria disci:* tubulata, infundibuliformis, tubo sordide lutescente, limbo subdiahphano, campanulato, albido, 5-fido: laciniis ovato-acutis, revolutis; *Radii* ligulata, alba, subrotunda, retusa, tridentata, patens, tubo cylindrico, viridescente, striato, subpubescente, longitudine calycis. *STAM.* syngenesiae, corolla paul-

Io longiora, filamentis albis, anthera lutea.
PIST. utrisque. *Germ.* oblongum; compressiusculum, subtetragonum, album, nudum, glabrum. *Styl.* capillaris, staminibus longior. *Stigm.* 2, linearia, truncata, patentia. *Receptac.* paleaceum: paleis teneris, membranaceis, oblongis, floribus brevioribus.

PROPR. rec. folior. *Odor* debilior, in odorem mucoris incidens; *sapor* consimilis, americans; *Florum*: *odor* foliorum, verum longe gravitor; *sapor* americanus, subcalidiusculus, leniter aromaticus; *sicc.* *sapor* consimilis, leniter acridiusculus.

VIRTUS: tonica, vulneraria.

USUS. Hæmoptysis, Hæmorrhoides, Hysteria.

OBS. *Infusum* aquos. summatum luteum, odore & sapore herbæ; vitr. martis nigrescit. Herbæ Millefolii libr. 17 dant *Extracti* aquosi libr. 1. Ex observatione cl. LEWIS, herba Millefolii, solo pingui legit, oleum dabit *stillatitium* belle cœruleum; quæ vero in solo sterili crescit planta, oleum dabit lutescens; nos autem destillatione accepimus oleum viride, aro-mate millefolii.

435. ANTHEMIS nobilis. LINN. Sp. pl. 1260. Mat.

m. 401.

Chamæmelum odoratum. DOD. Pempt. 259.

Chamæmelum romanum flore multiplici. CAMER. Epit. 646.

Chamæmelum. BLACKW. Herb. t. 298.

Pharm. CHAMOMILLÆ ROMANÆ Flores.

Locus. Europa, in paucis apricis. *Annua.*

FORMA. rec. *Flores* pedunculati, sœpe pleni.

CAL. communis hemisphæricus, minutim lanuginosus, undique sulcatus, imbricatus: squamis li-

linearibus, adpressis; inferioribus acutis, margine scariosis; superioribus paullo majoribus, pariter apice scariosis, obtuso-rotundatis. *COR.* composita, radiata. *Radius* foemineus, albus, calyce duplo longior, corollis ligulatis, linearibus, obtusis, crena duplici emarginatis, patentibus. *Discus* luteus, hermaphroditus, corollis infundibuliformibus, ore crenato. *STAM.* syngenesiae, corolla breviora. *PIST.* utrisque. *Germ.* lineare, nudum. *Styl.* subulatus. *Stigm.* 2, acuta, reflexa. *Receptac.* paleaceum: paleis scariosis, linearibus, concaviusculis, obtusis, floribus brevioribus.

PROPR. rec. & sicc. *Odor* fragrans, fortis, balsamicus, gratus, cephalicus, in *Chenopodium Botrytidem* incidens; *sapor* odori congruens, amaricans, calidiusculus.

VIRTUS: resolvens, antiseptica, stomachica.

USUS. Hysteria, Febres intermittentes.

OBS. Extrahitur menstruo aquoso, sed perfectius spirituoso. *Infusum* aquosum lutescens, odore fragrante, sapore aromatico-amaricante; vitr. martis fusco-nigescit. *Decoctione* odor perit; hinc *Extractum* aquosum amarum, salinum, vix odoratum. *Aqua still.* fragrans. *Oleum still.* lutescenti-subviridescens, fragrans, odore & sapore florum. *Oleum coctum* fragrans. E flor. Chamom. rom. rec. & mundat. libr. 82, vase stanneo, per destillationem accepit cl. BAUMÉ olei still. drachm. 13, colore pulchre æeruleo. Alia vice ex eadem quantitate florum obtinuit olei still. drachm. 18, scil. affusa aqua stillatitia plantæ. Sed cum ramentorum herbæ libr. 80, sepositis omnibus floribus, destillavit, accepit solummodo olei still. drachm. 3, colore citrino.

436. ANTHEMIS *Cotula*. LINN. *Sp. pl.* 1261. *Mat. m. 403.*

Chamæmelum foetidum s. *Cotula foetida*.

BAUH. *Hist.* 3. p. 36.

Cotula alba. DOD. *Pempt.* 258.

Cotula foetida. BLACKW. *Herb.* t. 67.

Pharm. COTULÆ FOETIDÆ Herba, Flores.

Locus. Europa, in agris & ad vias. *Annua*.

FORMA. rec. *Radix* fibrosa. *Caulis* erectus,

sæpe procumbens, pedalis, inferne teres, super-

ne striato-angulatus, glaber, ramosus, diffusus.

Rami alterni, erecti, cauli conformes. *Folia* sub-

carnosa, viridescentia; caulina ad ramos, alter-

na, sessilia, patentia, viridescentia, utrinque pun-

ctata, vix pubescentia, pollicaria vel ultra, du-

plicato-pinnatifida: lacinij linearis-subulatis, acu-

minatis, erectis. *Stipulae* nullæ; verum laciniae

infimæ foliorum amplexicaules. *Pedunculi* elon-

gati, erecti, in ramulis terminales, solitarii, stri-

ati, minutim lanuginosi seu pubescentes, nudi.

CAL. communis hemisphæricus, lanuginosus,

imbriatus: squamis lanceolatis, acutis, mem-

branaceis, carinatis, adpressis; inferioribus mino-

ribus. ***COR.*** composita, radiata. *Discus* luteus,

convexo-conicus. *Radius* albus, patens. *Propria*

disci infundibuliformis; tubus crassiusculus, sca-

bridus; limbus campanulatus, ore 5-fido, revo-

luto-patente. *Radii* ligulata, ovali-oblonga, ob-

tusa, tridentata, alba, fulcis 2 depressis, glabra,

patenti-reflexa; tubo cylindrico, scabrido. ***STAM.***

Syngenesiæ, corolla breviora. ***PIST.*** disci: *Ger-*

men albidum, obverse conicum, pentagonum,

scabridum, nudum. *Stylus* longitudine tubi. *Sti-*

gmata 2, linearia, obtusa, longitudine staminum.

Radii: *Germ.* cylindricum, scabridum; *styl.* &

stigma

stigma defunt. *Semina* disci: obverse conica, angulata, punctis scabra, obtusa, terminata punto elevato; radii nulla; germina effeta. *Recept.* paleaceum: paleis setaceis, floribus brevioribus.

PROPR. rec. *Odor* foetidus; *folia* floribus foetidiora. *Sapor* subamaricans, calidiusculus.

VIRTUS: antihysterica.

USUS.

OBS. *Infusum* aquos. herbæ rec. luteo-rubicundum, odore foetiduscuso; sapore subamaricante; virio lo martis fuscescit. *Oleum* stillat. nullum e florum libris 30 obtinere potuit cl. SPIELMANN.

437. ANTHEMIS Pyrethrum. LINN. *Sp. pl.* 1262.

Mat. m. 396. KNIPH. *Bot. orig. cent.* II.

Pyrethrum. BLACKW. *Herb. t.* 390. DOD. *Pempt.*

344.

Pyrethrum officinarum salivalis. LOB. *Hist.*

447.

Anthemis caulis simplicibus, unifloris, decumbentibus. MILL. *Figur. t.* 38.

Pharm. PYRETHRI VÉRI Radix.

Locus. Barbaria. Perennis.

FORMA. rec. *Radix* descendens, digitalis vel ultra, crassitie pennæ anserinæ, saepe cygneæ, cylindrica, recta, vix flexuosa, extus longitudinaliter rugosa, fusco-cinerea, fibrillis capillaribus, sparsis, apice fetis & petiolis resectis (in siccata) terminata. *Parencyma* album, subcarnosum, post sectionem transversalem notatum centro medullari orbiculato, stellato, radiis obsoletis; *siccata* durum, fragile.

PROPR. *sicc.* *Odor* vix ullus. *Sapor* peculiaris, acidus, acris, inhærens; *masticata* dura, comminuitur, acida primum, dein acris, pun-

gens, lingvæ labiisque inhærens, salivam copio-sam afficiens, postea fauces irritans; *recentis* sa-por mitior.

VIRTUS: fialogoga.

USUS. Odontalgia.

OBS. 1. Extrahitur in aqua, sed perfectius in spiritu vini; quamobrem Extractum spirituosum acrius. *Infusum* aquosum lutescenti-rubicundum, limpidum, sa-pore debili, vix acri, nec acidulo; ergo residet acri-monia in resinoso; vitriolo martis opalescit, præcipi-tatur.

OBS. 2. Hæc radix nondum rite cognita videtur. Fertur, illam olim inter bellaria mensis appositam fuisse, & quidem aceto conditam; certe apud veteres Ro-manos inter cibi condimenta fuit; sed usus culinaris in-ter Europæos hodiernos exolevit. Nonnulli jam illam ad usum medicum internum, ut Aro æmulam, commen-dant. Recens, cuti applicata, agit fere ut Cortex Me-zerei; si per 4 dies applicetur, cutem rubefacit & in-flaminat. Peculiaris profecto radix sapore suo acido & acri. Aràbibus dicta est *Guntuss*, & in magna copia quo-tannis Constantinopolim & Cairum apportatur, ubi, ut narrat SHAW (*), conditur Saccharo, ad mor-bos pectoris & odontalgiam adhibenda.

ORDO

POLYGAMIA FRUSTRANE A.

438. HELIANTHUS tuberosus. LINN. *Sp. pl.*

1277. ZÜCK. *Mat. alim. p. 83.*

Flos solis Farnesianus. COLUMN. *Ecpbr. 2. p.*

ii. t. 13.

Cu-

(*) *Voyage dans plusieurs provinces de la Barbar. tom. 20*
p. 102.

Culinis : HELIANTHI TUBEROSI Radix
recens.

Locus. Virginia. Perennis.

FORMA. rec. *Radix polymorpha*, extus olivea, conflata e *tuberibus* pluribus, subrotundis, glabris, concatenatis, divisorum spectantibus, inæqualibus; adspersis fibris filiformibus, solitariis, elongatis, albido-ferrugineis. *Parencyma* album, carnosum, post sectionem transversalem notatum disco æquali, uniformi.

PROPR. rec. *Odor nullus*; *sapor* vix ullus; *masticata* tenerior, comminuitur, subsucculenta. *Radix* recens, rasa, rubescit & aquam affusam brunneo tingit; sed amyllum non dat. *Tubera* hæc, in aqua cocta, evadunt mollia, tenera, pulposa, dulcescentia, albida, odore fere Pisii cocti.

VIRTUS: nutriendi.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Si in olla ferrea elixantur tubera hæc, tunica exterior obvolvens nigra fit, & parencyma colorēm incarnatum subfuscescēt ducit; in olla vero eu-prea colorēm non mutant. Hoc *decoctum* rufescens est, sapore tuberum; vitriolo martis nigrescit & præcipitatur. Si decorticantur tubera & in juscule carnium coquuntur, maxime albedinem suam retinent.

OBS. 2. In culinis nostris notissima sunt hæc tubera; communiter incoquuntur jusculis carnium, quibus etiam bonum saporem conciliant, atque sapida fiunt ipsa, quamobrem etiam frequenter eduntur, sed sæpe flatus generant.

439. *CENTAUREA Cyanus.* LINN. *Sp. pl.* 1289.

Mat. m. 408. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 6.

Bluet. BULLIARD *Fl. paris.* t. 4.

Cyanus vulgaris. LOBEL. *Icon.* 546.

Cy-

Cyanus flos. DODON. Pempt.. 250.

Pharm. CYANI Flores.

Locus. Europa, inter segetes. Annua.

FORMA. rec. Flores in ramis terminales, foliarii, pedunculati, erecti. CAL. communis ovatus, cinereus, tomentosus, undique imbricatus: squamis adpressis: inferioribus minoribus, ovatis, acutis, margine undique ferratis: ferraturis membranaceis, albidis, acutis, apice fuscis; superioribus sensim longioribus, apice duntaxat ferratis, obtusis; supremis linearibus, pariter obtusis, minutim ferratis. COR. composita, radiata, pulcherrime dilute cærulea. Discus hermaphroditus, calyce duplo longior. Radius sterilis. Propria disci: tubulata, tubo cylindrico, albo, longitudine calycis; limbo cernuo, cæruleo, 5-angulari: angulis 3 gibbosis; 5-fidus: laciniis linearibus, angustis, obtusiusculis, tubo longioribus, erectis; Radii infundibuliformis, tubo filiformi, calyce longiore, inferne albo, superne cæruleo; limbo ex tubo sensim ampliato, cæruleo, inæquali, circiter 8-fido: laciniis 5 exterioribus altioribus, lanceolatis, acutis, patentibus; 3 interioribus longe minoribus, profundius divisis, superne ferratis. STAM. Filam. 5, alba, tubo paullo longiora, apice barbata. Antera tubulata, cylindrica, saturate cærulea, corolla paullo longior. PIST. hermafbr. Germen obovatum, album, minutim pubescens, compressiusculum, coronatum Pappo simplici, sessili, albo, germine paullo longiore. Stylus filiformis, albus, longitudine fere staminum, superne cæruleoscens. Stigm. 2, cærulea; erecta. Fæmineis: Germen obsoletum. Recept. setosum: setis paleaceis, angustissimis, albis.

PRO-

PROPR. rec. *Odor* remissior, parum gratus; *japor* vix amaricans; *masticati* salivam violaceo colore tingunt. Flores recentes in papyro fricati, maculam relinquunt dilute cæruleam.

*VIRTUS.**USUS.*

OBS. Flores Cyani recentes, in aquam calidam immisi, *infusum* fistunt dilute violaceum, pulchrum. Hoe infusum cum Spiritu vitrioli sangvineum fit; cum succo citri sangvineo-purpurascens; cum solut. aluminum obscurum violaceum, dein perbelle cæruleum; cum oleo tart. p. d. dilute citrino-viridescens; cum vitr. martis fulco-nigrum. Sub infusione petala pallescunt, & fere decolorantur. Si flores siccati infunduntur, infusum fit ferrugineo-rubicundum, subinsipidum, cum reagentibus paria cum priore phænomena monstrans. Si flores recentes cum saccharo teruntur, illud pulchrum eorum colorem perhibit, quo ipso postmodum pharmacoceis ad tincturas colorandas idoneum fit.

440. *CENTAUREA benedicta*. LINN. *Sp. pl.* 1296.

Mat. m. 379. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 1.

Carduus benedictus. CAMER. *Epit.* 562. DOD.

Pempt. 725. BLACKW. *Herb.* t. 476. LUDW.

Ectyp. p. 3. t. 6.

Pharm. CARDUI BENEDICTI Herba.

Locus. Virginia, Oriens, Europa australis. *Co-*
litur apud nos. Annua.

FORMA. rec. *Radix* cylindrica, ramosa, alba, fibrillosa. *Caulis* subbipedalis, erectus, tenuiusculus, sulcato-angulatus, hispidus, superne ramulosus. *Rami* sparsi, sulcato-angulati, erecti, superne brevius ramulosi. *Folia* spithamea, obtusa, rugosa, hispidulo-scabra, subtus reticulatim venosa, runcinata: lobis oppositis, oblongis, ob-

tu-

tusis cum mucrone, margine ciliatis, denticula-to-aculeatis; inferiora petiolata; superiora sessilia, erecta. *Flores* 2 vel 3, in ramis terminales, pedunculati. *Pedunculi* teretes, hispido-lanati, foliosi, uniflori. *Involucr.* flori subiectum: foliis 10, inæqualibus, erectis; quorum 5 exteriora majora, sessilia, lanceolata, dentata, margine undique denticulato aculeata; inferiora 5 minora, vix dentata, ciliato-aculeata. *CAL.* communis ovatus, magnitudine fructus Cerasi majoris, glaber, arcte imbricatus: squamis adpressis, lœvibus, acutis, terminatis spina elongata, divaricato-erecta, undique lanam exferente instar telæ araneæ; inferioribus ovatis, spina simplici; superioribus lanceolatis, spina pinnatifida instructis. *COR.* composita, æqualis, tubulosa, hermaphrodita. *Propria* infundibuliformis, tubo longissimo, albo, cylindrico, calyce fere longiore; limbo luteo, subcylindrico, breviuscule, pentagono, bilabiato: labio superiore 4-fido: laciniis lanceolatis, obtusiusculis, subæqualibus, erectis; inferiore lanceolato, acutiusculo, subpatente. *STAM.* *Fil.* 5, subulata, alba, pubescentia; basi limbi inserta. *Anth.* cylindrica, tubulata, brunnea, striata, ore 5-fido, corolla paullo longior. *PIST.* *Germ.* obovatum, album, striatum, coronatum *Pappo* piloso, simplici, sessili, tubo breviore. *Styl.* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* luteum, subexsertum, bipartitum: laciniis ovatis, obtusis, planis. *Recept.* setosum: setis albis, pappo conformibus. *Obs.* Radius fœmineus nullus adfuit in plusquam 20, quos examinavi, floribus.

PROPR. rec., *Odor* nullus; *sapor* corollarum
rec.

rec. nullus, sed foliorum intense amarus, non nauseosus, inhærens.

VIRTUS: antacida, corroborans, stomachica, sudorifera, diuretica, eccoprotica.

USUS. Anorexia, Cachexia, Cephalalgia sympathica, Arthritis, Febres intermittentes.

OBS. 1. *Infusum aquosum* potus Theæ instar lutescens, odore debili, sapore peramaro; cum vitr. martis fuscescit. *Infusum*, frigidiusculæ paratum, præstabilius est infusione fervida vel decocto; prius enim gratius & purius amarum, ventriculo amicum, dum posterius nauseosum, saepe subemeticum est; tamen hoc magis sudoriferum. *Videtur Carduus benedictus agere ut amarum absque excandescientia omni. Infusum vinorum adhuc gratius.* *Extracti aquosi* tres quartas partes e foliis accepit NEUMANN; *Spirituosi vero unam septimam partem.*

OBS. 2. Rheumatismis & arthritidi bonum est infusum, e Card. bened. unc. 1 & vini Rhenani libr. 2 paratum, cuius cochl. 1 vel 2 sumenda tempore matutino in lecto; agit communiter calore per totum corpus, fugaci tamen, sublequentे sudore tranquillo.

OBS. 3. De Carduo benedicto habemus G. C. PETRI (*) tractatum. Statuit, Cardui benedicti vim pneumaticam & antipleuriticam ex signatura externa innotescere. Porro laudat Carduum bened. in pleuride, aliisque viscerum internorum inflammationibus. Pulveri foliorum longius præfert sal cardui benedicti ad profligandas febres intermittentes & malignas. Lumbricos latos usū Cardui bened. propulsos tradit. Liber compilatus, proprias observationes Auctoris nullas continens. In plurimis morbis Carduum benedictum commendat auctor,

im-

(*) *Asylum languentium, s. Carduus sanctus, vulgo henedictus, medicina Patrumfamilias polychresta, verusque pauperum thesaurus.* Jenæ 1669.

imprimis in morbis ventris, in peste & contra venenum. Ceterum plurimas formulas e Carduo benedicto corradit. In culinis laudat folia teneriora Cardui benedicti, minutum concisa & placentis frixis immixta, quæ vix amara futura sunt, sed palato amica.

ORDO POLYGAMIA NECESSARIA.

441. CALENDULA officinalis. LINN. *Sp. pl.* 1304.

*Mat. m. 407. KNIPH. Bot. orig. cent. 6. n.
Souci. BULLIARD Fl. paris. t. 18.*

*Calendula. DODON. Pempt. 254. BLACKW. Herb.
t. 106.*

Pharm. CALENDULÆ Herba, Flores.

Locus. Europa australis, in arvis. Annua. Conseritur in hortis.

FORMA. rec. *Radix* fusiformi-cylindrica, alba, descendens, undique fibrillosa. *Caulis* sub-succulentus, striato-angulatus, pubescens, pedalis, ramosus, diffusus. *Rami* alterni, simplices, cauli conformes. *Folia* subcarnosa, alterna, spatulata, obtusa cum tuberculo, inferne longius linearia, sessilia, integerrima, utrinque glabra, margine minutim ciliata, tuberculis remotis notata, palmaria vel ultra; superiora linearia. *Flores* solitarii, pedunculati, nudi, erecti. *CALYX* communis polyphyllus, pubescens, simplici serie imbricatus: squamis linearibus, acutis, apice fuscis, erectis, extus convexis, intus concavis, subæqualibus, laxiusculis. *COR.* composita fulva, radiata. *Discus* hermaphroditus, longitudine calycis; *radius* foemineus, patens, (in culta) 20-florus, imbricatus; *Propria* disci: infundibuliformis, tubo bre-

brevi, pubescente, limbo turbinato, glabro, 5-fido: laciniis ovato-acutis, margine undique incrassato, erectis; *radii*: ligulata, obverse lanceolata, plana, stricta; calyce duplo longior, basi tubulata, pubescens, apice obtuso, tricrenato. *STAMINA* syngenesiae, lutea, corollæ circiter longitudine. *PIST.* disci: *Germen cylindricum*. *Stylus cylindricus*, corolla paullo longior. *Stigma simplex*, capitatum, luteum. *Radii*: *Germen subcylindricum*, incurvum, villosum. *Stylus cylindricus*, longitudine tubuli radii. *Stigm. 2*, linearia, acuta, revoluta. *Receptac. nudum*.

PROPR. rec. Folior. Odor debilis, fugax; *masticata* tenera, succulenta, sapore acidulo, dein leniter amaricante, saliva rubro-lutea; *florum*: odor svaviter subnarcoticus; sapor leniter acidulus, saliva lutescente; *sicc.* odor vix ullus, nec sapor.

VIRTUS: temperans.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum florum lutescens velut potus Theæ, odore debili, grato; sapore debili, congruente; vitriolo martis fuscescit.

ORDO

MONOGAMIA.

442. *VIOLA* odorata. LINN. *Sp. pl.* 1324. *Mat. m.*

410. OED. *Icon. t. 309.* KNIPH. *Bot. orig. cent. 3.* RENEALM. *Spec. 141. t. 140.*

Viola nigra f. *purpurea*. DOD. *Pempt. 156.*

Viola martia. BLACKW. *Herb. t. 55.*

Pbarm. *VIOLÆ* Herba, Flores, Semina.

Y y

Lo-

Locus. Europa, in nemoribus umbrosis. Pennis.

FORMA. rec. Radix filiformis, spithamea, repens, horizontalis, pallide lutescens, glabra, fibris albidis, filiformibus, fibrillosis, descendenteribus, elongatis. Folia omnia radicalia, petiolata, patentia, cordata, obtusa, margine crenata, minutim ciliata, supra glabra, nervis & venis arcuatis lineata, subtus nervis pubescentia, pollicaria vel ultra. Petioli erecti, pubescentes, subtus convexi, supra plano-canaliculati, foliis longiores. Stipulae 2, radicales, membranaceæ, lanceolatæ, acutæ, ferrato-ciliatæ. Caulis nullus. Stolones palmatae, procumbentes, teretes, pallide viridescentes, foliosi. Pedunculi radicales, filiformes, pubescentes, purpurascentes, hinc convexi, inde sulcati, foliis breviores, uniflori. Bracteæ 2, lineares, oppositæ in medio pedunculi. Flores nutantes. CAL. Perianth. 5-phylum: foliolis adnatis, ovali-linearibus, obtusis, glabris, sed atomis elevatis adspersis, viridi-fuscescensibus, erectis, 2 utrinque lateralibus, imbricatis; uno superiore. COR. violacea, 5-petala, calyce duplo longior, irregularis, petalis obovatis, obtuso-rotundatis, subæqualibus, basi unguiculatis, albicotubis, subbarbatis; quarum 2 superiora reflexa, sursum spectantia; lateralia 2 opposita, patentia; infimo deorsum spectante, versus basin striis fuscis, subparallelis picto, & callis 2 linearibus, concavitatem incidentibus, instructo, pone cornuto: cornu conico, obtuso, incurvato, intra folia calycina prominente. STAM. Filam. vix ulla. Antheræ 5, pallidæ, conniventem, subtetragonæ, in medio sulcatæ, latere utrinque hiantes, apice auctæ squama ovato-oblonga, ob-

tu-

tusa, lutescente, erecta; harum antheratum duas basi excurrunt in appendices 2 subulatas, incurvas, compressas, cornu intrusas. *PIST.* *Germ.* superum, conicum, subangulatum, pubescens. *Stylus* obverse subulatus, glaber, apice hamatus. *Stigma* laterale, subulatum, obtusum, terminatum seta pubescente, molli. *Capsula* ovata, obtusa, dilute purpurascens, undique adspersa atomis, pubescens, sexangularis: angulis 3 alternis incrassatis, rotundatis, 3 alternis parvis; unilocularis, trivalvis. *Sentina* plurimia, obovata, obtusa, glabra, trifariam longitudinaliter disposita, pedunculata.

PROPR. rec. folior. Odor vix ullus; sapor herbaceus; masticata mucilaginosa. *Flor.* odor suaveolens, Iridis florentinæ; sapor debilis, violaceus; masticati teneri, saliva violacea. *Sicc.* inodori.

VIRTUS: herbae rec. leniter purgans, subemetica, emolliens. *Florum* rec. subanodyna, pectoralis. *Sem.* diuretica.

USUS.

OBS. *Syrupus*, e petalis florum recentibus subsiccatis paratus, gratissimus est odore, sapore, colore. Raro genuinus in officinis deprehenditur, sed ut plurimum supposititius, e floribus Aquilegiæ paratus, imposito odore e radice Iridis florentinæ. Propinatur *Syrupus* Violarum, ut lenissimum gratissimumque laxans & anodynūm, infantibus neonatis. In explorandis aquis mineralibus *Syrupus* hic adhiberi solet; & vero ab acidis rubescit, ab alcalinis viridecit; ceterum viridecit etiam a ferro, in aëre fixo soluto, unde a viridescentia aquæ ejusdam mineralis ex syr. Violar. ad existentiam martis, ab aëre fixo soluti, recte conclusit.

443. VIOLA tricolor. LINN. *Sp. pl.* 1326. OED.
Icon. t. 623. DOD. *Pemptad.* 158. BLACKW.
Herb. t. 44.

Pensée. BULL. *Fl. paris.* t. 20.

Jacea altera. CAMER. *Epit.* 913.

Viola flammea coloria. LOB. *Hist.* 335.

Pharm. *VIOLÆ TRICOLORIS* Herba.

Locus. Europa, in apricis. *Annua.*

FORMA. rec. *Radix* filiformis, albida, descendens, glabra, apice ramoso-fibrosa. *Caules* plures ex una radice, procumbentes, simplices, trigoni, scabri, digitales, obscure virides. *Folia* alterna, longius petiolata, ovata, obtusa, inciso-crenata, scabriuscula, unguicularia. *Petiolæ* subtriquetri, superne bicanaliculati. *Stipulæ* 2, oppositæ, oblongæ, pinnatifidæ: laciñiis linearibus, obtusis, minutim ciliatis, latere exteriori amplexicauli, profundius pinnatifido; intermedia cuneiformi, crenata. *Pedunculi* filiformes, triquetri, scabridi, nudi, uniflori, foliis duplo longiores. *Bracteæ* 2, minutæ, suboppositæ, ovato-acutæ, basi hastatæ, concaviusculæ, membranaceæ, colore ferreo. *Flores* cernui. *CAL.* *Perianth.* 5-phylum: foliolis linear-lanceolatis, acutis, minutim scabris, erecto-patentibus, inferne duplicatura adnata, apophysin efficiente truncato-erosam, compressam. *COR.* 5-petala, irregularis: petalis obovatis, reflexo-patentibus; 2 superioribus violaceis, ungvibus reflexis; 2 intermediis oppositis paullo minoribus, violaceo-albidis, striis 3 cœruleis, basi ad apicem ungvis callo barbato; infimo majore, latiore, spathulato, retuso, albo, basi concaviusculo, luteo, striis 5 vel 7 nigricantibus picto, subtus cornuto: cornu pùrpureo, cylindrico, incurvato-recto, obtuso.

STAM.

STAM. Filam. 5, libera; quorum 3 brevissima, 2 vero longa, cornu nectarii intrusa. *Anthera* sessilis, hemisphærica, striata, albida, ore 5-dentato. *PIST.* Germen superum, ovatum, minutim scabridum, angulatum. *Stylus* brevis, basi flexuoso. *Stigma* maximum, capitatum, cavum, antece perforatum: antro orbiculato, sub quo cristæ 3 parvæ, situ triangulari. *Obs.* Variat color floris pro diversa ratione soli.

PROPR. rec. Radicis: *Odor* gratus, Spirææ Filipendulæ radicis, in flores Naphæ incidens; *sapor* consimilis, gratus; *Herbæ: odor* radicis, sed debilior; *sapor* glutinosus; *masticata* lubrica sentitur, halitu grato.

VIRTUS: rec. subemetica, purgans.

USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquos. herbæ recent. odore est fragrante, sapore acriusculo, mucilaginoso; vitr. martis fuscescit. *Infusum* paratum ex unc. 1 ½ herbæ recent. in mortario contusæ, deinde in aquæ bullientis unciis 12 infusæ per horam, mucilaginosum fuit, tenax instar mucilaginis seminis Lini, digitis exceptum in fila ductile, odore nauseoso, sapore glutinoso, nauseoso, colore sordide rubicundo, subopaco, & cum alcohole Vini in mucum reducibile. *Infusum* ex herbæ Violæ recenter sicc. unc. 1, cum aquæ bull. unc. 12 paratum, viridi-lutescens fuit, odore in aquam Naphæ incidente, simul subnauseoso; sapore amaricante, satis grato. *Maceratione* s. infusione protracta, odor gratus perit.

OBS. 2. In officinis nondum recepta est *Viola tricolor*, quæ tamen satis præstans & gratum est laxans, do si unc. 4 ex infuso, quavis altera hora, quamdiu recens haberi potest, nimirum a primo vere in serum usque autumnum. Apud nonnullos agit etiam emesi. Herba, recenter siccata, vim suam purgantem servat,

Sed ejus augenda erit dosis. Certe practicis sollicitioribus adeo non, uti reor, spernendum veniet hocce simplex, ut potius in quæstu sit habendum, utope satis opportunum, ubi laxante quodam mucilaginoso, quam aliis purgantibus, uti maluerint.

444. VIOLA Ipecacuanha. LINN. Mant. 2. p. 484.

Viola grandiflora, veronicæ folio villoso, BAR-

RER. *Æquinoct.* 113. *

Ipecacuanha blanca, Pis. *Brafil.* 101.

Pharm. IPECACUANHÆ ALBÆ Radix.

Locus. America meridionalis, Cayenne, in prati-
cis. *Perennis.*

FORMA. sicc. *Radix* cylindrica, versus apice-
mem sensim attenuata, flexuosa, digitalis, extus
rugosa, albido-cinerea, sulcis transversalibus, se-
micircularibus, frequentibus; *parenchymate* duro,
fragili, albo, fibra lignea, centrali, longitudinali,
lutescente; post sectionem transversalem notato
centro medullari ligneo, lutescente, orbiculato,
striis radiatis stellato.

PROPR. sicc. *Odor* aromatico-nauseosus, de-
bilis; *sapor* subaromaticus, subnauseosus, acriu-
sculus, non ingratus, inhærens. *Masticata* cortica-
lis pars emollitur, lignea pars tenax sentitur.

VIRTUS: emetica, debilior.

USUS.

OBS. 1. Ipecacuanha alba in nostris officinis non o-
ccurrit. Agit debilius quam vulgaris Ipecacuanha, qua
apud nos officinalis est. Si fides cl. BARRERE, e Violæ
genere est, quod etiam ulterius adstruit cl. ALLAMAND.

OBS. 2. De *Viola Ipecacuanha* differuit cl. DAN.
WICKMAN, Præside ill. v. LINNÉ, Ups. 1774.

CLAS-

CLASSIS XX.
GYNANDRIA.
ORDO
DIANDRIA.

445. ORCHIS Morio. LINN. *Sp. pl.* 1333. *Mat.*

m. 412. OED. Icon. t. 253.

Orchis morio femina. VAILL. *Parisin.* t. 31.

f. 13. 14. SEGUIER Veron. t. 15. f. 7.

Cynosorchis morio. LOBEL. *Hist.* 87.

Pharm. SALEP Radix.

Locus. Europa australis, in sylvis. Perennis.

FORMA. rec. Bulbus ovatus, magnitudine
nuclei Persici, saepe etiam Amygdalæ, undique
albus; parenchymate albo, minutim spongioso; sic-
cat. extus cinereus, minutim rugosus; parenchy-
mate faciei corneaæ.

PROPR. rec. Odor hircinus; sapor vix nullus;
bulbus masticatus tener, mucilaginosus, fere in-
sipidus, inter dentes crepusculus, solvit usque-
quaque, saliva mucilaginosa.

VIRTUS: nutriens, obtundens, inviscans.

USUS. Dysenteria, Ulcus vesicæ, Excoriatio-
intestinorum.

OBS. Quæ ex Oriente apportatur, radix Salep, major
est nostra. Orientalis pollicaris vel ultra, ovata, sae-
pe cordata, saepe ovato-oblonga, acutiuscula, undique
lævis, saepe foveolis impressis, subdiaphana, dura, a-
pice cicatrisata, parenchymate uniformi, viridescente,
duro, subcorneo, sub masticatione in ore solubili, sed

sub pulveratione in pulverem album abeunte. Perinde fuerit, a quanam specie Orchidis radix Salep desumatur, modo a pellicula obvelante, radiculisque annexis, probe purgetur. Tempus radicibus colligendis aptissimum est, dum semina plantæ maturuerunt, scapisque marcescere occipit, ut cl. J. MOULT (*) docuit. Radices tunc effodiendæ, annotinæ omnes sedulo separandæ, utpote effæta; colligendæ vero vigentes, solidæ, fragiles, in aqua subsidentes. Hæ in aquam frigidam immittantur, rigidoque peniculo radantur, quo cuticula auferatur, vel, si mavis, in aquam calidam injiciantur, ut deterzione cum latoe cuticula facilius detrahi possit. Hoc facto, radices in furno tepetætæ collectæ, quoad exaruerint, & faciem corneam induerint.

OBS. 2. In aqua calida radix integra digesta, in superficie undique gelatinescit, lubrica fit, tandem emolitur, sed non deliquescit in mucilaginem. Integra radix nunquam in mucilaginem verti potest, quamvis ebullitioni submittatur. Ut gelatina fiat, requiritur, ut bene antea pulveretur radix, ut pulvis hic in aquam tepidam immittatur, moxque ebulliat, ac demum ut strenue agitetur cum virgula; sic obtinetur gelatina perfecta, opalescens, mollissima, æqualis, insipida, inodora, & bene glutinans, quæ a vitr. martis nil demutatur. Si non agitur, gelatina non fit, sed subsidit pulvis, qui manet in fundo, tumescit, subgelatinescit, at cum aqua non miscetur, etiamsi coquatur. Fulvis Salep, in aqua frigida digestus, subsidit, intumescit, & tandem subgelatinescit. Pulveris Salep drachma i aquæ calid. uncias 8 in gelatinam vertit. Fit etiam gelatina cum aceto vini; sed in spiritu vini & oleis expressis non solvitur Salep.

OBS. 3. Sicuti alia mucilaginosa aquam cum oleis ex-

(*) *Philos. transact. vol. 59. p. 2.*

expressis commiscent in emulsionem, ita etiam gelatina fortior e Salep. Ceterum bene gelatina hæcce nutrit, ad quod a vi ejus glutinante concludi potest, atque sic duplici respectu ægrotis convenit.

446. ORCHIS bifolia. LINN. *Sp. pl.* 1331. *Mat. m.*

411. OED. Icon. t. 235.

Testiculi species 5. CAMER. *Epit.* 625.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo.

VAILL. *Paris.* 151. t. 30. f. 7. SEGUIER *Ver-*
ron. t. 15. f. 10.

Pharm. SATYRII Radix.

Locus. Europa, in pascuis humidiusculis. *Per-*
ennis.

FORMA. rec. *Bulbus* solitarius, carnosus, o-
vato-fusiformis, albus, glaber, magnitudine nu-
cis avellanæ, desinens in fibram filiformem, bi-
pollicarem, nudam, descendantem, apice coro-
natam fibris filiformibus, patentibus, longitudi-
ne bulbi. *Parencyma* albūm, glaciem ferme re-
ferens; post sectionem transversalem æquale,
centro fissum, obvelatum tunica membranacea,
incarnata, undique libera.

PROPRIETAS &

VIRTUS &

USUS, ut in præcedenti.

OBS. I. In nostris officinis Satyrii radix indiscretè
desumitur ab omnibus Orchidibus, sponte heic nascen-
tibus; communissime tamen ab Orchide bifolia, sam-
bucina & maculata. Quandoquidem binorum, quos
gerunt, bulborum alter semper vivus est & carnosus,
alter vero emortuus, spongiosus & effætus, utpote ab an-
no præcedente reliquo, interest omnino, ut bene ab
invicem disjungantur bulbi, & inutiles isti rejiciantur.
Orchis maculata sæpe tres bulbos gerit, nempe annoti-

num, vigentem, & tenellum in spem futuri anni; qui bini posteriores colligi possunt.

OBS. 2. De præstantia radicis Satyrii nostratis in medicina, & de ejus vi medica, virtuti veræ radicis Sapèp orientalis congruente, pulchre differuit cl. G. LUND (*); & vero methodum parandi docuit cl. A. J. RETZIUS (**).

447. EPIDENDRUM Vanilla. LINN. Sp. pl. 1347.

Mat. m. 418.

Vanillas piperis arbori jamaicensis innascens.

PLUK. Phytogr. 381. t. 320. f. 4.

Vanille. MERIAN. Surin. 25. t. 25.

Volubilis filiquosa, plantaginis folio. CATESB.

Carolin. 3. p. 7. t. 7.

Pharm. VANILLÆ Siliqua.

Locus. America. Frutex parasiticus.

FORMA. sicc. Siliqua dodrantalis, crassitie penæ cygneæ, recta, cylindrica, compressiuscula, fuscobrunnea, longitudinaliter undique rugosa (sc. a siccatione), lucidiuscula, flexilis, unilocularis, apice cernuo obtuso-truncata, basi sensim paullulum angustata, incurvata; parenchymate carnoso-coriaceo, pinguisculo, centro longitudinaliter cavo, repleto pasta molli, pingvi, nigra, e seminibus condensatis constante. Semina tantum non innumera, minutissima, subrotunda, nigra, splendentia.

PROPR. Odor perquam fragrans, inhærens, exakte Balsami peruviani. Sapor aromaticus, validus, subdulcescens, ab odore non abludens, calidiusculus, balsamicus, gratus; masticata siliqua co-

(*) K. Vetensk. Acad. handl. vol. 32. p. 310. seq.

(**) L. c. vol. 25. p. 243.

coriaceo mollis, tenaciuscula, emollitur, tardius comminuitur.

VIRTUS: calefaciens, emmenagogia, aphrodisiaca, diuretica.

USUS: præparatio Chocolatæ.

OBS. Siliqua adeo pinguis, ut concisa, & chartæ albæ impressa, maculam oleosam relinquat. Tota camera repleta fuit odore fragrante ex concisis siliquis. Hic odor adeo pertinaciter inhæsit digitis, quibus siliquas concisas contrebataveram, ut in tertium diem permanserit, utut eos saepius elavi aqua frigida, sapone, spiritu vini gallico atque oleo tartari p. d., cuius postremi ope paullulum quidem odor evanuit, sed tamen re-cruduit. Siliqua, sub mane degustata, siccitatatem faucibus induxit cum strictura ventriculi, qui status usque in prandium duravit. *Aqua still*, fragrans. Extrahitur menstruo spirituoso, sed tintura parcus odorata fit. *Infusum* aquos. luteum, fragrans, odore & sapore siliquæ ex adjecto vitr. martis color non alteratur.

448. ARISTOLOCHIA trilobata. LINN. *Sp. pl.*

1361. JACQU. *Obs. 1. p. 8. t. 3. K. Vet. Acad. Handl. vol. 25. p. 240.* *

Aristolochia folio hederaceo trifido, maximo flore, radice repente. BARRER. *Æquin.*

16. *

Pharm. *ARISTOLOCHIÆ TRILOBATÆ*
Stipites.

Locus. America meridionalis. *Frutex.*

FORMA. sicc. Stipites nudi, crassitie culmi fecalini, fusco-olivacei, elongati, angulati, undique striati, fragiles; parenchymate albido-cinerascente, post sectionem transversalem notato disco minutim punctato, stellato: radiis pallidioribus, solidiusculis, apice ita conniventibus, ut areo-

areolam ovalem, apice obtusam, singuli bini radii includant.

PROPR. *Odor* fragrans, fortis, fere corticis Padi; *sapor* leniter amaricans, aromaticus, *odori* congruens; *masticati* difficulter comminuantur, tenaces inter dentes, sapore inhærente, cum sensatione amaritiei.

VIRTUS: alexiteria, sudorifera.

USUS. Morsus serpentum.

OBS. 1. Præstabile hoc pharmacon in officinis nostris adhuc non est receptum. Diutissime servant histipites odorem & vires. Eorum mihi etiamnum nonnulli ad manus sunt, quos ultra 5 lustra loculo quodam inclusos habui, & qui, dum nunc franguntur & conſinduntur, haud minus fortem odorem saporemque præſe gerunt, quam cum illos primum e Surinamo accepissem, quippe quod tota catnera illorum odore repletur. Ubi in febribus opus est sudoriferis cum excitantibus, hisce præstantius quidquam vix invenies. Puerum olim, morsu viperæ læsum, hisce stipitibus brevi juvi.

OBS. 2. *Infusum* aquosum lutescens, fragrans; ex vitriolo martis color nil variat.

449. ARISTOLOCHIA Serpentaria. LINN. Sp. pl. 1363. Mat. m. 416.

Aristolochia Pistolochia f. Serpentaria virginiana, caule nodoso. PLUK. Almag. 50. t. 140. f. 5. CATESB. Carol. 1. p. 29. t. 29.

Pharm. SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ Radix.

Locus. Virginia, Carolina. *Perennis.*

FORMA. sicc. *Radix* fibrosa, descendens, bipinnatis, vix palmaris, ferruginea: fibris plurimis filiformibus, fragilibus, flexuosis, subæqualli-

libus, descendantibus, fibrillosis: fibrillis crispis. *Parencyma* album, solidiusculum; post sectionem transversalem notatum disco æquali, puncto centrali ferrugineo.

PROPR. Odor fragrans, fortis, balsamicus, fere ut tæda ligni Pini. Sapor aromatico-balsamicus, odori congruens, calidiusculus, inhærens.

VIRTUS: alexiteria, diaphoretica, antiputredinosa.

USUS. Febres lentæ nervosæ, intermittentes.

OBS. 1. Extrahitur menstruo aquoso & spirituoso. Destillatione dat aquam stillat. fragrantem, &, ut cl. LEWIS observat, pariter oleum essent. fragrans. *Extractum* aquosum non fragrans, disperit enim aroma sub inspissatione. *Infusum* aquosum limpidum, odore fragrante & sapore calido; ex vitr. martis nil variat. Inter pulverandum surgunt pulvifculi, qui nares perquam offendunt.

OBS. 2. De eximio usu Radicis Serpentariae, in connubio cum Chinchina, ad curandas febres intermittentes, pulchras observationes affert cl. DAN. LYSONS (*). Parare is solet pulveres e Cort. Chinchinæ scr. 2 & Rad. Serpent. scr. 1, quos quavis tertia vel quarta hora, sub apyrexia, propinat. Effectum horum pulverum ut mirabilem prædicat, & 15 easibus clinicis utilitatem illustrat.

OBS. 3. De hac radice egit C. L. GÖCKELIUS (**), qui propriis observationibus nihil superstruxit, merus compilator.

450.

(*) *Practical essays upon intermitting fevers &c.* p. 13. seq.

(**) *Dissert. de Serpentaria virginiana*, quæ exstat recusa in VALENTINI *Simplic.* p. 579.

450. ARISTOLOCHIA rotunda. LINN. *Sp. pl.* 1364. *Mat. m.* 414. CLUS. *Hist.* 2. p. 70. DOD. *Pempt.* 322. LOB. *Hist.* 332. BLACKW. *Herb.* t. 256.

Aristolochia. CAMER. *Epit.* 419.

Pharm. ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ Radix.

Locus. Europa australis, in pratis. *Perennis.*
FORMA. sicc. Radix subrotunda, nodulosa : nodis obtuso-rotundatis, pollicaris vel ultra, extus ferrugineo-cinerea, subrugosa ; parenchymate duro, albido-citrino, post sectionem transversalem centro medullari ampio.

PROPR. Odor gravis; sapor amarus, subaromaticus.

VIRTUS: diuretica, emmenagogue, vulneraria.

USUS. Cachexia, Fistula, Hypersarcosis, Ca-
coethes.

OBS. Infusum aquosum lutescens, amarum ; cum
vitr. martis color sibi constat.

451. ARISTOLOCHIA longa. LINN. *Sp. pl.* 1364.

CLUS. *Hist.* 2. p. 70. DOD. *Pempt.* 322. MILL.

Fig. t. 51. f. 2. BLACKW. *Herb.* t. 257.

Pharm. ARISTOLOCHIÆ LONGÆ Radix.

Locus. Europa australis. *Perennis.*

FORMA. sicc. Radix cylindrica, obtusa, crassitie pollicis, spithamea, extus longitudinaliter sulcato-rugosa, cinerea, dura, fragiliuscula ; parenchymate æquali, post sectionem transversalem fusco, undulato.

PROPR. Odor subnauseosus; sapor amaricans, odori congruens.

VIRTUS: eadem quæ præcedentis.

USUS: præcedentis,

OBS.

OBS. *Infusum* aquosum lutescenti-rubicundum, odore & sapore radicis; vitriolo martis non demutatum.

452. ARISTOLOCHIA Clematitidis. LINN. *Sp. pl.* 1364. *Mat. m.* 415. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 1. BLACKW. *Herb.* t. 255. MILL. *Figur.* t. 51. f. 1. ZANNICH. *Venez.* t. 180. LOB. *Hist.* 332.

Aristolochia saracenica. DOD. *Pempt.* 324.

Pharm. ARISTOLOCHIÆ VULGARIS Radix, Herba.

Locus. Europa australis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix* cylindrica, simplex, longa, subtetragona, descendens, parce fibrillosa, crassitie vix digitii minimi, extus glabra, olacea; *parenchymate* albido, post sectionem transversalem distincto centro medullari amplissimo, orbiculato, stellato: radiis cinereis, superne sensim latioribus, apice obtuso-truncatis, crenulatis, terrugineis. *Caules* plures ex una radice, erecti, pedales vel ultra, teretiusculi, undique striati, simplicissimi, glabri, geniculati. *Folia* ad genicula, alterna, petiolata, cordata, obtusa, angulis posticis rotundatis, utrinque venulofo-rugosa, glabra, margine ciliato-aculeolata, infima sensim parva, brevius petiolata. *Petioli* subitus convexi, obsolete striati, supra canaliculati. *Flores* axillares, conferti, 6 vel 7, pedunculati, nudati. *CAL.* nullus. *COR.* supera, lutescens. *Tubus* cylindricus, angulatus, basi globosus. *Limbus* labiatus, erectus, concavus, dorso sulcatus; ante ore obliquo, apice obtuso, emarginato. *Nectar.* margo subcarnosus, longitudine germinis, apice 6-crenatus, germen cingens. *STAM.* *Fil.* nulla. *Anth.* 6, ovatae, utrinque truncatae, nectario extrorsum adglutinatae. *PIST.* *Germ.* infe-

ferum, angulatum. *Styl.* vix ullus. *Stigma* truncatum, angulatum.

PROPR. rec. herbæ: *Odor* fragrans, subgraveolens; *sapor* debilior, aromatico-gravis; *radicis*: odor & sapor herbæ, verum sapor magis amarus, inhærens.

VIRTUS: pellens, emmenagoga, diuretica, vulneraria.

USUS. Cachexia, Hypersarcosis, Fistula, Ca-coëthes.

ORDO OCTANDRIA.

453. CYTINUS Hypocistis. LINN. *Syst. nat.* 12.
p. 602. Mat. m. 220.

Hypocistis. DUHAM. *Arbr.* 1. *p. 170. t. 68.*

CAMER. *Epit.* 96. 97. CLUS. *Hist.* 1. *p. 68. 79.*

LOB. *Hist.* 548.

Thrysine Hypocistis. GLED. *Hist. de l' Acad. des sc. de Berl.* 1764. *p. 36. * fig. 1-11.*

Pharm. *HYPOCISTIDIS Succus.*

Locus. Europa australis. *Parasiticus in Cisto.*

FORMA. *Succus inspissatus in massam nigricantem, plasticam, subfragilem, fragmentis opacis, atomis subsplendentibus.*

PROPR. *Odor* vix ullus; *Sapor* acerbus, in saporem atramenti leviter incidens, stypticus, acidulus; *masticatus* dentibus subadglutinatur, solvitur in ore: *saliva* fusco-nigricante.

VIRTUS: adstringens, subrefrigerans.

USUS. Atonia.

OBS. 1. *Infusum* (s. solutio succi in aqua calida) subopacum, fulcum, acidulo-acerbum; dilutum cum vitri-

triolo martis subito atrum fit. Hujus solutionis guttae
3, cum aquæ unc. 3 & vitriolo martis, colorem viridis-purpurascentem reddiderunt.

OBS. 2. Baccæ recentes in solo natali contunduntur, & exprimitur succus, qui deinde in sole siccatur in consistentiam extracti. Solvitur hic succus in aqua vel spiritu vini.

ORDO POLYANDRIA.

454. ARUM maculatum. LINN. Sp. pl. 1370. Mat. m. 417.

Arum. BLACKW. Herb. t. 228. LOBEL. Icon. 597. DOD. Pempt. 326.

Arum vulgare non maculatum. MILL, Fig. t. 52. f. 1.

Pharm. ARI Radix.

Locus. Europa australior. Perenne.

FORMA. rec. Radix recens tuberosa, magnitudine vix ovi columbini, obducta tunica tenera, membranacea, ovata, extus alba, parce fibrillosa: fibris sparsis; tuberculis undique sparsis, distantibus, subrotundis, sc. totidem bulbulis parvis, ætate sensim excrescentibus; apice instructa squamis plurimis albis, membranaceis, imbricatis, adpressiusculis; quarum interiores minores, intra quas latet denticulus vivax, solitarius, subulatus, acutus, subincutvatus. Parenchyma album, carnosum, post sectionem transversalem æquale, subsucculentum: succo maculas albidas, amylaceas, in cultro deponente. Siccata radix dura, subdiaphana; vetusta s. diu servata

Z z

ni-

nivea, farinosa, sicca, fragilis, friabilis, subinquinans, facie cretæ albæ.

PROPR. rec. Odor nullus; sapor primum insipidus, mox vero pungens, qui sensus punctoriū sensim increscit, haud aliter ac mille acus pungerent, atque inhæret etiamsi os eluitur aqua pura, oleosis vero mitigatur. Recens radix resecta lactescit: lacte amylaceo, quiete amyllum album deponente, supernatante liquido limpido. Recenter siccatae radicis sapor adhuc pungens, paullo tamen remissior quam recentis; diu vero siccatae & aridæ farinaceus, vix pungens; hæc, masticata, farinacea sentitur & inter dentes friabilis, facile comminuitur, solvitur ferre: saliva lactescente; immo hæc, contusa, ex aqua frigida superaffusa resolvitur in amyllum album, recentis radicis amylo simillimum. Omnis radix Ari, siccata & contusa, atque in aqua cocta, abit in Gelatinam mitem, dulcescentem, sapidam, alimentarem, glutinantem. Sic tota radix annosa amyllum constituit.

VIRTUS recent. siccatae: stimulans, aperiens, incidens, diuretica; recentis vehementissima; annosæ nutriendis.

USUS rec. sicc. Colluvies pituitosa, Anorexia, Cephalæa sympathica, Asthma humorale, Cachexia, Febris intermittens.

OBS. 1. Radix extrahitur aqua, non vero spiritu vi- ni, Extractum validum non dat; perit enim omne pungens ebullitione, & mitescit radix. Destillatione nihil elicetur; hinc nulla aqua destillata, nullus spiritus.

OBS. 2. Radix tempore autumnali, postquam maturuere semina, colligenda, namque sic magis efficax. Si valebit hæc radix, in pharmacopoliis eam servare oportet in vasis clavis, & ab aëre humido bene mu-

nire, alias fatisendo farinosam induit faciem, inutilis tuoc in medicina.

OBS. 3. Recens radix, in taleolas facta cutique applicata, vix rubefacit vel vesicat. Evidem applicui eam cuti propriæ absque ullo incommodo; sed dum teneræ cuti virginis ejusdam taleolam crassam adalligavi, eadem margine altero vesiculam pusillam elevavit, tardioris sanationis, reliquo loci non rubefacto.

OBS. 4. Praeclarum effectum identidem expertus sum ex hac radice, alcalinis, absorbentibus & aromatibus maritata, in cephalæis sympatheticis pertinacissimis. Hæc species cephalææ omnes cluserat medelas, antequam in pulverem Ari compositum incidebam. Scilicet sympatheticæ ea est a primis viis, forte ab atra bile profecta. Dolore capitis infane vehementi crueiantur ægri, saepè per intervalla recrudescente, absque febre, pulsu subinde nimis tardo, plerumque vero naturali. Saepè lingvæ basis ipsique dentes nigrescunt, velut apud illos qui ore tabaci fumum hauriunt. Venæsecções, hirudines, scarificationes, vesicatoria, laxantia, aquæ minerales, in hac specie cephalææ nihil efficiunt, sed saepè augent dolorem; quod etiam accidit a propinatis salinis. Sed pulvis Ari compositus nunquam non solatium attulit. In febribus intermittentibus pulveres dedi quovis bihorio e Rad. Ari solid. & Tart. vitriol. ana scrup. $\frac{1}{2}$, Rhei sel. gran. 5. Illi purgauunt alvum medio critter, & subinde febrem sustulerunt, quandoque absque relapsu; sed apud sensibiores tortina excitauunt, quare dosis Ari tunc diminuenda fuit.

OBS. 5. Radix Ari culinaris non dum facta est; quod profecto mereret ob virtutem, quæ in eo inest, nutritiuentem, quæ quidem affatim evincitur ex qualitate ejus amylacea, ut & vi glutinante. Juseulum paravi e radicibus vetustis & farinosis, perinde sapidum, ac a Sago, odore pulmenti triticei. Tales radices Ari annosæ vix

acres sunt, prout supra monuimus, & quæ restare potest acrimonia, mitigatur penitus ebullitione. Ceterum plures Ari species apud varias gentes esculentæ sunt. Nutriunt omnes suo farinoso.

455. CALLA palustris. LINN. *Sp. pl.* 1373.

Dracunculus aquatilis. DOD. *Pempt.* 329.

Aquatica angvina f. Dracunculus. LOB. *Hist.*

^{328.}

Pharm. CALLÆ PALUSTRIS Radix.

Locus. Europa borealis, in paludibus. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix cylindrica*, elongata, repens, obliqua, crassitie' digitii, laevis, nitida, spadicea, geniculata, fibrosa: fibris filiformibus, numerosis, albis, elongatis, saepe pedalibus, approximatis, e geniculis simplici serie subtus exentibus, descendentibus. Rudimenta vaginalium emortuarum ad genicula. *Parencyma album*, subcarnosum, post sectionem transversalem ænuale, undique punctis rubro-lutescentibus adspersum.

PROPR. rec. & sicc. *Odor* (rec.) debilis, sub-aphrodisiacus; *sapor* acris; *masticata* primum insipida, dein pungens, qui sensus punctoriis sensim increscit, etiam abjecta radice, & post vehementer fit, manifestans se in toto ore cum affluente saliva copiosa & tenaci, molestissimus, inhærens, durans, labiis ipsis pallescentibus, exsanguibus quasi, obstupescentibus, & velut aqua fervida adustis, tandem sponte evanescunt haæsequæ. *Radix* recens concisa, digitisque tractata, glutinosa sentitur.

VIRTUS: quæ in priore; non tamen farinacea.

USUS.

OBS. 1.

OBS. 1. Calla palustris nondum in officinis locum invenit, quem tamen radix ejus, apud nos vulgatissima & sponte nascens, mihi videtur satis tueri posse. Præstabilior Aro in eo est, quod siccata melius servat, nec in farinam fatiscit ut Arum, paulloque fortior est. At vero difficilis est pulveratu.

OBS. 2. Semina Callæ palustris acria sunt, tamquam radix. In pericarpo obvoluta sunt mucilagine spissa, tenaci, insipida.

OBS. 3. Infusum aquos. radic. rec. & sicc. limpidum, debilius mucilaginosum, odore nullo, sapore debilissimo, vix pungentio; vitriolo martis non deminatur.

CLASSIS XXI.
MONOECIA.
ORDO
MONANDRIA.

456. **C**YNOMORIUM coccineum. LINN. Sp. pl. 1375. Mat. m. 534. Amœn. acad. 4. p. 351. t. 2,
Cynomorium purpureum officinarum. MICHEL. Gen. p. 17. t. 12.
Fungus melitensis. Comm. Bonon. v. 1. p. 158.*
Fungus mauritanicus verrucosus ruber. PETIV.
Gazophyl. t. 39. f. 8.
Fungus typhoides coccineus tuberosus melitensis. BOCCON. Sicil. p. 80. t. 81.
Fungus typhoides Liburnensis. TILLI Hort.
Pisan. p. 64. t. 25. f. E.
Pharm. *FUNGUS MELITENSIS.*
Locus. Europa australis, Barbaria. *Herba parasitica* in radicibus, mensibus hyemalibus, inter Novembrem & Martium.
FORMA. Radix simplex, carnosa, cylindrica s. ovato-lanceolata, obtusiuscula, bipollicaris, horizontalis, utrinque plano-compressa, parasitica, radicibus fruticum innixa, fibris capillari-bus, squamata; squamis lunulatis, rotundato-truncatis, imbricatis. Scapus spithameus, carnosus, sanguineus, erectus, succosus, teretiusculus, superne incrassatus, crassitudine vix digitii minoris, glaber, squamosus: squamis sessilibus, semi-

miungvicularibus, sparsis, remotis, ovatis, obtusiusculis, erectis. *Folia* nulla. *Spica* terminalis, scapo concolor, sessilis, cylindrica, obtusa, bipollicaris, erecta, scapo paullo crassior, adsparsa squamis sparsis, uti in scapo, constans *floribus* compactis, congestis, glomeratis, masculis, foemineis, & paucis hermaphroditis commixtis. *Bracteæ* angustæ, setaceo-sublineares, longitudine florum, glomeri florum insertæ. *Flores* masculi, breviter pedicellati. *CAL.* communis: amentum spicæ. *Involucr.* proprium hexaphyllum (sæpe tetraphyllum): fetis æqualibus, superne incrassatis, basi in pedicello corollæ sitis. *COR.* squama cuneiformi-turbinata, pedicellata, subcarnosa, sangvinea, truncata, latere exteriori convexa, interiori vero sulcato-concaviuscula, erecta, longitudine involucri. *STAM.* *Filam.* unicum, firmum, sulco petali basi insertum, illique intrusum, corolla paullo longius. *Antbera* didyma, exserta, erecta, latere utrinque dehiscens. *Fæminei* flores longius pedicellati: pedicellis crassiusculis, subdiaphanis. *CAL.* Perianth. proprium superum, 4-vel 6-partitum, laciniis setaceis, obtusis, æqualibus. *COR.* nulla. *PIST.* Germen subrotundum, inferum. *Stylus* cylindricus, firmus, longitude calycis, erectus. *Stigma* obtusum. *Semina* solitaria, globosa, coccinea.

PROPR. sicc. Odor nullus. Sapor subadstringens, salitus; recens planta succo sangvineo scatens.

VIRTUS: restringens.

USUS. Profluvia sangvinis.

OBS. 1. Infusum aquos. limpidiusculum, colore aquo, sapore salto; vitriolo martis fuscum; hujus infusi guttae 50, cum aquæ unc. 3 & vitriolo martis, leviusculæ subfuscescunt.

OBS. 2. Ipse nunquam periclitatus sum, quid hæc planta efficiat in medicina. Certe laudat illam BOCCONE, ut specificam in sanguinis profluviis. Medicina domestica est apud Melitenses.

ORDO TETRANDRIA.

457. BETULA alba. LINN. Sp. pl. 1393. Mat. m.
421. KNIPH. Bot. orig. cent. 12.

Betula. DUHAM. Arbr. 1. p. 100. t. 39. DALECH.
Hist. 92. CAMER. Epit. 69. DOP. Pempt.
828. BLACKW. Herb. t. 240.

Pharm. *BETULÆ* Lignum, Lympha, Epidermis, Folia tenera, adulta, Fuligo, Oleum moscoviticum.

Locus. Europa, in sylvis. *Arbor.*

FORMA. *Lignum*, e ramis crassitie digitis sumendum, album, compactum, durum. *Epidermis*, e trunco arboris, crassa, arida, coriacea, rigidiuscula, pagina interiore corticem spectante adspersa cicatricibus sparsis, subulatis, lamellas permeantibus; colore sordide albicante, stramineo; partibilis in lamellas plurimas, tenuissimas, planas, parallelas; quarum exteriores niveæ, tenuiores. *Folia* alterna, petiolata, ovata, sensim acuta, plusquam pollicaria, utrinque glabra, supra saturate viridia, lucida, adspersa punctulis albicantibus, subtus cinerea, nervosa, venulis parvis reticulata, margine duplicato-ferrata: ferraturis primariis grossis; *tenella* plicata, resinosa quadam materia illinita, unde glutinosa apparent, digitisque tractata adhærent.

PRO-

PROPR. Folior. rec. Odor debilis; Japor debilis, amaricans; masticata lubrica sentiuntur. Epidermidis: Odor nullus, nec sapor. Epidermis, ignis flammæ admota, facile accenditur, convolvitur, flagrat cum strepitu: flamma vivida, luminosa, fumante: fumo obscuro, debilius odorato, maxime fuliginoso, relicto carbone atro, splendentे, leviusculo, vix inquinantे. Fuligo atra, levis, tenuis, inquinans. Lymphæ: subdulcescens.

VIRTUS: foliorum sudorifera, diaphoretica; lymphæ: diluens, antiscorbutica, anthelmintica, diuretica.

USUS. Folior. Erysipelas; Lymphæ: Scorbatus, Scabies, Arthritis, Lumbrici; Epidermidis & Fuliginis: mechanicus.

OBS. I. Lymphæ ex arboris trunko, tempore vernali ante & sub frondescentiam terebra efforato, stillat, limpidissima instar aquæ, sapore leviter dulcescente. Arbores fauciæ pergunt lympham stillatim fundere, quoad folia proruperunt. Non perit arbor ex stillicidio lymphæ, sed perdit, ut quidam statuunt, annum integrum de sua increscentia. Hæc lympha, addito saccharo & fermento, subit fermentationem vinosam, abitque in potus speciem, sub calore æstivo gratissimam, & aëre fixo abundantem, unde instar vini Campanici effervescit. Methodus apparandi hæc erit: Re. Lymph. betulin. cong. 7 ʒ, Sacchari Thomæi libr. 4, bulliant usquedum congii 2 evaporarint, sub frequenti despumatione. Tum effundatur hic liquor in vas ligneum, & postquam paullulum refriguit, addantur Vini albi gall. libræ 10; sed simulac tepidus evasit, addantur 3 Mala citrea, in frusta dissecta & enucleata, Cinnamom. drachm. 6, Cardamom. unc. ʒ & Tartari cerevisiæ cochl. 1. Hoc factò, vas obturetur, ut per nycthemeron fermentetur liquor, quem postea immittere oportet.

ter in dolio, in cella reponendum per septimanas 3, quibus elapsis, liquor in ampullas vitreas ingeri debet, bene obturatas, vix tamen plenas. Liquorem sic fermentatum in cella bona servare oportebit, alias sponte effervescit in ipsis ampullis, unde illæ dissiliunt; alias corrumpi etiam potest eo modo, ut tenax fiat & in fila ductilis, salva limpeditate, atque postea acescat. Si autem ampullas in cella bona collocaveris, & quidem in arena humida, liquorem hunc per plures annos rueri poteris. Lympha betulina recens, supra ignem inspissata, abit in melliginem dulcem, longe parioris quantitatis, quam quæ ex lympha Aceris haberri potest. Saccharum verum ex hac mellagine betulina non obtinere potuit cl. MARCGRAP (*), sed mellis speciem, ad Mannam officinarum accedentem. Ex Lymphæ betul. rec. libris 8, quas leni igne inspissari feci, obtinui drachmas 10 melliginis, mollioris, ætate rigescens, consistentia mellis granulati, fusco-rubicundæ, sapore acidulo-dulci, subbalsamico, in Extr. infusi Maltæ incidente; masticationi subiecta melligo hæc, ita sele habet ut Manna calabrina, rigidiuscula inter dentes sentitur, mox vero solvitur.

OBS. 2. *Extractum* foliorum Betulæ in Erysipe-
late atque arthritide primus hic loci propinavit nob.
JOH. AF DARELLI, qua in re affecas nahtus est plures
nostratum Medicorum. *Folia* Betulæ recentia, ut eu-
poriston contra arthritidem atque rheumatismos, ruri-
colæ nostri identidem adhibent. Sternunt hisce foliis
lectum, in quem se recipit infirmus, totumque cor-
pus, præter caput, bene foliis istis circumoperit, ex
quo paullo post sit, ut sudor proritetur copiosissimus,
disfluens donec ibi manet æger. Constat, plures hac-
ee methodo rheumatismis fuisse levatos. *Epidermis*
Be-

(*) *Opuscules chymiques*, tom. i. p. 242.

Betulæ in calceos immitti solet, ad sudorem pedum provocandum; certe sudant semper inde pedes, unde species revulsionis oritur, in morbis chronicis sœpe salutaris.

OBS. 3. *Decoctum Ligni Betulæ saturatum colore* est vini rubri dilutionis, odore debili, sapore amari-
cante; cum vitriolo martis nigrescit; hujus decocti gut-
tæ 30, aquæ unciae $\frac{1}{2}$ instillatae, addito vitriolo mar-
tis, colorem fulco-viridescensem stiterunt. Sunt qui
ex hoc decocto multum levaminis sperant calculo ve-
sicæ, sed mihi non successit apud binos calculosos. Pel-
lit urinam.

OBS. 4. *Oleum moscoviticum* sequenti modo para-
tur. Ollæ ferreæ immittatur epidermis betulina, in
frustula magnitudine palmæ manus fæsta, stratis hori-
zontalibus, verticaliter arcte compressa. Inter singu-
lum stratum betulinum laxe spargantur Terræ tripoli-
tanæ pugillus unus, herbæque Ledi palustris manipu-
lus unus; & vero Ledum ad Epidermidem betulinam
se habebit ut i ad 20. Olla sic plena, & dictis rebus
compingendo onerata, invertatur super assēm quernam,
orificio ollæ undique aptatam, in centro perforatam:
foramine amplitudinē digiti, radiis insuper in asse exar-
tatis, conducentibus a peripheria ad centrum. Margo
ollæ undique bene adglutinetur assi ope argillæ, ne
alicubi transeat fumus. Hoc factō, effodiatur in terra
antrum, in quo alia olla, ut recipiens, collocetur, ei-
demque superponatur memorata illa assis querna cum
adglutinata olla inversa, quæ dein obtregatur terra. Tum
ignis supra hanc terram accendatur, principio validus,
deinde vero modefatus, qui post durabit usque ad fi-
nem processus. Olla mensuræ 8 congiorum, rite o-
nerata, trihorii labore, dat Olei moscovitici circiter
libr. 2 vel 2 $\frac{1}{2}$. Atque sic obtinetur oleum per de-
scensum, empyreumaticum, fuscum, recens liquidum, æra-
te

te vero spissum, odore fragrante. Cel. P. S. PALLAS (*) tradit, oleum betulinum præstantissimum in Siberia quotannis parari, absque ulla additione Ledi.

OBS. 5. *Betula alba* frigoris perquam patiens est, frigidis regionibus dicata. Ut observavit J. G. Gmelin (**), crescit *Betula* in Jakutzk Sibiriæ, ubi clima adeo durum est, ut segetes ibi non proveniant, & terra in fine mensis Junii penitus gelida deprehendatur sub trium pedum profunditate.

458. *BUXUS sempervirens*. LINN. *Sp. pl.* 1394.

Mat. m. 423. KNIPH. *Botan. orig. cent.* 1.

MUNTING. *Aardgew. t.* 157.

Buxus arborescens. DUHAM. *Arbr.* 1. p. 115.

t. 46.

Buxus. LUDW. *Ectyp. p. 2. t. 4.* BLACKW. *Herb.*

t. 196. DALECH. *Hist. 165.* DOD. *Pempt. 770.*

Pharm. BUXI Lignum.

Locus. Europa australis, Oriens, Persia. Colitur in hortis. *Arbuscula.* Amat aprica, frigida, montes.

FORMA. *Lignum* solidum, duriusculum, ponderosum, pallido-citrinum, venis longitudinalibus; vestitum cortice cinereo, rugoso; post sectionem transversalem notatum venis transversalibus, parallelis, & striis decussantibus, minutissimis.

PROPR. *Odorem* vix habet, nec *saporem*.

VIRTUS: sudorifera.

USUS.

OBS. 1. *Oleum* destillatum fætidum, empyreumaticum.

OBS. 2.

(*) Reise durch verschied. Prov. des Russisch. Reichs, tom. 2. p. 190.

(**) Reise durch Sibirien, vol. 2. p. 520.

OBS. 2. Camelis deleterius est Buxus, ut observavit J. HANWAY (*), in provincia Persiae Gilan, ubi Buxus ubertim provenit. Gratum quidem illis pabulum est, sed confessim enecat.

459. URTICA dioica. LINN. *Sp. pl. 1396. Mat. m.*

419.

Urtica urens altera. DOD. *Pempt. 151.*

Urtica sylvestris asperior. LOB. *Hist. 281.*

Urtica. BLACKW. *Herb. t. 12.*

Pharm. URVICÆ MAJORIS Radix, Herba.

Locus. Europa, in ruderatis. *Perennis.*

FORMA. rec. *Radix cylindrica, crassitie pen-*
næ anserinæ, flexuosa, undique fibrosa, rigidius-
cula: parenchymate sicciore, post sectionem trans-
versalem notato centro medullari orbiculato, cin-
cto disco obsolete annulato. Caules plures ex u-
na radice, erecti, simplices, vix ramosi, tetra-
goni: angulis subrotundis, 4-sulcatis, pubescen-
ti-hispidis: pilis rigidiusculis, inferne crassis, cy-
lindricis, in medio articulatis, apice subulato,
acuto, pungente. Folia opposita, petiolata, cor-
data, acuta, grosse serrata, bi-vel triplicaria,
supra lineata, rugosa, saturate viridia, subtus
pallidiora, utrinque hispida: pilis breviusculis,
rigidis, subulatis, basi globosis; superiora proxi-
miora. Petioli tetragoni, hispidi. Stipulae oppo-
sitæ, bipartitæ: laciniis linearibus, obtusiusculis,
submembranaceis, ciliatis, patent-i-reflexis. Amen-
ta quaterna, breviter pedunculata, ramosa, pa-
tentia, mascula, floribus glomeratis, subfessili-
bis. CAL. Perianth. 4-partitum: laciniis ovatis,
obtusis, concavis, margine membranaceis, subtus
sca-

(*) *Reise durch Russland und Persien, vol. 1. p. 206.*

scabris, patentibus. *COR.* nulla. *STAM.* Filam. 4, setacea, calyce longiora, instantे anthesi elastice prossilientia. *Antb.* subovato-gibbae, subtus convexiusculæ, supra bimarginatæ, biloculares. *PIST.* nullum; *rudimentum* germinis in centro, turbinatum, glabrum, apice obtusum, perforatum. *Fœminei Flores:* Amenta fœminea masculis similia, floribus glomeratis, minimis: glomerulis subrotundis, alternis. *CAL.* Perianth. triphyllum: foliolis exiguis, ovatis, obtusis, pilosis. *COR.* nulla. *PIST.* Germen superum, ovatum, glabrum, tenerimum. *Styli* nulli. *Stigm.* penicillus albus, breviusculus, patens.

PROPR. rec. rad. *Odor* debilis; *sapor* debilis, leniter amaricans; *herbæ*: *odor* & *sapor* herbacei.

VIRTUS: diuretica; *extus* applicita integra herba recens, urens est & exanthematica: maculis mox rubicundis, tum bullulatis, fugacibus.

USUS. Hæmoptysis; Paralysis externe.

OBS. 1. Folia Urticæ pungunt, uti observavit ROB. HOOKE (*), pilis rigidis, perforatis, acuminatis, basi instructis vesicula, humore acri turgida. Similatque acumen pili cutem perforat, reprimitur a resistentia cutis pilus recavus, unde compressa vesicula, per pilum in vulnuscum manat humor, qui acrimonia sua rodit, & exanthema excitat. Itaque urit Urtica par modo ac serpentes mordent.

OBS. 2. Folia Urticæ tenella primo vere apud nos colliguntur, in usum culinarem, tamquam oleris species.

460. MORUS nigra. LINN. *Sp. pl.* 1398. *Mat. m.*

422. KNIPHOF *Botan. orig. cent.* 3. DUHAM.
Arbr.

(*) *Micrograph.* p. 142. obs. 25 schem. 15 fig. A. B.

Arbr. 2. p. 24. t. 8. *Fruit.* 1. p. 335. t. 1.
BLACKW. *Herb.* t. 126.

Morus. DALECH. *Hist.* 326 DOD. *Pempt.* 798.

Mørbesyeboom. CAUS. *Hoven.* p. 12. t. 4.

Morus cum fructu. MERIAN. *Erucar.* ort. p.
1. t. 1.

Pharm. MÓRÍ Cortex, Baccæ.

Locus. Italia, in maritimis. Colitur in hor-
tis. Arbor.

FORMA. rec. *Cortex* radicis extus lutescens,
siccatus longitudinaliter rugosus, crassitudine di-
versa, pro aetate radicis, parenchymate albido.
Baccæ axillares e foliis, brevius pedunculatae,
ovales, obtuse, fusco-nigræ, glabrae, lucidiuscu-
lae, subpollicares, pondere scrup. 2-4, composi-
tae e *Bacculis*, dispositis serie longitudinali, in-
aequali, obovatis, compressis, truncato-obtusis,
terminatis pistillo, undique imbricatis in rece-
ptaculo carnosio, cylindrico; singulis constantibus
e 4 lobis vesiculosis, teneris, succosis, superne
convexis, inferne attenuatis, imbricatis, arcte
conniventibus; quorum 2 exteriores oppositi,
concavi, margine rotundato-adpresso, minu-
tim pubescente; 2 interiores connientes, paral-
leli, directione contraria ad exteriores. *Semen*
unicum in medio, intra lobos, triangulari-ova-
tum, acutum, glabriuscum, compressum, dor-
so plano, antice acie acuta, inferne truncatum,
cavum, auctum apophysi gelatinosa, involutum
propria tunica subexsucca. *Stylus* brevis. *Sti-
gmata* 2, linearis-subulata, hirsuta, erecta.

PROPR. corticis: Odor graviusculus; sapor
austerus, graviusculus, amaricans, subsalsus. *Bac-
car.* rec. odor vix ullus; sapor acidulus, insimil
in cucumerinum incidens. *Baccæ masticatæ val-*
de

de succosæ; extrahitur succus, remanent pelliculae, receptaculum & semina expulsa; saliva nigro-violacea.

VIRTUS corticis: adstringens, anthelminthica; *Baccar.* refrigerans, restringens.

USUS corticis: Tænia; *Baccar.* Febres, Angina, Aphthæ.

OBS. 1. Infusum aquosum *corticis* lutescens, odore non ingrato, sapore consimili; vitriolo martis debilius fuscescit. *Baccar.* recent. unc. i expressione dat unc. $\frac{1}{2}$ & scrup. 4 succi rubri, aciduli. Hic succus, dum baccæ manibus tractantur, cutem tingit rubro-purpureo; cum vitr. martis & pauxillo aquæ commixtus, nigrescit. Succi puri guttae 4, aquæ unc. $\frac{1}{2}$ instillatae, addito vitriolo martis, colore effecerunt violaceum; guttae vero 20 obscure violaceum.

OBS. 2. Corticem radicis ut anthelminthicum, etiam contra Tæniam, commendant plures. *NIC. ANDRY* (*) docet, corticem radicis Mori, dosi drachm. 3 $\frac{1}{2}$, in aquæ puræ libra i per semihoram coctum, & decoctum mane propinatum, revera Tæniam pellere, & simul alvum purgare; si unica dosis non sufficit, iterrandam dosin fvatet, usquedum Tænia pellatur. E baccis maturis paratur Rob, quod frequenter prescribitur, ut linetus refrigerans in febribus, ad lingvam aridam emolliendam. Sæpe additur spiritus vitrioli.

ORDO POLYANDRIA.

461. POTERIUM Sangvisorba. LINN. Sp. pl.
1411. Mat. m. 425. KNIPH. Bot. orig. cent 1.
Pin-

(*, De la generation des vers, p. 172.

Pimpinella Sangvisorba. CAMERAR. Epit. 777.

ZANNICH. Venez. 119. DOD. Pempt. 105.

Pimpinella. BLACKW. Herb. t. 413.

Pharm. **PIMPINELLÆ. ITALICÆ** Herba.

Locus. Europa. Colitur in hortis. **Perenye.**

FORMA. rec. **Radix** cylindrica, crassitie dígitæ, brunnea, in ramos divisa. **Caules** plures ex una radice, erecti, pedales, angulati, viides, angulis linea fusca notatis; glabri, ramosi. **Rami** alterni, erecti; compressiusculi, angulati. **Folia** alterna, petiolata, pinnata cum impari, septemjuga: foliolis petiolellatis, oppositis, ovatis, obtusis, inciso-ferratis, utrinque glabris, venulosis, subtus glaucis, carinatis, supra obscure viridibus, concaviusculis; inferioribus minoribus. **Petioli** communes fuscescentes, parce pilosi, subtus convexi, supra canaliculati, basi concavi, ciliati. **Stipulae** utrinque 2, ex pari foliorum solitario, basi petioli. **Flores** capitati, capitulis terminalibus, subsolitariis, ovatis, obtusis, acutis, pedunculatis; quorum superiora hermaphrodita; inferiora foeminea. **CAL.** Perianth. triphyllum, inferum: foliolis ovatis, obtusis, ciliatis, membranaceis, corolla brevioribus. **COROLLÆ** supera, tetrapetala, plana, cruciformis: petalis sessilibus, ovatis, obtusis, sub apice notatis punto elevato subrotundo, spadiceis, apice revolutis, trinerviis, margine membranaceo, undulato. **STAM.** Filam. plurima, capillaria, erecta, longitudine fere corollæ. **Antberæ** subovatae, compressæ, utrinque retusæ, erectæ. **PIST.** Germ. inferum sub corolla, ovatum, compressiusculum, rugosum, albidum, tetragonum. **Styli** 2, albi, cylindrici, longitudine vix corollæ. **Stigmata** penicilliformia, alba.

A a a

PRO.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, graviusculus, gratus; *sapor* congruens.

VIRTUS: tonica.

USUS: culinaris.

OBS. Folia recentia in culinis adhibentur in satura herbaria, gratumque ei conciliant saporem.

462. QUERCUS Suber. LINN. *Sp. pl.* 1413. *Mat.* m. 427.

Suber latifolium perpetuo virens. DUHAM.

Arbr. 2. p. 291. t. 80.

Suber folio breviore & latoire. DALECH. *Hist.* p. 22.

Suber. BLACKW. *Herb.* t. 193.

Pharm. *SUBERIS* Cortex.

Locus. Europa australis. *Arbor.*

FORMA. Cortex in frustis, utrinque planis, longitudine circiter pedum 2, latitudine pedis 1, crassitie pollicari, levis, molliusculus, coriaceus, sed insimul firmus & compactus; post sectionem transversalem æqualis, notatus venis parallelis, rufescentibus.

PROPRIET. *Odor* nullus, neque *sapor*. Cortex, cultro acuto incisus, secatur secamentis coriaceis, laevibus.

VIRTUS:

USUS: mechanicus.

OBS. 1. Cortex trunci arboris, circiter duodecennis vel supra, mense Julii s. Augusti, longitudinaliter inciditur in segmenta arbitraria, atque deinde caute divellitur, ne liber trunci lœdatur. Hæc segmenta primum radendo bene tergenda, deinde flammæ ignis exponenda, ut superficies paullulum crispetur porique constringantur. Hoc facto, in aqua frigida bene lavanda, & cumulatim coacervanda, tum ponderibus one-

oneranda, ut plana evadant. Præstans censetur subereus cortex rubicundus; albidus vero, h. e. sine igne præparatus, & in aqua solum maceratus ut planus fiat, vilis est; luteus medioœris. Si liber arboris non fuit læsus, cortex subereus sensim regeneratur, ita ut post 8 seu 10 annos de integro divelli possit. DUCHAMEL.

- OBS. 2. Suber ustum in haemorrhoidibus cæcis adhibetur, ungvento immixtum.

463. QUERCUS Cerris. LINN. Sp. pl. 1415.

Robur Quercus Cerrus. CLUS. Hist. 1. p. 18.

Galla major. LOBEL. Hist. 586. DODON. Pempt. 813.

Pharm. GALLÆ TURCICÆ.

Locus. Europa australis, Barbaria. Arbor.

FORMA. Gallæ ponderosæ, magnitudine ovi columbini, in ipsis ramis arboris subæstiles, alteræ, globosæ, pallide viridescenti-cinereæ, glabriusculæ, notatæ verrucis sparsis vel crista-
tis, elevatis, grossè subreticulatis; altero latere communiter perforatæ. Parenchyma solidum, friabile, albescens, intus fuscescens, resinosum, centro cavo.

PROPR. Odor nullus. Sapor acerbissimus, maxime stypticus; masticatæ friabiles, lingvam faucesque vehementius constringentes.

VIRTUS: peradstringens, coriaria, obstipans.

USUS: externus.

OBS. I. Extrahuntur Gallæ turcicæ menstruo cum aquoso, tum spirituoso, quæ ambæ tinturæ post evaporationem extractum dant stypticum. Infusum aquosum saturatissimum, olivaceum, opalescens, subopacum, intense stypticum; cum vitriolo martis subito nigrescit; hujus infusi gutta 1, aquæ unciæ 5 instillata,

addito vitr. martis, colorem obscure cæruleum, nigrescentem efficit. *Decoctum aquosum saturatissimum, spissum, opacum, olivaceum, stypticum, absque odore;* hujus decocti gutta 1, cum aquæ uncia 3 & vitr. martis, colorem fistit atro- cæruleum, opacum. Gallæ turcicæ septem octonas partes *Extracti aquosi* dant, tres vero quaternas partes extracti resinosi; NEUMANN. Sub *pulveratione* irritant Gallæ turcicæ narres & sternutationem movent.

OBS. 2. Multum acidi continent Gallæ turcicæ, atque hoc acidum summæ est affinitatis cum metallis, in acidis mineralibus solutis. Si infusum gallarum saturatus instilletur solutioni vitrioli martis, aqua pura dilutæ, decomponitur mox vitriolum, acidum gallarum combinatur cum terra martiali, & subsidunt ambo; acidum vero vitrioli liberum (nisi nimia cum aqua fuerit dilutum) reagit in præcipitatum, illudque iterum solvit: solutione cærulea, si bene diluta sit; atra vero, si saturata. Sic oritur Atramentum scriptorium. Cl. MONNET (*) experimentis curiosis docuit, Gallas turcicas pari efficacia solutiones etiam omnium metalorum præcipitare. Porro quoque existentia acidi in Gallis turcicis ex decoctione serici cum gallis demonstratur; accipit enim serum hac encheiresi crepitum (*le cris*), uti ex omnibus aliis acidis.

OBS. 3. Usus medicus Gallarum rarissimus est; nimis enim stypticæ sunt. Sunt qui febres intermitentes & diarrhœas cum Gallis propinatis curare tentarunt, sed infausto conatu; visceræ enim inde sæpe obstrueta. Tinctoribus autem usitatissimæ sunt, &, quod singulare est, augent pondus ferici, interdum usque ad decimam ponderis partem.

OBS.

(*) *Traité des Eaux minérales.* - Paris 1768. p. 309. seq.

OBS. 4. Galla turcica est excrescentia Quercus, nidum insecti cuiusdam constituens. Gallæ perforatæ insectis liberatae sunt; namque ab illis perforantur, dum exclusa exibunt.

464. QUERCUS Robur. LINN. Sp. pl. 1414.

Mat. m. 426. KNIPH. Bot. orig. cent. 3.

Quercus cum fructu. MERIAN. Eruc. ort. p. 17. t. 51.

Quercus. LOESEL. Pruss. 211. t. 69. DOD. Pempt. 811. BLACKW. Herb. t. 487.

Quercus cum longo pediculo. DUHAM. Arbr. 2. p. 202. t. 47.

Pharm. QUERCUS Cortex, Folia, Glandes, Cupulæ.

Locus. Europa. Arbor.

FORMA. Cortex trunci planiusculus, crassitie semipolllicari, subligneus, undique cinereus, extus longitudinaliter subfissus, saepe conspurcatus Lichenibus. Folia alterna, breviter petiolata, fere digitalia, cuneiformia, runcinato-lobata: lobis oppositis, obtusis, inferioribus sensim minoribus; utrinque glabra, minutissime venulofo-reticulata, margine subrecurvato, integerrimo. Pedunculi axillares, in summitate ramulorum, solitarii, foliis breviores, nudi, glabri. Perianth. fructus (cupulæ) cinerascens, crassiusculum, corticosum, communiter geminum, saepe solitarium, pateriforme, integerimum, margine truncato, æquali, minutissime ciliato, extus rugosum: squamulis imbricatis, ovato-acutis, subcarinatis, adpressis, apice obtusiusculis; intus læve, centro deraſo in fundo, pallidiore. Nux ovalis, calyce triplo longior, undique lævis, nitidiuscula, colore stramineo, striis rubicundis

A a a 3

longi-

longitudinalibus, basi macula orbiculata derafa, apice obtusa, subvillosa, cum umbilico cylindrico prominente; *testa* pergamenta, fragili; *nucleo* dupli tunica obvelato, extus rugoso: vestigiis venulosis; bipartibili, solido; plumula in apice: puncto subrotundo, subprominente.

PROPR. corticis: Odor vix ullus; sapor acerbus, stypticus; *Glandis rec.* Odor nullus; sapor acerbus, stypticus; *siccata* dura.

VIRTUS: peradstringens, coriaria, obstipans.

USUS: externus, Prolapsus uvulae.

OBS. 1. *Infusum aquosum corticis aureo-lutescens*, odore debili, sapore debilius styptico; cum vitriolo martis nigrescit. Hujus infusi guttae 3, aquæ unciæ & instillatae, addito vitr. martis, colorem violaceum stiterunt. *Infus. folior. sicc.* citrinum, odore debili, non ingrato; sapore debiliore, leniter amaricante; vitriolo martis nigrescit. Hujus infusi guttae 8, cum aquæ unci. & vitr. martis, colorem exhibuerunt violaceum. *Cupularum*: *Infusum saturatissimum saturate rubicundum*, stypticum; vitriolo martis subito nigrescit; hujus infusi guttae 20, cum aquæ unci. & vitr. martis, colorem fusco-viridescensem stiterunt. *Nucleor. rubro-turbidum*, stypticum; cum vitr. martis nigrum; hujus infusi gutta 1, cum vitr. martis & aquæ unci. & colorem stitit violaceum; guttae vero 2, colorém saturate cæruleum. *Aqua e foliis recent. destillata*, odore & sapore debili est, & acetum saturinum præcipitat.

OBS. 2. Quandoquidem Lignum quernum, eodem modo ac Gallæ turcicæ, extrahitur menstruo aquoso atque spirituoso, ratio eluet, cur Spiritus vini gallicus, qui in doliis quernis diu asservatus fuit, ab affusa solutione vitrioli martis cærulescat.

OBS.

OBS. 3. Nuclei Quercus nullum fere oleum expressum dant, etiamsi sero autumno collecti sunt. Ajunt quidam, illos spiritum ardenter dare, sed experimentum ipse non institui. Hæ nuces minime edules sunt hominibus; sed Sues inde bene saginantur. Quæ de esu glandium quernarum hinc atque illinc relata leguntur, videntur vix intelligi posse de Quercu nostra vulgari, sed potius de Quercu vulgari brevibus pediculis, SHAW Afric. tom. 2. extr. p. 118, quæ dulces gerit glandes.

465. JUGLANS regia. LINN. Sp. pl. 1415. Mat. m. 430. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Nux Juglans s. regia vulgaris. DUHAM. Arbr. 2. p. 50. t. 13. DALECH. Hist. 321. DODON. Pempt. 803. f. 804. BLACKW. Herb. t. 247. Walnoten. CAUSE Hoven. p. 15. t. 4.

Pharm. JUGLANDIS Fructus immaturus, Extraestum.

Culinis ——— Nuces.

Locus. Persia, Anglia (*). Colitur in hortis.
Arbor.

FORMA. rec. Drupa immatura subrotunda, utrinque compressiuscula, apice obtuso - rotunda cum tuberculo prominente, magnitudine ovi gallinacei minoris, glabra, viridis, variegata: maculis pallidioribus, subelevatis; parenchymate carnosō - succulento, viridi, firmiusculo. Nux matura majuscula, pollicaris, subrotunda, ossea, sulcis reticulata, bivalvis, semiquadrilocularis; nucleo albo, quadrilobo: lobis longitudinalibus, anfractuosis, auriformibus, undique gibbulis rugosis, binis utrinque latere parallelis; membrana obvelato.

A a z 4

PRO-

(*) Philos. transact. v. 61. p. 1. p. 136. -- 166.

PROPR. rec. Drupæ immat. odor debilior; sapor acidus, acutus, tum stypticus; masticata firmiuscula, succosa, saliva viridescente. Drupa recens, resecta, cultrum adgreditur, & solvit ejus superficiem, colore nigro; manibus tractata, cutem tingit maculis ferrugineo-rubicundis, inhærentibus. Nucleorum matur. odor nullus; sapor subdulcescens; masticati firmi, comminuntur, saliva emulsiva. Nucleus immaturus, dissectus, inter anfractus plurimum mucilaginis fovet.

VIRTUS: Drupæ: laxans, antihelminthica; nuclei: nutriendi.

USUS: drupæ: Lumbrici; nucl. culinaris.

OBS. 1. Infusum aquosum Drupæ recentis fusco-rubrum, acidum, amarum, stypticum, ingratum; vitriolo martis fusco-nigrescit; hujus infusi guttæ 50, cum aquæ unc. fl. & vitr. martis, colorem fecerunt fusco-ferrugineum. Extractum drupæ sublalsum, viridi-nigricans, subsplendens, consistentia Rob Juniperi, tenaciusculum, odore satis grato, sapore acidulo, acerbiusculo, leniter styptico; gustatum salivam bruneo tingit. Paratur ex Drupis recentibus & immaturis, in vase ligneo contusis, affusa aqua, & deinde in ollis idoneis, minime ex metallis ignobilioribus paratis, in consistentiam extracti coctis. Hoc extractum præstans est antihelminthicum, dosi cochlearis pro thea, bis vel ter de die propinatum pueris. Purgat alvum, & lumbricos pellit simul.

OBS. 2. Nuclei Juglandum, a pelliculis probe purgati, comminuti grosso modo, Decoctum aquosum exhibuerunt lutescens, vix emulsivum, sapore debili, vitriolo martis nil demutatum. Decoctum vero pellicularum, luteo-ferrugineum, sapore debili, cum vitr. martis subito nigrescit; hujus decocti guttæ 30, in aquæ unc.

unc. & dilute, addito vitr. martis, colorem fusco-viridescem exhibuerunt. Itaque nuclei ipsi mites, pelliculae vero obvelantes stypticæ. Hi nuclei, ad dimidiam sui ponderis partem, oleum dant expressum, mite, dulcescens, flavicans, facile rancecens, & quod in frigore non cogitur, uti oleum olivarum; accensum fumat. Piatoribus utile est. Usq; anthelminthicum contra Tæniam plurimi commendant. Nuclei, cum aqua triti, in emulsionem abeunt.

OBS. 3. Arboris truncus incisus lympham stillat, quæ, tamquam lympha betulina, principio dulci scatet, & in melliginem saccharinam reduci potest.

466. FAGUS Castanea. LINN. Sp. pl. 1416. Mat.

m. 429. KNIPH. Bot. orig. cent. 5.

Castanea. DUHAMEL Arbr. 1. p. 134. t. 50.

MILL. Figur. t. 84. BLACKW. Herb. t. 330.

CAMER. Epit. 118. DOD. Pempt. 802.

Culinis CASTANEÆ Nuces.

Locus. Europa australis. Colitur. Arbor.

FORMA. rec. Nux ovato-hemisphaerica, hinc convexa, inde plana, brunnea, nitiduscua, laevis, basi obtusa, derafa: macula transversaliter oblonga, subquadrangulari; apice acutiusculo, tomentoso. Testa coriacea, intus tomentosa, subadhærens. Nucleus amygdalinus, testæ respondens, longitudinaliter sulcatus: sulcis parallelis; vestitus tunica tenera ferruginea; parenchymate cotyledoneo, firmo, albo, lobato: lobis arcte-conniventibus; sutura anfractuosa; corculo glabro, ovato-conico, subpedicellato, inter lobos margini inclusio.

PROPR. rec. Odor nullus; sapor dulcescens; masticatus nucleus siccusculus & firmus inter dentes sentitur, comminuitur, saliva alba.

VIRTUS: nutriens.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Nuces Castaneæ, si valebunt, siccandæ sunt. Modum, quo ignis ope siccari solent, tradidit cl. MONTET (*). *Infusum* aquos. nucum Castaneæ siccatur, rubicundum, dulcescens, fumum sapiens & redolens; a vitriolo martis non alteratur. *Olei* expressi nihil dant nuces Castaneæ, ut docet ill. DUHAMEL. Ex Nuc. Castan. libris 2 torcularis ope nullum oleum, sed sucum, qui in fermentationem vinosem ruebat, obtinuit cl. SPIELMANN.

OBS. 2. Nuces Castaneæ, coctæ vel frictæ, esitantur copiosissime in Europa australi, & tantum non basin nutrimenti efficiunt. Nutriunt bene, quamvis intuetis paullum flatulentæ sint.

467. FAGUS sylvatica. LINN. Sp. pl. 1416. Mat. m. 428.

Fagus. CAMER. Epit. 112. DODON. Pempt. 820.

DUHAM. Arbr. 1. p. 231. t. 98.

Pharm. FAGI Nuces, Cineres clavellati.

Locus. Europa, America septentrionalis. Arbor excelsa.

FORMA. Nux magnitudine vix nucis Avellanæ minoris, exquisite triquetra: angulis acutis, acie in membranam brevem exeuntibus; undique lævis, nitidiuscula, brunnea, lateribus planis, singulis notatis striis 3 longitudinalibus, elevatis; basi obtusa, derasa: macula triangulari, parviuscula; apice acuta, mucrone tomentoso. Testa coriaceo-pergamena, intus glabra; unilocularis, trivalvis. Nucleus albus, longitudinaliter sed parce striatus, vestitus tunica tenera, brunnea; corculo in apice. Parenchyma cotyledo-

(*) Mémoir. de l'Acad. des scienc. 1768. p. 538.

doneum, firmum, album, lobatum: lobis inæqualibus, arcte conniventibus.

PROPR. Odor nullus; sapor debilis, vix dulcescens; masticatur perinde ut Castaneæ nuces.

VIRTUS: nutriendo, subtemulentans.

USUS: œconomicus.

OBS. 1. *Oleum expressum lutescens, recens mite, in frigore non cogitur, hinc facile rancefecit. Nucum harum tonna 1 vix ultra 4 olei congios dat.*

OBS. 2. Hisce nucibus Sues vulgo saginantur, valdeque pingvescunt; sed lardum mollius fit, & interclixandum haud parum liquefecit.

OBS. 3. *Cineres clavellati sunt sal alcalinum fixum vegetabile, in aëre humidiusculo deliquescens, pro diverso præparandi modo varium. Communiter in igne valido calcinatur cinis ligni Fagi, quoad in glebas concrescat. Si hæ glebæ contundantur, & in furno idoneo ad albedinem deruo calcinentur, obtinentur cineres clavellati idonei. Quoniam hi cineres clavellati cum calce viva sunt commixti, purum alcali non efficiunt, verum alcali fixum causticum, ex admixta calce. Hæc calx oritur ex ipsa parte terrestri ligni, quæ vehementia ignis in veram calcem abit. Si autem cinis ligni cum aqua maceretur, ut pars salina solvatur, hæc vero postmodo inspissetur, obtinetur alcali fixum purum, atque id non causticum. Uſus ciperum clavellatorum in confiendo sapone insignis est. Si cum acido Nitri saturetur, verum exsurgit Nitrum prismaticum.*

468. CORYLUS Avellana. LINN. *Sp. pl. 1417. Mat.*

m. 431. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Corylus sativa fructu rotundo maximo. DUCHAM. Arbr. 1. p. 188. t. 77.

Corylus. BLACKW. Herb. t. 293. DALECH. Hist. 319. Nux

Nux avellana f. *Corylus*. DOD. *Pempt.* 804.

Pharm. *CORYLI* Lignum.

Culinis AVELLANÆ Nuces.

Locus. Europa, in nemoribus asperis. *Arbor.*

FORMA. *Lignum* albidum, leve, molliusculum; post sectionem transversalem notatum centro medullari parviusculo. *Glomeres* nucum subrotundi, pedunculati, nudi. *Involucrum* sub-tetraphyllum, glomeri subjectum: foliolis subæqualibus, subcarnosis, planis, subrotundis, sub-dentatis, reflexo-patentibus, calycibus subjectis. *Nuces* plures in glomere sessiles, divaricatae, singulæ ad basin vestitæ *Perianthio* monophyllo, campanulato, carnosò-coriaceo, vix minutim villoso, bipartito: foliolis basi imbricatis, superne multifidis: laciñiis linearibus, inæqualibus, acutis, denticulatis, minutim ciliatis, erectis, longitudine vix nucis. *Nux* ovata, utrinque compressiuscula, glabra, spadicea, obsolete sulcata, basi notata macula ampla, plano-convexuscula, derasa, subquadrangulari; superne minutim tomentosa; apice obtusa, terminata hilo obtusiusculo, parvo. *Testa* ossea, subbivalvis, unilocularis, intus vestita tunica cinerea, adhærente. *Nucleus* ovalis, acutiusculus, albus, bipartibilis, obvelatus tunicis 2 vel 3, aridis, cinerascentibus, scabriusculis; quarum interior tenera, glabriuscula, nervis longitudinalibus, parallelis; exteriores crassiores, subspongiosæ.

PROPR. *Ligni:* *Odor* nullus, neque *sapor*.

Nuclei: *odor* nullus; *sapor* subdulcescens; *masticatus* nucleus firmiusculus, comminuitur, sалиva lactescente.

VIRTUS: *nuclei:* nutritiens.

USUS: culinaris.

OBS.

OBS. 1. *Lignum Coryli* dat *oleum* per *descensum*, *empyreumaticum*, *fætidum*. Si supra calcem vivam *rectificetur*, *limpidum* fit, *colore aureo*, & ut *bonum nervinum* commendatur in *morbis convulsivis*, *epilepsia*, *ecclampsia infantili*; ajunt, id etiam esse *bonum anthelminthicum*, verumque *oleum heraclinum*.

RULANDI.

OBS. 2. *Decoctum nucleorum*, *detractis pelliculis*, *leviter laetescens* est; *vitriolo martis* non *tingitur*, *verum coagulatur*. *Testarum decoctum rufescens*; *vitriolo martis* *fuscescit*. *Decoctum ex pelliculis nucleorum lutescens*, *sapore debili*; *vitriolo martis* *fuscescit*. *Nuclei oleum* dant *expressum*, *mite*, *velut Amygdalæ dulces*, *larga copia*, *ferè ad dimidium ponderis nucleorum*, *amygdalino vix inferius*. *Cum aqua confusi*, *in emulsionem abeunt*.

OBS. 3. *Nuclei Avellanæ communiter crudi esitantur*, *uti Amygdalæ*, *sed detrahi debent pelliculæ obvelantes*, *utpote nimium siccantes & restringentes*, *unde stricatura faucium*, *pectorisque angustia cum tussicula efficitur*.

OBS. 4. Si *Foliorum Coryli* recentium, *media æstate collectorum*, *major quantitas* in *cacabo*, *cum affusa aqua*, *coquatur*, *quoad aqua fere omnis evaporaverit*, *residua massa*, *expressa*, *liquorem s. succum* dat *fuscam*, *odore rancido*, *subempyreumatico*, *sapore falso*, *graviusculo*; *qui*, *illinitus leatis aliisque mobilibus*, *cimicibus infectis*, *pellit quidem cimices*, *uti saepius vidi*, *sed tamen saepe fit*, *ut postmodum redeant*.

469. LIQUIDAMBAR *Styraciflua*. LINN. Sp. pl.

1418. Mat. m. 432.

Liquidambar arbor s. *Styraciflua aceris folio*. PLUK. *Almag.* 224. t. 42. f. 6. CATESB. *Carol.* 2. p. 65. t. 65.

Li-

Liquidambar. BLACKW. *Herb.* t. 485.

Pharm. *STORAX LIQUIDA.*

Locus. Virginia. *Arbor.*

FORMA. *Resina* griseo-brunnea, fuscescens, homogenea, consistentia ungventi, plastica, tenaciuscula, rigidiuscula, opaca, lucida, pinguiuscula. *Purior* Storax liquida in officinis Lubinde occurrit, facie Terebinthinæ, consistentia mellis, subdiaphana, tenax, lutea, odore validiore.

PROPR. *Odor* fragrans, in Storacem Calamitam incidens; *sapor* unctuosus, acriusculus, *odori* congruens. *Accensa* flagrat: *flamma* vivida, fumo spisso, valde fuliginoso, *odore* grato, balsamico, remanente carbone tenui, atro, parum inquinante.

VIRTUS: vulneraria.

USUS.

OBS. 1. De vera origine Storacis liquidæ nondum inter Auctores convenit; plurimi illam artis produetum credunt.

OBS. 2. Ad præparationem Ceræ sigillatoriæ Storax liquida etiam adhibetur.

ORDO MONADELPHIA.

470. PINUS Balsamea. LINN. *Sp. pl.* 1421.

Abies minor pectinatis foliis virginiana, conis parvis subrotundis. PLUK. *Alm.* 2. t. 121.

f. 1. DUHAM. *Arbr.* 1. p. 3. t. 3.

Pharm. *BALSAMUM CANADENSE.*

Locus. Canada. *Arbor.*

FOR-

FORMA. Resina liquida, pellucidissima, albida, ætate lutescens, tenacissima, in fila ductilis, rigidiuscula.

PROPR. Odor balsamicus, gratus, ad balsamum Meccæ accedens; sapor imitis, vix amari- cans. Masticatum non solvitur, dentibus, labiis & saepe palato adglutinatur.

VIRTUS: vulneraria, diuretica: urina odo- ris violacei.

USUS. Vulnera.

OBS. 1. Hæc species Terebinthinæ omnium nobilissima & præstantissima est, pariter ac amoenissima odo- re & colore. Hanc in bonitate proxime sequitur Terebinthina cypria, deinde T. argentoratensis, tum T. veneta; sed deterrima est T. communis. Hæc omnes Terebinthinæ species in eo convenient, quod, destilla- tione cum aqua, oleum stillatitium dant, liquidum, limpidum, colore aqueo, odore fragrante, quo oleo spoliatae concrescunt in colophonium solidum, siccum, friabile, fragile: fragmentis lucidis. Oleum eorum etiam haberi potest, si in aqua coquuntur; sic Terebinthina cocta species est Colophonii. Porro conveniunt diætae species in eo, quod, deglutitæ, urinam imbuunt violaceo odore. In aquam calidam immisæ, non liquescunt, sed paullum subsidunt, & adglutinan- tur digito immisso. Solvuntur perfecte in spiritu vini. Si cum vitello ovi teruntur, cum aqua miscentur: mix- tura laetescente. Cunctæ species e truncis arborum sauciatis sponte distillant.

OBS. 2. Antiquiorum medicorum plerique Terebin- thinas aliaque balsama resinosa, ad ulcera interna, uti specifica, commendant, decepti ab analogia. Verum si res juste pensaretur, adeo non juvant, ut potius plus danini dent; etenim movent sanguinem, augent fe- brem symptomaticam, promovent contabescientiam at- que

que sudores colliquativos. Cum ulceris quoddam eacum in aliquo viscere se manifestat, nonnisi talia indicantur, quæ humoribus emendandis & corrigendis conducant.

471. PINUS Picea. LINN. Sp. pl. 1420.

Abies taxi folio, fructu tursum spectante. DUHAM. Arbr. 1. p. 3. t. 1.

Abies. CAMER. Epitom. 48.

Picea. DALECH. Hist. 50.

Pharm. TEREBINTHINA ARGENTORATENSIS.

Locus. Alpes Europæ australis, Helvetiæ.
Arbor.

FORMA. Resina liquida, diaphana, minus tenax, colore obscure lutescente, emanans ex venis propriis, in cortice sparsis & dilaceratis, trajectione per colum probe depurgata.

PROPR. Odor fragrans, in corticem Citri obscure incidens; sapor inter omnes Terebinthinae species maxime amaricans, non tamen acris.

VIRTUS: ut in præcedente.

USUS: ut in præcedente.

OBS. Oleum Terebinthinae, ab exteris ad nos alatum, communiter ex Tereb. argentoratensi destillatur. Ex Terebinth. libr. 4 obtinetur olei still. libra 1. DUHAMEL.

472. PINUS Larix. LINN. Sp. pl. 1420. Mat. m. 437.

Larix folio deciduo conifera. DUHAM. Arbr.

1. p. 332. t. 131. BAUH. Hist. 1. p. 265.

Larix. CLUS. Exotic. 196. DALECH. Histor. 55.

BLACKW. Herb. t. 477. CAMER. Epit. 45. 46.

Pharm. TEREBINTHINA VENETA.

Lo-

Locus. Alpes Europæ australis, Sibiria. *Arbor.*

FORMA. *Resina* liquida, diaphana, consistentia mellis vel syrapi spissioris, colore aquo vel pallide lutescente, pro diversa ætate, in fia ductilis, tenax.

PROPR. *Odor* debilius fragrans; *sapor* amarus, taucibus inhærens, resinosus, subpinguisculus, acriusculus.

VIRTUS: ut in antecedentibus.

USUS: ut in antecedentibus.

OBS. Ex ipso ligno fauciato stillat hæc Terebinthina, quod, quantopere lignum sit resinosum, affatim arguit.

473. PINUS sylvestris. LINN. Sp. pl. 1418. Mat. m.

434. DOD. Pempt. 848. BLACKW. Herb. t. 190.

Pinus sylvestris montana. DUHAM. Arbr. 2.
p. 125. t. 31.

Pharm. PINI Liber, Turiones, Resina communis, alba, Pix liquida, atra, Terebinthina communis, Colophonium.

Locus. Europa, America septentrionalis, in sylvis glareosis, Japonia. *Arbor.*

FORMA. Liber membranaceus, albus, diaphanus, pulposus, succosus, atomis punctatus, in truncō arboris, tempore vernali, mediante circiter mense Majo, delitescens sub cortice, alburno adhærens, & ope fili ex orichalco, cortice prius detracto, ab arbore separandus. *Turiones*, s. ramulorum rudimenta, terminales, puræ aggregati, ferruginei, cylindrici, acuti, latitudine pollicis vel ultra, undique imbricati: squamis angustis, linearibus, acutis, albido-membranaceis, subdiaphanis, dorso viridulis, adpresso, margine ciliato-laceris; undique (excepto apice) contaminati Resina tenui, in frigore so-

lidiuſcula, in calore molli, digitis se adglutinante; parenzymate viridi, molliuſculo, ſieciuſculo.

PROPR. Libri: Odor debilis; sapor dulcescenti-resinosus, subamaricans; masticatus succus, exrahitur succus, restat pars membranacea, exſpuenda. Turionum rec: Odor fragrans, resinosus, graviuſculus; sapor non ingratus, debilius resinosus, amaricans; masticati ſubpulposi, medullaris pars mollior, comminuitur, ſubſolvitur; corticalis pars tenax, vix comminuitur. Apud nos mense Februarii vel Martii colliguntur.

VIRTUS: Libri: diuretica, sublaxans, antiscorbutica, anthelminthica. Turionum: antiscorbutica.

USUS. Lumbrici, Scorbutoſ.

OBS 1. Infuſum aquoſum Turionum limpidum, ſubcitrinum, odore fragrante, ſatis grato, ſapore turionum; vitriolo martis dilutius fuſceſcit. Turones Pi- ni, ut antiscorbutici, frequentiſſime apud nos in uſum vocantur, tempore vernali dum recentes obtineri poſſunt, ſub forma decocti, aliis antiscorbuticis maritati. Revera boni ſunt, dum recentes habentur; ſiccata ve-ro minus idonei.

OBS. 2. Si truncus arboris, tempore aestivali, uſque in ipſam ligneam ſubſtantiam fauciatur, ſponte diſtillat ſuccus resinosus, qui, ubi ſuppositis idoneis vaſis excipitur atque fervatur, ſponte ſpiffefcit in faciem butyraceam, & Terebinthina communis vocatur. Sub hieme proxima ſuccus resinosus ſupra vulnus trunni rigefcit, cruftamque albam, ceræ haud abſimilem, for-mat, quæ iſtrumento idoneo separatur, & Resina Pi-ni nativa vocari potest. Dum hæc resina funditur & a ſordibus liberatur, Resinæ communis nomine ve-nit. Si resina Pi-ni liquida & nativa commiſcentur, & in ahenis cupreis abſque aqua modice coquuntur, de-bitis ebullicationibus, ac poſtea colantur, quod per Stra-turam

turam e stramine fecalino vel triticeo communiter fit, atque deinde siccatur, *Colophonium vulgare* emergit, quod minus putum est. Sed si sub dicta decoctione aqua frigida successive addatur, usquedum resina colorē mutaverit faciemque ceræ flavæ assimiliterit, & tandem bene coletur, obtinebitur *Resina alba*.

OBS. 3. *Terebinthina communis* massa est resinosa, opaca, butyracea, mollis, pallida, cinerascenti-subcitrina, quasi unguentum liquidius, odore validiore ligni Pini resina abundantis, s. tædæ; sapore pinguisculo, resinoso, subamaricante, odori congruente.

OBS. 4. *Resina communis* solida, rubicunda, nitidusculta, facie Quartzi, fragilis: fracturis planis; digitis se adglutinans, odore tædæ Pini.

OBS. 5. *Resina alba* solida, in frustis majoribus, citrino-rubescens, subopaca, nitida, facie vitri, fragilis: fracturis planis, nitidis; minus friabilis, manibus calidis adhærens; odore Terebinthinæ, sed debiliore; sapore nullo.

OBS. 6. *Colophonium* est Resina solida in frustis majoribus, fusco-rubescens, subdiaphana, nitida, facie vitri obscuri, fragilis: fracturis planis, nitidis; subfriabilis: granulis quasi deauratis, micantibus; pulverata abit in pulverem luteofacentem. Odor Pini, sed debilior; sapor nullus.

OBS. 7. *Pix liquida* est resina liquida, spissascuta, consistentia syrapi vel mellis recentis; nigro-rubicunda, tenaciscuta, subdiaphana, in filum subduetilis, inquinans, superficie lucidusculta; destillatione per descentum elicita ex tæda Pini, constans resina Pini, in succo arboris Pini soluta, fuligineque tintæ. Odor balsamico-fumosus; sapor tædæ, pinguisculosus. In oleo olivarum subsidit, sed aquæ frigidæ instillata, inox natat; guttulæ vero conquassatae subsidunt. In ignis calore fluidior evadit satisque tenuis, ebullit; admota

flamma subito accenditur, odore tædæ, flagrat: flamma vividissima, fumante, fuliginosa, alta, bullulis pluribus ignitis lucidissimis e fundo vasis in flamمام per vices assurgentibus, pulchro spectaculo; remanente carbone sicco, tenuiusculo, vasi adpresso, rugoso, atro, lucidiusculo, vix inquinante. In solis calore sensim exsiccatur pix liquida in crustam nigram, subsplendentem. Pix liquida, guttatum ad guttas nonnullas aquæ frigidæ instillata, partim natat, partim fundum perit; guttæ, quæ innatant, explanantur, margine undique decolorantur, albidae & pingves apparent. In oleo expresso solvitur hæcce pix: solutione fusco - rubicunda. Pix liquida per descensum a rusticis in Ostrobotnia pluribusque Sveciæ provinciis destillatur. Faciunt in terra fossam, in formam coni inversi, quam, post collocatam in imo fundo tonnam, arête implent tæda & vulgari ligno Pini semisiccato, situ perpendiculari, continua progressionē serieque, strue demum ad apicem obtuso - convexiuscula, & terra cæspitibusque circum circa probe recta. Hanc struem ad basin accendant, superponentes deinde cæspitem, ut igne suppresso comburatur, cavendo ne flamma uspiam fortius erumpat. Sic distillat pix liquida in suppositam tonnam. Principio stillat aqua, quam insequitur pix primaria, crassa, granulata, albicans; hanc postea excipit pix liquida vulgaris, atque totus hic processus integrum fere septimanam requirit, antequam absolvatur. Ex ligni orygia i picis liquidæ tonnas binas, per medium, accipiunt. Probatur bona pix liquida, mixtione cum saliva vel aqua pura; si colorem prodit rufo - rosaceum, bona est; si vero lactescit vel exalbida evadit, deterior censetur. Modum, quo pix in Ostrobotnia destillari solet, bene exposuit cl. E. JUVELIUS (*). At methodum

(*) *Diss. de Arte picem destillandi in Ostrobotnia, Præf. ill.*
C. F. MENNANDER. Aboæ 1747.

dum præstantiorem, in exstructo nimirum idoneo furno, picem destillandi tradidit L. Bar. A. FUNCK (*). Ill. DUHAMEL (** modum, in Europa australi usitatum, picem liquidam pariter in furnis parandi communicavit. De cetero etiam J C. AXTIUS (***) de pice conficienda scripsit. *Aqua picis* est infusum aquosum frigidum picis liquidæ, de qua bene differuit G. BERKELEY (†). Ejus methodus aquam picis præparandi hæc est: sumatur aquæ frig. corg. i., qui sextario picis liquidæ affundatur, agitando ope spathulæ ligneæ per 3 vel 4 minuta temporis; post quieti tradatur vas per 48 horas, ut omnis pix subsidat; quo facto, effundatur aqua limpida, & servetur usui. Laudat hanc aquam, ut præstabile saponaceum; antiputredinosum, utile in variolis, asthmate, scorbuto, pluribusque morbis. Hæc aqua picis, methodo Berkeleyana parata, limpida est, colore citrino, odore picis liquidæ, sapore acido, subacriusculo, piceo. Mihi sub præparatione superficies aquæ tota tenui tegmine oleoso induita erat, quod, ubi aqua agitabatur, ex rubro & cœruleo variegatum evadebat; ipsa pix liquida, ab aqua exempta, nigra amplius non erat, sed rubicunda. Cum oleo Tartari p. d. vix effervescebat hæc aqua picis, sed color intensior fiebat. Acetum Lithargyrii affusum præcipitationem subito fecit: coagulo albo, caseoso; unde patet, acidum picis majorem habere affinitatem cum plumbo, quam habet acetum vini, & cum plumbo sal formare imperfectum, in aqua non solubile. Hanc aquam picis in

B b b 3

præ-

(*) *Beskrifning om Tjåru-och Kol-ugnars inrättande.* Stockholm 1748.

(**) *Traité des arbres, tom. 2. p. 154 r. i. c. figura furni.*

(***) *De Arboribus coniferis & Pice conficienda &c.* Jenæ 1679.

(†) *Siris: a chain of philosophical reflexions and inquiries concerning the virtues of Tar-water &c.* London 1744.

præparatione ad variolas frequenter adhibemus, propinata libra & vel 1, omni mane.

OBS. 8. *Pix atra* sit, cum pix liquida in aheno obverse conico, calore moderato, per nycthemeron coquitur, ad consumtionem tertiae partis, subsequentे refrigeratione. Signum coctionis sufficientis est, quod pix refrigeratione solidescit, & masticata dentibus non adhæret. Hæc atra pix est resina solida in massa grandi, atra, lucida, homogenea, facie vitri nigri, in frigore fragilis: fracturis planiusculis, nitidis; in calore leni molliuscula, flexilis, digitis tenaciter adhærens, extensibilis, in filum ductilis. *Odor* in tēdam incidens; *sapor* debilissimus, vix ullus,

474. PINUS Abies. LINN. *Sp. pl.* 1421. *Mat. m.* 436.

OED. *Icon.* t. 193. GUNN. *Flor. norv.* 24.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum intecto. DUHAM. *Arbr.* 1. p. 3. t. 2.

Abies. DALECH. *Hist.* 54. DOD. *Pempt.* 854.

Pharm. ABIETIS Summitates, Resina, Pix bur-

gundica.

Locus. Europa, America septentrionalis, in sylvis acerosis. *Arbor.*

FORMA. Summitates s. Folia teneriora acerosa, sparsa, disticho-secunda, patentia, subsessilia, ungicularia, subulata, obtusiuscula, latere utrinque compressa, subcarinata, lineis & longitudinalibus, punctulatis.

PROPR. Summit. *Odor* balsamicus. *Sapor* ace-

scens, balsamicus.

VIRTUS: antiscorbutica.

USUS. Scorbatus.

OBS. 1. E truncō arboris inciso transudat succus resinosus, limpidissimus, tenax; qui brevi se in lacrymas efformat, supra vūlnus fixas, & siccatus colligitur sub nomine *Resinæ abietis*; quæ, si decoctione in aqua,

igne

igne moderato, funditur, & deinde per faceulos ex linteo densiore cum expressione colatur, ut a sordibus bene purgetur, *Pix burgundica* vocatur. Si vero resina hæc ad consumtionem aquæ, h. e. ad siccitatem, coquitur, addito, sub fine coctionis, aceto vini, obtinetur massa sicca, quæ *Colophonium* appellatur.

OBS. 2. *Resina abietis nativa*, qualis e trunko arboris hieme abraditur, albida est, mollis, pinguiscula, subdiaphana; estate siccatur & durior fit. *Odor* fragrans, ligni abietis; *sapor* amaricans, balsamicus, satis gratus. Digitis correctata pingvedine illos inficit. In vase ferreo supra ignem funditur, & admota flamma accenditur, flagratque exæte ut pix liquida, carbones vix relinquens.

OBS. 3. *Pix burgundica* resina est solida, in frustis majoribus, scilicet massa solida, sicca, opaca, superficie exteriore brunnea, nitidiuscula, fragilis: fracturis planiusculis, coloris lutescenti-brunnei, cinerascentis. Inter digitos tractata emollescit, & plastica fit. Odor resinae abietis, satis fragrans. In ignis flamma liquefit cum strepitu & subdestillat; liquefit etiam in vase ferreo super ignem, accensa flagrat: flamma vivida, fumante, fuliginosa, remanente carbone tenuiore, atro, parum inquinante.

OBS. 4. Oleum Terebinthinæ ex resina abietis obtineri non potest, uti ex speciebus aliis hujus generis. Obtinetur quidem oleum stillatum, si resina abietis cum aqua destillatur, sed oleo Terebinthinæ longe inferius, & easdem non habens dotes. Fallo tamen læpe pro oleo Terebinthinæ divenditur.

475. CUPRESSUS sempervirens. LINN. Sp. pl.

1422. Mat. m. 433.

Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas
Plinii, DUHAM. Arbr. 1. p. 198. t. 81.

Cupressus mas. BLACKW. *Herb.* t. 127. DALECH.

Hist. 58. CAMER. *Epit.* 52. DOD. *Pempt.* 844.
Pharm. *CUPRESSI* Lignum.

Locus. Creta. *Arbor excelsa.*

FORMA. Lignum subponderosum, cinereum,
fibris longitudinalibus.

PROPR. Odor debilis, vix ullus. *Sapor* am-
ericans.

VIRTUS:

USUS.

OBS. Cupressi in enormem altitudinem & molem
ex crescere possunt. Memorat ill. fœmina MARIA WORT-
LEY MONTAGUE (*) cupressum quandam excelsam &
patulam, prope Constantinopolim crescentem, qua lu-
dimagister quidam pro domicilio ordinario utebatur,
constituto sibi, in ipso fere cacumine, uno lecto pro
se, & paullo infra altero pro uxore binisque liberis.

476. CROTON Bentzoë. LINN. *Mant.* 2. p. 297.

Mat. m. 195.

Arbor Benzoinæ. GRIMM. in *Epb. N. C.* dec.
4. ann. 1. AR. SYLV. *descr. arb. Benzoës* in
VALENT. Ind. litter. p. 487.

Pharm. *BENZOES* Gummi.

Locus. India orientalis. *Arbor.*

FORMA. Gummi Resina in massa grandiori,
viridescens, ruficunda, marmorea: maculis glan-
dulisque albicantibus, undique nitidiuscula, fra-
gilis, friabilis.

PROPR. Odor fragrans, non ingratus, bal-
samicus; masticata inter dentes friabilis, commi-
nuitur in ore, non solubilis, sapore sub dulcescen-
te, resinoso, balsamico. Manibus tractata digi-
tis non adhæret. In vase ferreo super ignem fun-
di-

(*) *Lettres, écrites pendant ses voyages* Ec. tom. 2. p. 39.

ditur, spumescit, fumat: fumo balsamico, non ingrato. Ignis flammæ admota accenditur, flagrat: flamma vivida, fumante, fuliginosa, relictis carbonibus nigris, splendentibus, fragilibus, inquinantibus. Non solvitur perfecte in aqua pura, sed odorem balsamicum & saporem dulcem, balsamicum aquæ frigidæ communicat; quæ tinctura aquosa, lenissimo calore evaporata, *sal essentiale* dat. Si in aqua calida digeritur, sapore magis stimulante imbuitur tinctura, & refregerata sal essentiale mox deponit. Non in oleis expressis, neque stillatitiis, solvitur; nec hæc olea ullo modo tingit, quamvis digestioni subjiciatur. Solvitur vero in spiritu vini: tinctura luteo-rubicunda, quæ, aquæ frigidæ instillata, subito lactescit, & *Lac virginis* audit. Si cum aqua destillatur Benzoë, igne validiore, *aquam* dat *stillatitiam*, limpidam, odore debiliore Benzoës, sapore dulcescente, sale essentiali fœcundam, quod obtinetur, si hæc aqua in sole evaporatur. Per se vero & sine aqua destillata Benzoë funditur primum, & flores salinos in collum retortæ emittit, quos insequitur *oleum* tenuius, lutescens, levius empyreumaticum, quodque, rectificatum, Benzoës fragrantiam retinet; tandem adscendit oleum butyraceum, sale essentiali Benzoës abundans. *Oleum*, per *descensum* paratum, nigrum est, spissiusculum, odore ambrosiaco, sapore pingvi, empyreumatico, calidissimo, acri, diu inhærente, odori congruente. Benzoë cum aqua destillata nullum oleum essentiale dat.

VIRTUS: vulneraria, balsamica, cosmeticæ.
USUS: externus.

OBS. I. *Resina* Benzoës extrahitur cum spiritu vini. Ex Benzoës unc. 2 & spiritu vini rectific. unc. 16, per

3 dies digestis, lege artis accepi resinæ Benzoës puræ drachm. 14. Hæc resina fusco-nigricans erat, recens flexilis, siccata solidiuscula, fragilis; odore fragrante, balsamico; sapore debili, grato, subdulcescente, balsamico.

OBS. 2. *Sale essentiali*, quod vulgo *Flores* dicunt, abundat Benzoë, nam quævis uncia Benzoës contineat circiter drachm. 1 salis, quadruplici via separandi, scilicet sublimatione, destillatione, elixivatione, vel coctione cum aqua calcis. Si Benzoë, grossius pulverata, ollæ fictili immittitur, eique post imponitur alia olla fictilis, quæ ad juncturas priori bene adglutinatur, admodum deum igne, *sublimatur* hoc sal, & superiori ollæ adhæret. Ignis sub initio tam validus esse potest, ut Benzoë fundi occipiat; postea vero moderari debet ignis, ne Benzoë nimis decomponetur, unde flores oleo nimis contaminantur; qua de caussa expedit loco frigido isthanc operationem absolvere, ut in pavimento laboratorii, vel in aëre libero tempore autumnali. Quidam solent cucullum papyraceum loco ollæ superioris adhibere, sed imbibit cucullus iste oleum assurgens, unde sit, ut flores se non amplius ei affigant, eamque ob cauam novos subinde cucchios substituere oporteat. Si cucullus papyraceus, oleo assurgente imbutus, in aqua calida maceratur, sal Benzoës ex eo extrahitur. Inter sublimandum per cucullum, flores Benzoës saepius fædantur oleo luteo, quod simul adscendere soler, præcipue si unus idemque cucullus papyraceus diutius retineatur, & vero huic malo non alia medela, quam repetita sublimatione massam depurare, adjecta terra absorbente. Ex Benzoës libr. 1 sublimando obtinetur florum unc. 1, vel etiam plus, si enixo studio operatio instituatur. Hi flores *odore* sunt fragranti, in flores Philadelphi incidente, at longe fortiori; *sapore* vero acidulo, fere salis succini, acri, fauces lingvamque intensius pungente. Si præparatio rite processit,

for-

forma crystallina sunt, albissimi, leves, nitidiusculi, fragiles: crystallis subulatis, linearibus vel capillaribus. Si horum florū grana 6 in aquā bullient, une, i β immittuntur, solvuntur penitus: solutione acidiuscula, in lingua mordente; sed ut refrixit aqua, brevi iterum crystallisantur, saepe crystallis vegetantibus, Conservam ramosam referentibus; saepe etiam crystallis magnis, pennatis, Hypnum cristam castrensem mentientibus; insimul in superficie aquae sensim proveniunt aliae crystalli, linearisubulatae, substellatae. Aqua, crystallis per filtrationem liberata, limpidissima quidem mihi fuit, sed odore & sapore salis succini, quod indicio fuit, plus salis adhuc illi inesse. Itaque vaporare feci hanc aquam in solis calore, quo factō remansere salis Benzoës grana 2. Exinde sequi puto, aquae frigidæ unc. i β salis hujus grana 2 recte solvere, & soluta tenere posse. *Destillatione* per retortam, in quam Benzoë absque additione immittitur, sublimatur sal Benzoës destillatum, rubicundum, crystallis filiformibus s. capillaribus, subsplendentibus, odore & sapore salis succini. Hoc sal perquam sapit oleum Benzoës. Sed si hoc sal nova destillatione per retortam depuretur, obtinebitur sal Benzoës solidum, in frustis majoribus, compactum, facie salis ammoniaci, album, satis ponderosum, fragile: fracturis notatis striis parallelis, nitentibus, odore & sapore salis Benzoës sublimati. *Elixivatione* obtinui sal Benzoës, sequenti modo: sumsi Benzoës unc. β , quam bene trituravi c. aqua still. frigid. unc. 4, filtravi, filtratam vero cum aquae unc. i β denuo lavi, colaturasque commiscui, & per evaporationem in sole accepi grana 8 salis Benzoës, subplastici, coloris brunnei, crystallis subulatis. Sic inquinatum erat hoc sal gummosa parte Benzoës, & præterea in parca quantitate hac via elicium, quod aqua Benzoën non potuit penetrare. Methodum sal Benzoës parandi *cum cat-*

calce viva, docuit cl. C. W. SCHEELE (*). Sumit is calcis viv. unc. 4, quibus affundit aquæ puræ unc. 12; peræcta effervescentia iterum affundit aquæ libr. 8. Mox Benzoës libræ 1 sensim affundit hanc aquam calcis, sub strenua agitatione, atque postmodo mixturam hanc ebullire facit per semihoram, pariter sub assidua agitacione. Ab igne remoto vase, quietique reddito ad subsidendum, liquidum supernatans decantat. Residuo rursus affundit aquæ libr. 8, & postquam denuo per semihoram ebullire fecit, vas ab igne removet ad subsidendum, atque post decantat, ambasque decantationes miscet. Et vero pluries iterat hanc novam aquæ affusionem; ac ne quid salis in residuo remaneat, repetitis affusionibus aquæ calidæ bene illud lavat, aqua lavacri priori addita; tum hoc lixivium usque ad libr. 2 inspissat, & cum Acido salis postea præcipitat. Hac encheiresi terra calcarea, cum acido Benzoës saturata, ex affuso acido fortiori de novo saturatur, & deponit acidum Benzoës liberum, sub forma pulveris tenuissimi, qui, bene edulcoratus, inque aqua solutus & crystallisatus, abit in sal purissimum, albido-subcinerascens, undique splendens, leve, odore debili salis succini, sapore primum dulci, dein acri, lingvam, labia faucesque stimulando rodente, haud aliter ac sal sublimatum, postea calefaciente & leviter acidulo. Hac via obtinentur a Benzoës libr. 1 salis Benzoës drachmæ 12 vel 14. Cl. DON. MONRO (**) diversa salia alcalina cum floribus benzoës saturavit; illi cum alcali minerali ferbuerunt & dederunt sal medium: crystallis irregularibus, fatiscientibus, sapore acri; ex saturatione cum sale vol. salis ammoniaci emersit sal ammoniacale: crystallis tetragnonis; sub saturatione frigus artificiale generatum fuit, adeo ut mercurius grad. 6 descendenter. Omne sal Benzoës solvitur in aqua vel spiritu vini digestione.

OBS. 3.

(*) *K. Vetensk. Acad. handl.* 1775. p. 128. seq.(**) *Philos. transact.* vol. 57. p. 508. 509.

OBS. 3. Truncus arboris, superne ad ramos incisus, succum stillat lactescem, - tenuem, glutinosum & pellucidum, qui in ære sensim inspissatur & concrevit in Gummi-resinam. Ex qualibet arbore sexenni obtinentur circiter libræ 3 Benzoës. Arbores juniores plus resinæ dant, quam seniores; hinc cæduntur plerumque arbores, collecta resina; & plantantur tenellae earum loco. GRIMMIUS; SYLVIUS.

OBS. 4. Benzoës virtus medica nondum rite cognita est. Probabile est, resinam adeo salinam peculiares habere virtutes, modo recte explorata esset. *Lac virginis*, ut cosmeticum, subinde adhiberi solet.

OBS. 5. Auctoritate ill. v. LINNÉ nixus, arborem Benzoferam ad Crotonis genus refero. Dubium tamen movet AR. SYLVII descriptio fructus, qui tricoccus non est, verum drupa sicca, intra quam continetur Nux cinerea, nucleo albido-viridescente, saporis amari & ingratii.

477. CROTON Cascarilla. LINN. *Sp. pl.* 1424.

Mat. m. 470.

Ricinoides Elæagni folio. CATESB. *Carol. 2. p. 46. t. 46.*

Ricino affinis odorifera fruticosa major, Rosmarini folio, fructu tricocco albido. SLOAN.

Hist. 1. p. 133. t. 86. f. 1.

Pharm. CASCARILLÆ Cortex.

Locus. America: insulæ Bahamenses, Virginia.
Arbor.

FORMA. *sicc.* *Cortex* durus, cinerascenti-brunneus, lineæ vix crassitudine, subrugosus, lineis transversalibus sparsis, saepe lichenibus conspurcatus, sectus in segmenta bipollicaria, semi-convoluta; fragilis: fractura plana, fusca.

PROPR. *Odor* aromaticus, non ingratus; *sapor* aromaticus, amaricans; *masticatus* satis facile com-

communitur, sub masticatione sensim amarior: amaritie inhærente. Ignis flammæ admotus accenditur, flagrat flamina vivida, mox tamen ab igne remoto exstincta, fumat: fumo grato, in ambram incidente, temulentante.

VIRTUS: tonica, stomachica.

USUS. Diarrhoea, Laxitas intestinorum post dysenteriam.

OBS. 1. *Infusum aquosum rubicundum*, odore fragrante, sapore amaricante, odori congruente; virriolo martis fuscescit. Hujus infusi guttæ 50 colorem fusco-ferrugineum stiterunt. *Essentia spirituosa* per amara. *Extractum spirituolum magis amarum quam aquosum.* Cort. Cascarillæ unciæ 2. dant Extr. spirituosi drachm. 2 & Extr. aquosi drachm. 1 $\frac{1}{2}$; sed si cortex primum in aqua coquitur, obtinentur Extr. aquosi drachmæ 2, & residuum in spiritu vini digestum dat. Extr. spirit. drachm. 1 (*). Cl. SPIELMANN ex Cascarilla *olei* odorati unam trigesimal partem obtinuit.

OBS. 2. Circa finem seculi præteriti hic cortex Europæ innotuit, & prima fere ejus laus fuit, quod, tabaco immixtus, fumum magis swaveolentem reddebat. J. A. STISSERUS, J. L. APINUS, G. E. STAHLIUS, J. JUNCKERUS, pluresque alii vim ejus antifebrilem imprimis extulerunt. Ast fatendum, illum in ipsis febris parum facere, neque tertianis vernalibus certo mederi. Sed in hæmoptysi sæpe prodest. Ceterum stomachale remedium eximium est, diarrhoeas sistens & laxitati ventris post exanthatas dysenterias egregie subveniens.

478. CROTON tinctorium. LINN. Sp. pl. 1425.
Mat. m. 441.

Ri-

(*) Cfr. BROWN. *Philos. transact.* vol. 32. p. 87.

Ricinoides, ex qua paratur Tournesol Gallo-rum. *Hist. de l' Acad. des Sc.* 1712. p. 337. t. 17.

Heliotropium parvum Dioscoridis. LOB. *Hist.* 153.

Heliotropium minus. GESNER. *Icon.* p. 120. t. 4. f. 30.

Pharm. *LACMUS* Succus.

Locus. Europa australis. *Annum.*

FORMA. Massa sicca, terrea, saturate violacea, in frustulis pollicaribus. tetragonis; ponderosa, duriuscula, fragilis: fracturis planiusculis, minutim granulatis.

PROPR. Odor debilissimus; sapor vix ullus. Masticatus arenulosus, comminuitur: saliva violacea, postea acris sentitur in faucibus: acrimonia diutius inhærente, urente. Solvitur in aqua frigida & calida, solutione cœrulea, ab acidis rubescente, ab alcalinis vero non demutata.

VIRTUS: draftica, venenata.

USUS: tinctorius.

OBS. 1. Herba Crot. tintæ, sub florescentia in Gallia colligitur, contunditur, succusque exprimitur, qui intense viridis est. Cum hoc succo repetitis vicibus bene imbuuntur centunculi linteï vel lanei, postque in sole siccantur; quo facta, exponuntur vapore urinæ putridæ, vel acervi simi, dum violacei evaserint. Hos centunculos postinde emunt Hollandi, qui norunt colorem ex illis extrahere, unde massas istas violaceas componunt, quas Gallis totique Europæ vendunt sub nomine cœrulei hollandici; DE BEAUV AIS RASEAU (*).

OBS. 2. Acrimonia tanta in succo Laemus inest, ut, et si summa cum prudentia illum masticavi atque statim

(*) *L'Art de l'Indigoier*, p. 72.

tim exspui, ex eo quod neglexi fauces derepente elue-
re, brevi senserim ardorem urentem in faucibus, qui
sensim circa scrobiculum cordis descendit, cum quadam
vertiginis specie, nisique ad alvum deponendam. Tan-
dem etiam intestina occupavit hic ardor, cum molestia
quadam, nausea, & alvi purgatione.

OBS. 3. Usus hujus medicus nullus nobis adhuc con-
stitit.

479. CROTON Tiglium. LINN. Sp. pl. 1426.
Mat. m. 440.

Granum moluccum. RUMPH. Amboin. 4. p. 98.
t. 42.

Cadel-Avanacu. RHEED. Malab. 2. p. 61. t. 75.

Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro.

BURM. Zeyl. 200. t. 90.

Pharm. TILLI grana.

Locus. Zeylonica. Arbor.

FORMA. Nux, magnitudine vix nucis avel-
lanæ minoris, ovalis, hinc convexa, inde sub-
planiuscula, notata angulis 4 obsoletis, cinereo-fu-
sca, læviuscula, submaculato-nebulosa, utrinque
obtusa; *Nucleo* albido, pinguisculo, centro ca-
vo, septo bifido; obvelato membrana tenuissi-
ma, intra testam teneram, fragilem.

PROPR. Odor vix ullus; sapor acris, urens,
nauseosus; masticati nuclei comminuantur, acres,
urunt in faucibus: acrimonia inhærente, sæpe
inflammante.

VIRTUS: draistica, acerrima, venenata.

USUS.

OBS. Grana Tilli rarissime apud nos interne pro-
pinantur, quod nimis aeria sunt. Horum nucleorum
gran. 1, deglutitum, satis valide purgat; dosis major
purgat plerumque sursum & deorsum. Tota arbor,

mo-

monente RUMPHIO, acerrima est. Moluccenses hos nucleos magni faciunt, dum purgare volunt; sumunt nucem 1 pro dosi, robustiores vero 2. Nuces 4, collectim deglutitæ, enecant. Ceterum hisce nucibus recentibus pisces facile captantur. Nuclei *oleum expressum* dant, pariter acerrium, cuius gutta una vel altera, deglutita, purgat, quare etiam plerumque externe usurpatur, & umbilico illinitur, scopo purgandi. *Lignum arboris, Pavanæ dictum*, apud nos officiale non est. Commendatur in hydrope, utpote facultate purgandi & urinam pellendi instrutum.

480. CROTON lacciferum. LINN. *Sp. pl. 1426.*

Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirsutis, floribus spicatis, major. BURM. *Zeyl. p. 201. t. 91.*

*Yellenda-marauni. Philos. transact. v. 22. p. 157. **

Pharm. LACCÆ Gummi.

Locus. India orientalis, Bengala, Pegu. Arbor.

FORMA. Resina rubicunda, dura, fragiliuscula, subdiaphana, leviuscula, ramulis undique incrustata: crustis crassis, subcylindricis, rugosis, nodulosis, saepe lacrymis adnatis, diaphanis, rubris, nitidiusculis, scabridis; pollicaribus vel ultra, ramulo longitudinaliter perforatis; parenchymate celluloso: cellulis simplicibus, transversalibus, approximatis, refertis exuviiis infectorum, ut puppis exclusis, tela s. lana a larvis neta, & saepe stercore. Hinc G. Lacca in baculis est galla resinosa, sive nidus infecti cujusdam.

PROPR. Odor nullus; sapor nullus. *Masticata* resina inter dentes dura, friabilis, minime emollitur. Ignis flammæ admota emollitur, fun-

ditur, subdestillat, flagrat: flamma vivida, non fumante, nisi extincta, non fuliginosa, odore debili, satis grato. Ab igne remota brevi indurcit, fragilior tamen fit. Non solvitur in aqua, neque sub digestione; sed ex affusa aqua calida subito extrahitur e Lacca in baculis color, & fit *infusum* colore saturatissimo kermesino, nebulosum pulvere nigricante, subsidente. Hic pulvis, in aqua coctus, nihil coloris amplius largitur. Trinas successivas affusiones admittit Lacca in baculis contula, & singulis vicibus coloratur aqua, dilutiore quidem colore ex binis posterioribus. Sed coloris rubicundi pars aliqua adhuc remanet in resina, quod demonstratur ex Lacca tabulata, quæ semper rubicunda est, & ex Lacca granulata, quæ, cum aqua digesta, aquæ colorem rubellum communicat. Non solvitur G. Lacca in oleis expressis, digestione, nec color a Lacca in baculis ab oleo espresso extrahitur; sed oleum undique repletum deprehenditur nubecula, instar mucilaginis immixtae, quæ agitatione legunculae penitus disparet; neque magis solvitur in oleo stillatio, sed tingitur colore luteo. Ast in spiritu vini solvitur digestione: tinctura rubicunda.

VIRTUS:

USUS. Scelotyrbe.

OBS. I. Gummi Lacca, quæ, supra ramulos incrustata, e solo natali ad nos apportatur, G. Lacca *in baculis* vocatur; sed si e ramulis separetur & grossius contundatur, inque aqua calida digeratur, ut pars colorans, ab insectis superest, extrahatur, posteaque siccatur, G. Lacca *in granis* appellatur. Si vero ab aqua ante non eximatur, quam ebullitionem subiit, unde liqueficit & superficie aquæ innat, tumque excipiatur

tur, atque inter plana marinorea in tabulas tenuiores comprimatur, G. Lacca in *tabulis* audit. Usibus manuariis variis idonea est hæc resina. Pars colorans, ab acidis, præcipue solutione stanni, exaltata, colorem coccineum conciliat lanæ, parem propemodo illi quem efficit coccus caeti, paullo tamen minus vividum, at magis persistentem. Resina remanens ad ceram sigillatoriam præparandam idonea est, & præterea arti lacca incrustandi vernicibusque inservit.

OBS. 2. E Pegu & Martaban copiose in Sumatram exportatur G. Lacca, & quidem cum Pipere ibi commutatur.

481. RICINUS communis. LINN. *Sp. pl.* 1430.
Mat. med. 438. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 4.
MUNT. *Aardgew.* t. 351. DOD. *Pempt.* 363.
Palma Christi or Ricinus americanus commonly called the Castor plant. CANY. *monogr.* t. 1.

Nhambu guacu. PIS. *Braſil.* 91.

Ricinus americanus fructu racemoſo hispido. SLOAN. *Catal.* 38. *Hift.* 1. p. 126.

Cataputia major. BLACKW. *Herb.* t. 148.

Palma Christi. DU TERTRE *Antill.* vol. 2. p. 103. LABAT *Americ.* vol. 7. p. 78.

Ricinus americanus major, caule virescente. MERIAN. *Surin.* p. 30. t. 30.

The Negro Oil-bush, Palma Christi. HUGH. *Barbad.* p. 116.

Ricinus foliis peltatis inæqualiter serratis, capitulis hispidis. MILL. *Fig.* t. 219.

Cataputia major. LUDW. *Edtyp.* p. 4. t. 7.

Pharm. *RICINI VULGARIS Semina.*

PALMÆ Oleum liquidum.

Locus. India utraque. *Biennis.*

FORMA. *Nux* ovata, utrinque obtusa, magnitudine seminis Phaseoli saccharati, utrinque compressa, nitida, ex spadiceo & viridi variegato-marmorea, terminata hilo prominente, pallide lutescente, acutiusculo, latere utrinque excavato. *Nucleus* niveus, pinguisculus, centro cavo, obductus membrana alba, intra testam tenuem, fragilem.

PROPR. *Semin.* *Odor* nullus; *sapor* debilis, vix dulcescens, acriusculus; *masticata* semina tenera, facile comminuuntur & quasi solvuntur: *saliva* emulsiva; sed acrimonia rodens postea in faucibus sentitur & aliquantum inhæret. Si rancescunt semina, sapor eorum in saporem seminum Cannabis incidit.

VIRTUS: alterans, purgans, diuretica, dia-phoretica, anthelmintica.

USUS. Volvulus, Colica pictonum, Febres biliosæ, Gonorrhœa, Colica nephritica.

OBS. 1. *Oleum* Palmæ liquidum, recenter expressum, albidum est, spissusculum, mite, rancescens, in frigore non cogitur, nisi fortiori. Ætate magis spissusculum fit, consistentia mellis recentis, rubicundum, dia-phylum, odore nullo, sapore Cannabino. Accensum flagrat: flamma vivida, luminosa, vix fumante, non fuliginosa. Sem. Ricini unc. 14, expressione in prelo, leniter calefacto, dederunt olei expressi unc. 3.

OBS. 2. *Oleum* Palmæ liquidum, ut purgans tutum in doloribus ventris & affectionibus renum, impense laudatur a cl. TH. FRASER (*), qui svadet, ut detur cochl. 1, singulis horis, etiam infantibus, dosi videlicet convenienti. Cl. PETR. CANVANE singulari libel-

lo

(*) *Medical observations and inquiries*, vol. 2. p. 235.

Io (*) utilitatem hujus olei latius extendit. Docet is, oleum Palmæ bene convenire biliosis, illisque, qui febris acutis & inflammatoriis vexantur, sed nocere frigidis & phlegmaticis, spasmos inducendo. Hinc statuit, illud optimo jure *Antimonium vegetabile* dici posse. Dosis ipsi est ab unc. § ad 1 adultis, atque drachm. 1 vel 2 infantibus. Datur cum per se, tum in forma emulsionis. Sæpe alvum dicit, ventri illinitum. Ego oleum recenter expressum identidem exhibui. Agit illud tuto, & sæpe cochlear unicum propinatum purgat. In volvulo, calculo felleo, ubi vomititiones frequentes cum singultibus urgent, & ubi alia purgantia valida communiter fallunt ob vomitus insequentes, insigni cum emolumento oleum hocce dedi. Scilicet spasmī relaxati fuerunt, alvus soluta, vomititiones mitigatæ, singultus suspensi, & non solum levamen, sed & cura plenaria insecuta. Interdum olei cochlear unum haurire coactus fuit æger quovis bihorio, antequam effectum præstítit hocce pharmacon. In gratiam eorum, quibus oleum non arrisit, illud cum mucilagine G. Arabici vel vitell. ovi in emulsionem redegi.

OBS. 3. Jamaicenses communiter *oleum coctum* adhibent. Semina contrusa coquuntur in aqua, quoadusque omne oleum extractum est & aquæ innatat, quod demum colligunt. Coctione hac ita mitescit oleum, ut unciae 2-4 dari possint, sine metu nimiæ purgationis. PATR. BROWNE. Ex sem. Ricini libr. 10, contusis & coctis, olei libra 1 obtinetur; HUGHES.

OBS. 4. Semen unicum Ricini vulgaris, tempore vespertino, a viro sano & vegeto masticatum & deglutitum, sapore fuit amygdalarum, sed sensationem mordentem in fauçibus reliquit. Per totam noctem tran-

C e c 3

quil-

(*) *Dissertat. on the Oleum Palmæ Christi s. oleum Ricini, or, as it is commonly called, Castor-oil &c.* Lond. 1769.

quille dormivit hic vir; sed sequenti die mane exper-
gefæctus, emesi violenta correptus fuit, atque per to-
tam diem sustinuit nisus alternantes vomituritionis &
purgationis alvi, tametsi parum dejiciebat. Eadem vi-
ce nobilis matrona teneræ constitutionis, semen unicum
pariter comedit, sed prius testam membranamque ob-
velantem sedulo separavit abjecitque; & nullam noxam
inde sensit. Itaque inconsultum semina hæc in substan-
tia sumere, maxime si non sint decorticata; oleum ve-
ro longe mitius agit.

482. JATROPHA Curcas. LINN. *Sp. pl.* 1429.
Mat. m. 439.

Mundubignacu. MARCGR. *Braſil.* 97.

Munduy-Gvacu. PIS. *Braſil.* 83.

Jatropha allurgens, ficus folio, flore herbaceo.

BROWN. *Jam.* 348.

Physic-nut-tree, Ricinoides. HUGH. *Barbad.* 115.

Ricinoides Gossypii folio. BARRERE *Æquin.*
100. *

Pharm. *RICINI MAJORIS Semina.*

Locus. America calidior. *Arbuscula.*

FORMA. *Nux* ovata, magnitudine Fabæ mi-
noris, longitudine 8 linearum, nigricans, hinc
plana, inde convexiuscula. *Nucleus* albus, amyg-
dalinus, bipartibilis, *plumula* alba, foliacea; ob-
velatus membrana tenui, intra *testam* tenuem,
fragilem, duriusculam.

PROPR. Odor nullus; sapor gratus, amygdalinus, subdulcescens, tum acriusculus; *masticata*
tenera, comminuuntur, quasi solvuntur: saliva
emulsiva; postea mordent in faucibus.

VIRTUS: ut in præcedente.

USUS.

OBS. I.

OBS. 1. Semina *oleum* dant *expressum*, dosi cochlearis i purgans in hydrope. A MONARDE (*) vocatur *Oleum Cicinum*, & ab illo multum laudatur, ut purgans validum in omnibus hydropsis speciebus, iliacæ passione, arthritide, psora, ulceribusque manantibus. Purgandi vim exserit, sive deglutiat, sive in anum injiciatur, sive denique ventri illiniatur.

OBS. 2. Plurimi statuunt, semina hæc, perinde ac semina Ricini, nonnisi cum tunicis & plumula seminis purgare. Cl. BANCROFT (**), in hujus rei veritatem inquiren, proprio in corpore periculum fecit, & deprehendit, semina innoxie edi posse, absque metu purgationis, si plumula dissepimentumque antea probe fuerint exuta.

OBS. 3. Quandoquidem semina hæc in nostris officinis semper raneida sunt & effæta, nunquam in usu sunt. Si valebunt, recentia ea esse oportebit. Paullo fortiora sunt illis, quæ proxime supra recensuimus, æque tamen tuta. In America maxime increbuerunt.

ORDO SYNGENESIA.

483. MOMORDICA Elaterium. LINN. *Sp. pl.*
1434. Mat. m. 447. KNIPH. *Bot. or. cent.* 8.

Cucumis asininus. BLACKW. *Herb.* t. 198.

Cucumis sylvestris. CAMER. *Epit.* 946. DOD.
Pempt. 652.

Cucumis Elaterii sylvestris. LOB. *Hist.* 368.
Pharm. *ELATERIUM ALBUM*, *NIGRUM*.

Locus. Europa australis. *Annua*.

FORMA. albi: *Massa* terrea in frustis planis,
erassitudine linearum circiter 2, cinerea, levius-

C c c 4

scu-

(*) CLUSII *Exotic.* t. p. 299.

(**) *Naturgeschichte von Guiana*, p. 20.

scula, sicca, fragilis, friabilis. *Nigri*: massa sica, viridescenti-nigra, subsplendens, in frustulis inæqualibus, fragilis; fracturis planitisculis.

PROPR. *Albi*: *Odor* nullus; *sapor* vix americans; acris; *masticatum* solvit in ore, & mordet in lingua faucibusque. Solvitur digestione in aqua & spiritu vini imperfecte; sub digestione fatiscit in pulverem, qui in fundo vasis jacet; sed tingit menstrua colore lutescente, saporemque eis conciliat. Candelæ flammæ admotum subito accenditur, non emollitur, nec destillat; flagrat: flamma vivida, lucida. *Nigri*: *odor* nullus; *sapor* acris, debilior quam albi, sub-salsus; *masticatum* tenaciuscum, ægre comminuitur, adglutinatur dentibus, solvitur: saliva brunnea; mordet postea in fauçibus. Solvitur cito in aqua, sub digestione plenarie, pariter ac in spiritu vini: solutione rubicunda. Candelæ flammæ admotum non accenditur, sed ignitur, & fremit tamquam Nitrum. Hinc Elaterium album magis resinosum; nigrum vero magis gummosum & salinum est.

VIRTUS: purgans, draistica, hydragoga, emetica, abortiens, errhina.

USUS. Hydrops.

OBS. 1. Elaterium *album* paratur e succo laetescente pomi Momordicæ Elaterii submaturi, absque omni expressione emanante e pomo minutim resesto; qui, vase exceptus & quieti redditus, sponte ad fundum vasis dejicit fæculas subsidentes. Postea decantatur liquidum supernatans, & fæculæ exsiccantur calore solis. Si poma relinquuntur, quoad rite maturuerunt, diffiliunt sponte dum tanguntur, seminaque circum circa dispergunt. *Nigrum* Elaterium paratur e succo pomi expresso, cuius fæculæ subsidentes exsiccantur.

OBS. 2.

OBS. 2. Elaterium album heroicum est purgans hydragogum in hydrope, ab antiquis temporibus usitatum, post quidem obliteratum, sed nunc demum in frequentem usum redactum. Fortissimum est purgans hydragogum; purgat violentissime, saepe cum torminibus, & dejectiones squosas inducit. Hinc communiter a medicis usurpatum, ad aquas hydropicorum per alvum educendas. Ut plurimum emesin juxta moveret. A minima dosi semper incipiendum, sc. a quadrante grani vel a grano dimidio. Sunt tamen qui gr. I bene ferunt. Gravidis non propinandum, quia abortum saepius efficit. Nec in hydrope exhibendum, cum pullus durus est, visceraque obstructa. Si cum aqua teritur, naribusque intruditur, turunda exceptum, satis validum est errhinum.

OBS. 3. Pomum Momordicæ Elaterii exsiccatum, tum pulveratum & propinatum, bonum esse hydragogum, observavit BOULDUC (*).

484. CUCURBITA Pepo. LINN. Sp. pl. 1435. SCOPOL. Ann. 2. p. 97. *

Pepo oblongus vulgatissimus. LOBEL. Hist. 365.
Cucurbita indica rotunda. DALECH. Hist. 616.
Pepo oblongus & rotundus. DOD. Pempt. 654.
^{655.}

Culinis: PEPONIS Fructus.

Locus. Colitur in hortis. Annua.

FORMA. rec. *Pomum* pedunculatum: pedunculo turbinato, angulato, scabriuscule; magnitudine capitis humani vel supra, subrotundum vel ovali-oblongum, apice obtuso-rotundatum, depresso, subsulcatum, instructum umbilici loco cicatrice orbiculata, sicca, brunnea; inferne abrupte angustatum, basi plicatum: plicis validis,

Ccc 5

dis,

(*). Hist. de l'Acad. des Sc. 1719. p. 46.

dis, convexis; undique lāeve, colore dilute cītrino s. stramineo, nitidiusculum, fulcis longitudinalibus, obsoletis, distantibus. *Parencyma carnosō - succosum*: carne ex atomis vesiculosis conflata; crassitie pollicari, albido-lutescens, centro cavo, amplissimo; sexloculare: columnis 3, carnosō-pulposis, distantibus, parieti parencymatis adnatis, lamellis parallelis remotiusculis; singula columna biloculari. *Semina* plurima, albida, in pulpa nidulantia, obovalia, utrinque compressa, undique cincta margine incrassato.

PROPR. crudi pomi: *Odor* vix ullus; *sapor* debilis, subdulcescens, in Melonis saporem obscurē incidunt; *masticatum carnosum*, minus succosū, comminuitur, inter dentes substridulum. *Coctum* consistentia pultis, sapidum satis, præcipue cum lacte præparatum.

VIRTUS: nutriendis.

USUS: culinaris.

OBS. 1. Semina plurimum *olei expressi* dant, mixta & optimæ notæ, subrubelli. Ex femin. libra 1 obtinetur *olei expr.* libra 3. SCOPOLI.

OBS. 2. Fruktus matus in culinis temperatis pro ea apparatur. Coquitur in pultem cum laete, & satis sapidus fit. Nutrit principio dulci, bonosque generat humores.

485. CUCURBITA lagenaria. LINN. *Sp. pl.* 1434.

Mat. m. 442. RUMPH. *Amb.* 5. p. 397. t. 144.

MORIS. *Hist.* 2. p. 23. s. 1. t. 5. f. 3. LOS.

Hist. 366.

Pharm. CUCURBITÆ Semina.

Locus. America. *Annua.*

FORMA. Semina cinerea, minutim rugosa, linearia, vix pollicaria, utrinque plana, bisulcata:

ta: fulcis apice conniventibus; utrinque obtusa, apice profunde retusa. *Parencyma* album, cotyledoneum, bipartibile, intra testam fragilem.

PROPR. Odor nullus; sapor pinguisculus, amygdalinus; masticata comminuuntur, saliva emulsiva.

VIRTUS: obtundens, temperans.

USUS. Febrium æstus.

OBS. Semina Peponis in locum Cucurbitæ bene surrogari possunt, utpote pari virtute prædita, ac præterea magis vulgaria.

486. CUCURBITA *Citrullus*. LINN. *Sp. pl.* 1435.

Mat. m. 443. *KNIPH.* *Bot. orig. cent.* 9.

Citrullus f. *Anguria*. *BLACKW.* *Herb.* t. 157.

Anguria indica. *RUMPH.* *Amb.* 5. p. 400. t. 146.

Citrullus officinarum. *LOB.* *Hist.* 364.

Anguria, *Cucumis Citrullus*. *DOD.* *Pempt.* 653.

Culinis CITRULLI Fructus.

Pharm. —— Semina.

Locus. Europa australis, Oriens, India. *Annua*.

FORMA. rec. *Pomum* subrotundum, magnitudine capitis humani, pedunculatum: pedunculo tereti; utrinque obtusum, macula orbiculata, rugosa, plana; undique lave, nitidiusculum, adspersum cicatricibus venosis, rugosum, attenuatis; undique viridescenti-marmoreum, pictum lineis fuscis, longitudinalibus, latioribus, subdentatis, remotiusculis. *Parencyma* incarnatum, centro solidum, carnoſo - succulentum, rigidiusculum, fragile: carne grossius vesiculosum, facie fere glaciei ubi luci exponitur; sexloculare. *Columella* carnoſa, parencymati simili, verum sapidiore. *Semina* plurima, pedicellata: pedicello carnoſo, molli; fusco-brunnea, lavia, nitida, ovata, obtusa, apice

pice summo decorticata, utrinque compresso-plana, in singulo loculo membrana tenui interstincta.

PROPR. Pomi crudi: Odor debilis; sapor dulcescens, subcucumerinus, frigidus; masticatum valde succosum, & inter dentes substridulum; masticatione & suctione extrahitur succus aqueus, refrigerans, remanent pelliculae molles. Seminum: odor nullus, sapor amygdalinus.

VIRTUS Pomi: nutriendis, refrigerans, humectans; seminum: emulsiva, temperans, obtundens.

USUS Pomi: culinaris; semin. Febrium aestus.

OBS. 1. Semina Citrulli æque omnino efficacia sunt, atque semina Cucurbitæ & Peponis.

OBS. 2. Fructus Citrulli bene maturus editur crudus, ut eximum humectans refrigeransque in calore aestivo. In regionibus calidis nullus gravior fructus, qui glaciei speciem refert, & succum aqueum, frigiduscum præbet.

487. CUCUMIS Colocynthis. LINN. Sp. pl. 1435.

Mat. m. 446. BLACKW. Herb. 441.

Colocynthis. CAMER. Epit. 982. DOD. Pempt. 654. LOB. Hist. 367.

Pharm. COLOCKNTHIDIS Pulpa, Semina.

Locus. Oriens, India. Perennis.

FORMA. sicc. Pomum decorticatum, subrotundum, magnitudine ovi gallinacei, siccum, albidum, leviusculum, constans ex substantia papyraceo-spongiosa, molli; sexloculare: loculis refertis seminibus numerosis, ovatis, obtusis, utrinque compressis, levibus, olivaceis, longitudo circiter 2 linearum; parenchymate albo, cotyledoneo.

PRO-

PROPR. pulpæ: Odor debilis, ingratus; sapor amarissimus, nauseosus, acriusculus. Seminum odor nullus; sapor amygdalinus, dulcescens, pinguiusculus.

VIRTUS pulpæ: purgans, draftica, abortiva, anthelminthica.

USUS.

OBS. 1. Decoctum Pulpæ aquosum rubicundum, amarissimum. Si ebullitio diutius protrahitur, ita gelatinosum fit, ut colum vix permeat; inspissatum abit in Extractum laudabile, mitius purgans, quam ipsa pulpa. Ex pulpæ Colocynthid. unc. 8 obtinuit cl. BOURDUC Extracti gummosi. unc. 3, & a pari quantitate pulpa, ope spirit. vini, extraxit Extr. resinosi unc. 3.

OBS. 2. Colocynthis, antiquissimum purgans, etiam a Patribus medicinæ adhibitum, nondum exolevit. Purgans tamen draisticum est, & magna cum circumspiciētia præscribendum. Etenim in fatis mediocri dosi vehementissimas dejectiones ſepe facit, cum torminibus, tenesmis, sangvinolentis evacuationibus, ægritudine summa. Tamen si pulpa Colocynthidis in substantia propinetur, redigenda erit in subtilissimum pollinem, adjectis absorbentibus, saccharo, vel gummi, ut in trochilos conformari queat. Dosis erit minuta, unum vel alterum granum. Resinosum extractum vix purgat, sed tormina tantum excitat. Itaque præstat ominino Extractum aquosum in eo, quod longe mitius agit, & dosi gran. 2-4-6 dari potest. Gravidis tamen, haemorrhagiis obnoxiis, dysentericis, calculosis, febricitantibus, hystericis, non tuto præscribitur. G. VAN SWIETEN () laudat Colocynthidem, ubi scopus est alterandi, si octava pars grani omni trihorio vel quadrihorio detur; tunc enim non purgat, sed in corporibus lan-*

(*) Comment. in BOERH. Aphor. T. 4. p. 443.

longividis & pituitosis, ut dicit, mira præstat, dum le-niori stimulo calorem & motum auget. Nob. N. DAL-BERG pari fere elogio tinturam Colocynthidis commen-dat (*), quam parat e pulpæ Colocynth. unc. i fl., sem. Anisi stellati drachm. i, & Spirit. vini gall. unciis 20. Hujus tinturæ guttas 15 propinat ter vel quater de die, augendo dosin gutta una, quavis vice, quoad alvus solvatur. Sic cephalalgias curat, dentiumque dolores.

OBS. 3. *Semina Colocynthidis* vere emulsiva sunt, ut semina congenerum. Quæ illis adhæret, amaritudo, neque a testa nec a nucleo proficiscitur, sed unice à pulpa emanat, qua extus obducta fuere, utope quæ amarissima, purgans & heroica est. Itaque si aqua te-pida bene & pluries lavantur, adeo non amara sentiuntur, ut potius sapida sint. Sic non purgant, verum obtundunt. Idecirco expedit separare semina a pulpa, quando extractum Colocynthidis parare lubet; nam o-leum expressum coctione extrahitur, & extractum mi-nus purum reddit.

OBS. 4. Cucumis Colocynthis copiose crevit in In-dia, ubi maxime luxuriat, caule diffuso, repente, ad ter-ram adpresso, in latum & longum se extende. Cl. EDV. IVES (**) ad Castellum St. David stirpem quan-dam observavit, 10 orgyiarii spatium occupantem.

488. CUCUMIS Melo. LINN. Sp. pl. 1436. Mat.

m. 444. KNIPH. Bot. orig. cent. 10.

Melo. BLACKW. Herb. t. 329. BAUH. Hist. 2.
p. 242.

Melo f. Melopepo vulgo, Cucumis Galeni.
DOD. Pempt. 652.

Melo vulgi f. Melopepo Dioscoridis. LOB. Hist.
364.

Cu-

(*) Cfr. cel. MURRAY Apparat. medicam. vol. i. p. 410.

(**) Reisen nach Indien und Persien, part. 2. p. 391.

Culinis MELONIS Fructus.

Pharm. ——— *Semina.*

Locus. Calmuckia. *Colitur ubique.* *Annuus.*

FORMA. *rec.* *Pomum brevius pedunculatum:* pedunculo tereti; ovale, magnitudine capitis infantilis, utrinque obtuso-rotundatum, apice macula orbiculata, sicca, umbilici loco; undique longitudinaliter sulcatum, albido-viridescens, cicatricibus elevatis reticulatum, vel læviusculum. *Parencyma carnoſo-fuccosum:* carne ex atomis vesiculofis composita; crassitie pollicari, centro cavo, amplissimo; sexloculare; columnis tribus carnoſo-fucculentis, parieti parencymatis adnatis, bilocularibus. *Semina plurima, pedicellata,* ovalia, acuta, utrinque compressa, glabra, albita, lævia, in pulpa mollissima & succosa nidulantia.

PROPR. *Pomi crudi:* *Odor* s vagueolens; *sapor* dulcescens, in cucumerinum levius incidens; *masticatum* comminuitur, solvitur.

VIRTUS: *Pomi:* nutriens, temperans; *semin.* emulsiva, temperans.

USUS: *Pomi:* culinaris.

OBS. 1. *Fruētus maturus editur crudus, tempore* aestivali, gratus cum odore, tum sapore. Difficilioris est digestionis illis, quibus stomachus langvet. Nutrit principio dulci, & insimul refrigerat. Postquam permaturuit fructus, farinosus sentitur, & insalubris tunc censeretur. Immaturus fructus conditur saccharo vel aceto, pro bellariis.

OBS. 2. *Semina incredibilem facultatem* habent retinendi vim germinandi; hinc quo antiquiora, eo præstantiora ab hortulanis judicantur. MART. TRIEWALD (*) docuit, semina Melonum, post 42 annorum decursum sata, progerminasse.

489.

(*) *Philos. transact. vol. 42. p. 115.*

489. CUCUMIS sativus. LINN. *Sp. pl.* 1437. *Mat.*
m. 445. BLACKW. *Herb.* t. 4.

Cucumis vulgaris. DOD. *Pempt.* 651.

Cucumis esculentus. LOB. *Hist.* 363.

Culinis CUCUMERIS Fructus immaturus.

Pharm. ——— Semina.

Locus. Colitur in hortis. *Annuus.*

FORMA: immaturi: *Pomum* viride, cylindrico-conicum, subincurvatum, subangulatum, longitudinaliter canaliculatum, echinatum, torulosum: torulis inæqualibus, subaculeatis; atomis albis adspersum, palmare vel ultra, basi læve, obscure viride. *Parencyma* carnoſo-fucculentum, albido-viridescens, post ſectionem transversalem distinctum centro maculato, subrotundo-trigo-no, e ſeminum rudimento orto: angulis truncatis; tandem in tria loculamenta excrescente; cincto annulo orbiculato e punctis in orbem dispositis; obducto disco carnoſo, punctis marginalibus discretis, distantibus. *Semina* (matura) ovato-oblonga, utrinque obtusa, compressa, circiter tres lineas longa, alba, lævia; *parencyma*-te cotyledoneo, albo, bipartibili.

PROPR. *Pomi* crudi & immaturi: *Odor* crudus, subfatuus; *sapor* odori congruens, crudus, fatuus, subdulcescens; *masticatum* pomum tenerius, succosum, comminuitur, inter dentes subſtridulum; *saliva* vix tincta. *Seminum* odor nulus; *sapor* amygdalinus, magis tamen pinguis; *masticatur* saliva emulsiva.

VIRTUS: *Pomi*: temperans. *Semin.* emulſiva, temperans.

USUS: *Pomi*: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquos. fructus limpidum, aqueum, odore cucumerino, sapore congruente, subdulcescente; vitriolo martis non demutatum.

OBS. 2.

OBS. 2. Cucumeres immaturi in culinis frequentissime adhibentur. Eduntur crudi, in taleolas resecti, addito oleo, aceto, sale, & pipere. Si succus exprimitur, indigesti evadunt & ruetos cucumeritos generant, quod haud sit a taleolis non expressis. Conduuntur sale sive aceto, atque per totam hiemem servantur; & vero signum rem bene cessisse est, si rigidi subfragilesque, non autem flaccidi, deprehendantur. Coquuntur in aqua, recentes seu conditi, vel soli cum buttero, vel addita carne. Recentes cocti tenerrimi sunt.

490. BRYONIA alba. LINN. Sp. pl. 1438. Mat. m. 448. KNIPH. Bot. orig. cent. 10. BLACKW. Herb. t. 37.

Vitis alba, baccis nigris. CAMER. Epit. 987. Bryonia aspera s. alba, baccis rubris. MILL. Fig. t. 71.

Bryonia alba & nigra. Dod. Pempt. 395. Pharm. BRYONIÆ Radix, Baccæ, Semina. Locus. Europa, ad sepes. Perennis.

FORMA. rec. Radix fusiformis, subpedalis, saepe ramosa, apice obtuso-rotundata, albido-lutescens, transversaliter rugosa: rugis obsoletis, subapproximatis, ceterum glabriuscula. Parenchyma album, carnosum, succosum, post sectionem transversalem æquale, undique punctatum: punctis subrotundis, serie radiali a centro ad peripheriam undique dispositis; serie autem annulari, solitaria, centrum medullare includente. Racemi baccarum axillares, penduli, nudi. Baccæ globosæ, magnitudine seminis Pisii, nigræ, glabræ, nitidiusculæ, apice instructæ puncto elevato, umbilici loco; parenchymate succoso, pentaspermo: succo viridi. Semina ovata, obtusa-

D d d

scula,

scula, utrinque compressa, fusca, nitidiuscula, minutim rugosa.

PROPR. rec. rad: Odor nauseosus; sapor nauseosus, odori congruens, acriusculus, substypticus. Radix recens lactescit; siccata vero recenti longe debilior. Baccar. odor nauseosus; sapor satuus.

VIRTUS: purgans, hydragoga, emmenago-
ga, diuretica; *recent. radic.* subemetica.

USUS. Hydrops, Asthma.

OBS. 1. *Infusum* aquosum radic. rec. colore aqueo, sublutescente, odore nauseoso, sapore substyptico, amaricante; vitriolo martis color nil variat; quiete & mora multum caseosi albi præcipitat.

OBS. 2. Radicis rec. Bryoniæ contus. unc. 1, in vini albi generosi libris 2, maceratione per horas 24, extracta, valida fit medicina in hydrope. Taleolæ recentes radicis subcontusæ, & cruribus hydropicorum impositæ, stillicidium seri allicitunt, ut observavit cel. Tissot (*). Si radix sub terra, tempore vernali, transversaliter secatur & excavatur, frustulumque resectum operculi instar cavo imponitur, repletur cavum illud, nycthemeri spatio, succo laetescente, diuretico, cochlearibus propinando.

OBS. 3. Recens radix, perinde ut Solanum tuberosum tractata, *amyllum* dat album, friabile; quod, in sole siccatum, & per nonnullas septimanas servatum, gustavi, & non acre deprehendi. Hujus amyli scrup. 1, gallinæ ter datus, illam non movebat. In aqua coctum hoc amyllum, gelatinam dedit, gelatinæ tritici simillimam, sapore subfatuo, miti, bene glutinantem. Sic fæculæ Bryoniæ, in officinis usitatae, amylaceam radicis partem continent. Per se non purgat hoc amyllum, si bene elotum fuerit; sin minus alvum leniter solvit, dosi drachm. §.

CLAS-

(*) Epist. ad HALLERUM de Hydrope, p. 221.

CLASSIS XXII.
DIOECIA.
ORDO
DIANDRIA.

491. **S**ALIX pentandra. LINN. *Spec. pl.* 1442.
Gmel. *Sibir.* 1. p. 153. t. 34. f. 1. LINN. *Flor.*
Lapp. p. 370. t. 8. f. 3.
Salix spontanea, folio amygdalino, fragilis,
non auriculata. BAUH. *Hist.* 1. p. 214.
Pharm. *SALICIS LAUREÆ Cortex.*
Locus. Europa, in humidiusculis. *Frutex.*
FORMA. *Cortex ramulorum tenuiusculus.*
PROPR. rec. Odor gratus, tenuis; sapor bal-
famicus, amaricans; sicc. subausterus.
VIRTUS: adstringens.
USUS.

OBS. 1. *Infusum aquosum lutescens; amarum;* vi-
triolo martis nigrescit. *Extractum aquosum amarum.*
Aqua still. grata, in aquam cerasorum incidens.

OBS. 2. Folia hujus arboris satis fragrantia, ama-
ra. Amenta florifera pariter fragrantia. Cl. C. H.
SPECKBUCK (*), qui de hujus cortice egit, svaldet, ut
delumatur ex ramis biennibus, mense Maji, & pruden-
ter siccetur; quo enim adultiores rami, eo magis sty-
pticus cortex. De vi hujus antifebrili in febris in-
termittentibus nihil ex propria experientia statuit. Cl.

D d d 2

C. A.

(*) *Differ. de Salice Laurea odorata.* Trajecti ad Viadr.
1769.

C. A. GERHARD (*) corticem e Salice fragili LINN. officinalem vult, & dicit, se expertum fuisse illum virtute antifebrili cortici Peruviano respondere. Sed hic cortex ita stypticus est, ut corium cum eo perficere potuerit LAUR. ZETHELIUS (**). Ego hunc corticem in febribus intermittentibus iterum iterumque exhibui, sed irrito conatu.

ORDO TETRANDRIA.

492. **VISCUM** album. LINN. *Sp. pl.* 1451. *Mat.* m. 450. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 1. MURR. *Appar. medic.* vol. 1. p. 199.
Viscum baccis albis. DUHAM. *Arbr.* 2. p. 354. t. 104.

Viscum. CAMER. *Epit.* 555. LOBEL. *Hist.* 361. BLACKW. *Herb.* t. 184. DOD. *Pempt.* 814.
Pharm. VISCI Lignum.

Locus. Europa. *Frutex parasiticus.*

FORMA. Frutex parasiticus, sempervirens, in ramis aliarum arborum crescens, ab ima basi ramosus, erectus, diffusus, phoeniceus, glaber, dichotomus: ramis teretibus; ad divisiones caulis s. ramorum subnodosus, sulco annulari, subdentato. *Folia* terminalia, bina, sessilia, opposita, cuneiformi-lanceolata, inferne attenuata, pollicaria vel ultra, integerrima, duriuscula, atrichodia, tubrugosa, nervis longitudinalibus, parallelis, ob oletis. *Baccæ* 3 vel 4, axillares, sessiles, albæ,

(*) *Mater. med.* p. 301. seq.

(**) *Svar på K. Vetensk. Acad. Frdga, om båsta sättet att århålla nödig tillgång på dugelig bark för Garfverierne.*
Stockholm 1767.

albæ, læves, globosæ, monospermæ, turgidæ succo viscidæ & tenaci.

PROPR. rec. & siccata. Odor debilis, vix ullus, pariter etiam sapor. Rami, masticati, corticalli parte glutinosi, subamaricantes, obscure acrisculi.

VIRTUS:

USUS. Morbi convulsivi.

OBS. 1. Infusum aquosum Visci siccatai, in balneo paratum, limpidum, luteum, odore nauseoso, fungofo, sapore consimili, vir. martis purpurascit.

OBS. 2. Usus Visci apud nos rarissimus est. Quamvis pures medicorum Viscum in epilepsia morbisque convulsivis laudaverint, evictum tamen non est, quid revera præstet.

OBS. 3. De Visko scripsit J. COLBATCH (). Casibus is pluribus comprobat usum Visci, cum in catalepsi, tum in epilepsia, & morbis convulsivis. Narrat, choream S. Viti absque relapsu curatam ex propinato Visko, dosi drachm. 2. quovis die, & id quidem postquam summa tota Visci sumti ad unc. 12 vel 14 adscendisset. In epilepsia Viscum in tantum profuisse vidit, ut remediis specificis illud adnumerare non dubitet, utpote quod in hoc morbo haud minorem exserit virtutem specificam, quam Chinchina in febribus intermittentibus. Addit postinde, se nullum detrimentum a propinato Visko observasse. Propinat viscum sub forma pulveris ad drachm. 3-1, bis vel quater de die; saepe addit infusum, paratum ex Visci unc. 4 in aquæ calid. unc. 40. Sæpe etiam adjicit Assam fœtidam, & spondet, vim antiepilepticam, ex addita hujus gummi-resinæ octava parte, mirifice exaltari. In Ecclampsia infantili usum visci egregium deprehendit. Viscum quer-*

D d d 3 num

(*) *Diff. concerning Mistletoe, a most wonderful specif. remedy for the cure of convulsive distempers. Lond. 1723.*

num nunquam adhibuit hic auctor; nec putat multum referre, in quam arboris specie creverit. Mense decembri colligendum viscum, dicit, beneque siccandum, & postea loco secco, in vasis vitreis obturatis, conservandum, cum valde pronum sit ad mucorem contractandum, unde effetum evadit.

OBS. 4. *Viscum aucuparium* etiam ex hoc fructe paratur. In hunc finem sumatur cortex recens, qui bene coquundatur, & deinde formentur boli, ovi magnitudine, qui in aqua pura repetitis vicibus laventur, digitisque bene premantur, ut filamenta e glutine separantur; DUHAMEL.

493. MYRICA Gale. LINN. Sp. pl. 1453. Mat. m. 451. KNIPH. Bot. orig. cent. 9. OEDER loc. t. 327.

Chamæleagnus. DODON. Pempt. 768.

Pharm. MYRTI BRABANTICÆ Folia.

Locus. Europa, Canada, in uliginosis. *Frutex*.

FORMA. rec. *Folia* alterna, breviter petiolata, erecta, fere sessilia, obverse lanceolata, obtusa, superne ferrata, pollicaria, margine & circa pubescentia, utrinque minutim rugosa, ceterum glabra, nervis alternis, obliquis instructa, atomis elevatis, luteis, nitentibus subtus adspersa, margine utrinque recurvato.

PROPR. rec. & siccata. *Odor* fragrans, aromatico-graveolens, non ingratus, temulentans. *Sapor* substypticus, subaromaticus, amaricans.

VIRTUS: cephalalgica, anodyna, antiphthiriaca, resolvens, tonica.

USUS. Scabies, Tinea pellendæ.

OBS. 1. *Infusum* aquosum luteum, odore foliorum, sapore amaricante; vitriolo martis subito nigrescit.

OBS. 2.

OBS. 2. Usus medicus vix ullus, quamvis revera vis medica præstans. Ante receptum usum Lupuli in regionibus septentrionalibus cerevisiæ communiter imponebatur Myrtus brabantica, sed illam temulentatem reddidit. Nunc ad tineas e vestimentis pellendas virgulta ex hoc frutice adhibentur. Sunt etiam qui ungventis adversus seabiem folia contusa immiscent.

OBS. 3. Puncta lutescentia foliorum & ramulorum tenellorum quidam cerifera esse volunt. Certe Myrica cerifera LINN. in Virginia, Pennsylvania & Ludoviciana, revera ceram profert, unde candelas cereas formare possunt, quas & ipse vidi. Sed baccas gerit hæc Myricæ ceriferæ species, & colligitur cera infusione baccarum in aqua calida, unde liquefecit. Cera hæc colore viridi est, & odore aromatico, sed color viridis deletur, si, sicut cera vulgaris, soli exponatur, unde alba evadit, prout tradit cl. Bossu (*).

ORDO PENTANDRIA.

494. PISTACIA vera. LINN. Sp. pl. 1454. Mat.

m. 454. KNIPH. Bot. orig. cent. 2.

Pistacia. BLACKW. Herb. t. 461. BAUH. Hist.
1. p. 275.

Terebinthus indica Theophrasti. DUHAMEL
Arbr. 2. p. 306. t. 88.

Pistacii ramulus cum fructu & corniculis. DOD.
Pempt. 805. LOB. Hist. 539.

Pharm. PISTACIÆ Nuces.

Locus. Oriens. Colitur in Italia. Arbor.

FORMA. sicc. Racemi nutantes, fructibus pedicellatis. Drupæ siccæ, ovatae, oblongiusculæ,
D d d 4 ma-

(*) Nouveaux voyages aux Indes occid. part. 2. p. 153.

magnitudine glandis quernæ, dorso elevatæ, convexæ, carinatæ, antice compressiusculæ, apice mucronato, obliquo, undique rugosæ, cinereo-viridescentes, exsuccæ. *Nux* ossea, alba, glabra, basi macula oblonga, rugoso-spongiosa, albidiore; *nucleo* amygdalino, albido-vitidescente, obducto tunica albida, sœpe subfuscata.

PROPR. Drupæ s. *corticis nucis*: *odor* leniter resinoso-balsamicus; *sapor* subamaricans, debilius resinosus; *cortex* hic accensus flagrat, fumo grato, balsamico. *Nuclei*: *Odor* nullus; *sapor* amygdalinus, dulcescens, subpinguisculus, subbalsamicus; *masticati teneri*, comminuantur, *saliva* emulsiva.

VIRTUS: *Nuc.* emulsiva, obtundens.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Nuclei*, cum aqua contusi, emulsionem faciunt; raro tamen in medicina adhibentur; apponuntur vulgo mensis secundariis.

OBS. 2. *Cortices nucis* loco suffimenti in domibus usurpantur, ad fumum gratum spargendum.

495. PISTACIA Terebinthus. LINN. Sp. pl. 1455.

Mat. m. 452.

Terebinthus vulgaris. DÜHAM. Arbr. 2. p. 306.
t. 87.

Terebinthus. LOB. Hist. 538. DALECH. Hist. 61. DOD. Pempt. 858. CLUS. Hist. 1. p. 15.
BLACKW. Herb. t. 478.

Pharm. TEREBINTHINA CYPRIA.

Locus. Europa australis, Oriens, India, in petrofisis. *Arbor*.

FORMA. *Resina* liquida, tenax, in fila duætillis, subdiaphana, colore lutescenti-brunneo, vix subcærulescente.

PRO-

PROPR. Odor fragrans, gratus, in flores Jasmini incidens; *sapor* subpinguisculus, amariçans, acriusculus, faucibus inhærens. In aquam calidam immissa emollitur, sed non funditur vel liquefcit, verum adglutinatur digitis immisis vasisque parietibus. Hæc Terebinthinae species easdem dotes habet, quibus reliquæ supradictæ Terebinthinae polient, pariaque phænomena monstrat.

VIRTUS: vulneraria, diuretica: urina odore violaceo.

USUS. Vulnera.

OBS. Terebinthina cypria est succus resinosus, qui e cortice trunci sauciato sponte distillavit in vasculum suppositum, atque tum ex ardore solis liquefactus, per pannum colatus fuit. Hæc arbores, quamvis satis proceræ, tamen parce Terebinthinam fundunt, ita ut 4 arbores, truncis circiter 5 pedum peripheria, & altitudine circiter 5 cubitorum, vix ultra libr. 2 & unc. 9 β Terebinthinae dederint, quod a. 1753 observatum. Fructus hujus arboris nonnisi a pauperibus estur; sed si Pistacia vera truncis Pistaciæ Terebinthi insita fuerit, Terebinthinam bonam fundit, & nuces insimul optimas fert Pistacia. Vera Terebinthina cypria rarissime, & vix unquam, ad nos venit, sed adulteratur plerumque cum Terebinthina veneta, unde clarior evadit; hinc semper præfertur Terebinthina spissior tenaxque ei, quæ liquidior atque pellucida est; COUSINERI apud DUHAMEL.

496. PISTACIA Lentiscus. LINN. *Sp. pl.* 1455.
Mat. m. 453. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 5.

Lentiscus vulgaris. DUHAM. *Arbr.* 1. *p.* 354.

t. 136.

D d d s

Len-

Lentiscus. LOBEL. *Hist.* 538. DALECH. *Hist.* 63.*

CLUS. *Histor.* 1. p. 14. DODON. *Pempt.* 859.

BLACKW. *Herb.* t. 195.

Pharm. LENTISCI Lignum.

Locus. Europa australis. Arbor.

FORMA. Lignum siccum, difficile fractu, ponderosum, extus cinereum, intus album.

PROPR. Odor non ingratus; sapor adstringens.

VIRTUS; restringens.

USUS.

B. Lentiscus ex Chio. TOURNEF. *Voy. du Levant*
2. p. m. 67.

Pharm. MASTIX.

Locus. Chio. Arbor.

FORMA. Resina solida, pallide lutescens, homogenea, in lacrymis ovatis, laevibus, diaphanis, magnitudine varia, a seminis cannabini ad Fabæ magnitudinem, superficie plerumque undique subopaca, fragilis: fracturis planis, instar gemmæ pellucidis, nitentibus, vitriformibus.

PROPR. Odor balsamicus, debilior; sapor debilis, gratus, balsamicus; masticata Mastix subfriabilis, sed inter mandendum colligitur, coit in massam sicciam, subrigidiusculam, albam, ceræ albæ similem, non solubilem. Ignis flammæ admota, non accenditur, verum liquefit & destillat subito. Vase ferreo super ignem, funditur, admota flamma non accenditur, nisi bene calefacta, odorem spargit balsamicum, gratum; accenditur tunc undique ex flamma admota, flagrat: flamma vivida, alta, fumante, fumo spisso, fuliginoso, remanente carbone sicco, nigricante, parum inquinante. Non solvitur in aqua, ve-

verum odorem suum ei communicat. Destillata cum aqua, *oleum stillatum* dat, ut monet cl. LEWIS. In spiritu vini maximam partem solvitur, sed remanet decima circiter pars ponderis, quæ non solvitur, verum tenax ad fundum va-
sis permanet. Solvitur etiam in oleo stillatio:
soluzione lutescente; at non in oleo expreso.

VIRTUS: vulneraria, roborans.

USUS: externus.

OBS. 1. Ex incisionibus trunci & majorum ramorum, mensibus Augusti & Septembr. succus distillat resinosus, qui sponte concrescit, & Mastix audit. Bonæ no-
ræ Mastix debet esse in lacrymis s. granis minoribus,
claris, diaphanis, lucidis, lutescenti albidis, odore non
ingrato. DUHAMEL.

OBS. 2. Etsi Lentisci in Italia, Gallia australi atque Græcia non raro occurunt, tamen vix aliæ sunt quæ Mastichen stillant, saltem non bonam & genuinam; quam quæ in insula Chio coluntur. Neque vero ubique in ista insula Mastix haberi potest, sed duntaxat in tra-
etu meridionali, ex 20 circiter vicos constante, quare etiam omnes ejus loci lentiscos jure regio sibi vindica-
vit Turcarum Imperator. Maxima profecto Mastiches copia a fœminis Turcicis & Græcis consumitur, qui-
bus moris est resinam hanc cerebro mandere, quo al-
bedinem dentium servent, gratumque oris halitum spi-
rent. Præterea vernices etiam intrat Mastix, ut & va-
ria istius gentis unguenta. Ceterum nec desunt ibi,
qui mastiche interne utuntur, ad stomachum juvandum,
quare panis interdum apud illos occurrit, cuius pastæ
Mastichen immiscuere (*).

OBS. 3.

(*) Cfr. TOURNEFORT Relat. d'un voy. du Levant, tom.
2. p. m. 66. seq. DUHAMEL tr. des Arbres, tom. 1. p.
354. s. DE LA MOTRAYE Voyages &c. tom. 1. p. 190. s.
THEVENOT Relat. d'un voy. au Levant, p. 180. s. HAS-
SELQUIST It. palæstin. p. 532.

OBS. 3. De Mastiche scripsit quidem J. S. STROBELBERGERUS (*); sed liber ejus compilatus est, & sat rudis.

497. SPINACIA oleracea. LINN. Sp. pl. 1456.
Mat. m. 556.

Lapathum hortense. MUNT. Aardg. t. 693.

Spinachia mas & femina. DALECH. Hist. 543.

Spinacia. BLACKW. Herb. t. 49. LOB. Hist. 129.

DOD. Pempt. 608.

Culinis: SPINACIÆ Herba recens.

Locus. Colitur ubique in hortis. Annua.

FORMA. rec. Radix cylindrica, descendens. Caulis bipedalis, erectus, teretiusculus, subangulatus, striatus, glaber, ramosus. Rami alterni, erecti, simplices. Folia alterna, petiolata, trianguli-oblonga, acutiuscula, integrerrima, subsucculenta, glabra, nervis arcuatis. Flores masculi, conglomerati. Racemi axillares, pedunculati, basi instructi folio solitario, caulino simili, ceterum nudi, constantes e glomerulis subrotundis, remotis; Racemi vero terminales in caule & ramis subcylindrici, foliosi, e glomerulis axillariis, sessilibus. CAL. Periantb. 5-partitum: lacinias oblongis, acutis, submembranaceis, concavisculis, patentibus. COR. nulla. STAM. Filam. 5, setacea, calyce longiora. ANTB. didymæ, majusculæ, inæquales. In planta fœminea nulli racemi, verum glomeruli florum axillares e foliis, subrotundi, sessiles; quorum inferiores in planta androgyni; superiores fœminei. CAL. COR. & STAM. nulla. PIST. Germina plurima, conglomerata, glabra, viridia, ovata, basi rotunda, utrinque comminutum pubescentes, erecto-

pa-

(*) Mastichologia. Lips. 1628.

patentes, intra gibbos germinis surgentes. *Stigmata* acuta. *Semina* obovata, compressiuscula, mutica s. spinosa.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* debilis, herbaeus. *Masticata* folia tenera, subsucculenta, salivae saturate viridi; *cocita* teneriora, masticulata subarenulosum quid mentiuntur.

VIRTUS: oleracea.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquosum herbæ rec. limpidum, subaqueum, odore debilissimo, sapore herbaceo, vix amaricante; a vitr. martis non alteratur.

ORS. 2. Adprime salutaris censetur cibus, qui a Spinacia paratur. Non multum quidem nutrit, sed sanguinem temperat, & bonos generat humores. Folia incoquuntur juri carnium, vel seorsim parantur ut Rumex Patientia. Spinacia *cocita*, utut tenera sentitur, id tamen cum omnibus leguminosis plantis oleraceisque commune habet, ut longe difficilior sit stomacho debili, quam caro animalis. Sunt apud nos coeconomi, qui folia viridia, cælo sereno collecta, in furno tepido, seu in ære sicco, lente torrefaciunt, in usum hiemalem. Ita viridia persistunt, & sub masticatione subpulposa sentiuntur, sed expedit ea prius in aqua emollire, quam in culinis apparantur, nam sic sapidiora fiunt.

498. CANNABIS sativa. LINN. Sp. pl. 1457. Mat. m. 457.

Cannabis mas & foemina. MILL. Figur. t. 77.

DALECH. Hist. 497. BLACKW. Herb. t. 322.

DOD. Pempt. 525.

Cannabis indica mas & femina. RUMPH. Amboin,

5. p. 208. t. 77.

Kalengi Cansjava. RHEED. Malab. 10. t. 60. & 61.

Locus. India orientalis. Colitur ubique in agris, Annua.

FOR-

FORMA. *Semina* ovata, utrinque compressi-
uscula, undique testacea, lævia, nitidiuscula, u-
trinque obtusa, sed altera extremitate excavata,
linearum 2 longitudine, margine utrinque pro-
minulo, pallidiore; *parenchymate* cotyledoneo, al-
bo, pinguisculo, bipartibili, intra crustam cor-
ticalem siccām, fragilem, obvelato pellicula fu-
lcescente.

PROPR. *Odor* vix ullus; *sapor* subfatuus.

VIRTUS: emulsiva.

USUS.

OBS. 1. Nostræ Cannabis semina nullam retinere
qualitatem narcoticam, sed mere esculenta esse, id ex
eo concluditur, quod pleræque aviculæ iisdem vescun-
tur, pingvescunt & bene se habent. Immo vero ho-
minibus etiam bene convenire, arguit mos Polonorum
pultes ex farina horum semiñum apparandi, quales se
Cracoviæ saepe contedisse meminit E. KÆMPFERUS (*).
Apud nos perraro in medicina adhibentur. Sed Per-
ſæ credunt, semina Cannabis, fricta & comesta, vene-
rem valde stimulare, insimul vero sterilitatem induce-
re; OLEARIUS (**). Certe quidem constat, aves do-
mesticas, aviculasque caveolis clausas, exinde salaciores
fieri. Ex semin. Cannab. libr. I accepit cl. SPIELMANN
unc. 3. *olei expr.* viridissimi, quod in frigore non co-
gebatur.

OBS. 2. Folia & pollē Cannabis apud nos non sunt
in usu; at in Persia totaque India maxime increbue-
runt, utpote narcotica, lætitiam inducentia. Et reve-
ra ista qualitas in Indica Cannabi inest, cuius tamen rei
nihil omnino de nostra unquam constituit, tametsi ultra-
que specie convenit. Etenim semina indica, in An-
glia sata, Cannabim produxerunt nostræ ex omni par-
te

(*) *Amœnit. exotic.* p. 645.

(**) *Orientalische Reise-beschreib.* p. m. 529.

te similem, non vero lœtificantem, prout narrat ROB. HOOKE (*). Itaque vis hæc lœtificans unice a climate & solo depender. In Persia alia Cannabis non est genuinæ virtutis lœtificantis, nisi quæ colitur in Komærèh, in Kutelli Pyreflén, atque in agro urbis Ispahaaan ; & etiamsi semina ex istis locis petuntur, & alibi conseruntur, cannabis tamen, quæ exinde progerminat, ex-sors facultatis lœtificandi deprehenditur, quemadmodum de seminibus Ispahano Gamronum translatis refert KÆMPFERUS (**). Duplici modo Cannabis suæ foliæ præparant Persæ; scilicet aut simpliciter ea infundunt cum aqua frigida, quod intusum, häustum, exhilarat, non citra gravem temulentiam; aut folia grosse pulv- rata cum aqua agitant, mox, expressis leniter foliis, a- quam abjiciunt, utpote virulenta cruditate nimis narcoticam, repetunt dein processum, & pulverem, gemina vice elutum expressumque, in mortario acerrime con- terunt in pultis consistentiam, affusa aqua frigida, cui paullatim plus aquæ affundunt, & demum per linteum trajiciunt, omni, præter recrementa, permeante sub- stantia, ex qua colatus liquor virescit, de quo postea bibunt ad lœtitiam. *Pollen* per linteum cibrant, & cum sputo humano, admoto carbone ignito, cujus ca- lone mollescit, trochiscos formant, qui boni censentur, si carbonibus inspersi cito parumque fument; deterio- res vero, si multum & diu. Hi pastilli lœtitiam etiam inducunt. KÆMPFERUS. Nostra Cannabis odorem spar- git narcoticum, & revera vim aliquam medicam ha- bitura videtur.

499. HUMULUS Lupulus. LINN. Sp. pl. 1457.

Mat. m. 458. KNIPH. Bot. orig. cent. 9.

Lupulus mas & femina. ZANNICH. Venez. t.

259. CAMER. Epit. 954.

Lu-

(*) *Philos. experiments and observas.* p. 211.

(**) *L. cit.*

Lupulus. Dod. Pempt. 404.

Pharm. & Culinis LUPULI Coni.

Locus. Europa, ad sepes, Japonia. Colitur qui usualis. Perennis.

FORMA. rec. Pedunculi axillares, subverticillati, submultiflori, scabridi. *Bracteæ lanceolatae*, acutæ, minutim pubescentes, ad pedunculos solitariae; minores in pedunculis, alternæ. *Amenta* subrotunda, laxe imbricata *squamis* ovatis, acutiusculis, membranaceis, siccis, stramineo colore, extus minutim pubescentibus, intus glabriusculis, nervoso-venosis, margine vix ciliatis; inferioribus minoribus. *Squamae* aliae basi planæ, aliae vero basi latere interiore concavæ, farina resinosa aurei coloris extus laxe adspersæ. *Semina* solitaria, subrotunda, subsessilia intra squamas, ad illarum basin, obducta propria membra sicca, & adspersa farina resinosa.

PROPR. *Odor* fragrans, subnarcoticus, gravis; *sapor* peramarus, odori consentaneus, inhærens.

VIRTUS: tonica, temulentans, anthelminthica, diuretica.

USUS: culinaris; Luxatio, Lumbrici.

OBS. 1. Extrahitur menstruo aquo & spirituoso. *Infusum* aquosum dilute lutescens, odore & sapore Lupuli; vitriolo martis nigrescit.

OBS. 2. In culinis omni Cerevisiæ Lupulum impo-
nunt. Decoquunt illum in aqua; sed decoctum prima-
rium, ut nimis narcoticum & colore saturatum, cere-
visiæ inferiori communiter adjiciunt; tum iterum de-
coquunt Lupulum eundem in decocto Maltæ prima-
rio. Sic amarities conciliatur cerevisiæ, qua ab acore
servatur, magisque diuretica fit, tonica, & ut vulgo
creditur, a calculo præservans. Dulcedo Maltæ haud
du-

dubie noceret stomacho, si abesset amarum. De vi narcotica Lupuli conferatur STENZELIUS (*).

OBS. 3. Primo vere prorumpentes turiones Lupuli, loco Alparagi, ad lautitiam a magnatibus eduntur, sapida grata amaritie.

ORDO HEXANDRIA.

500. SMILAX Sarsaparilla. LINN. Sp. pl. 1459.
Mat. m. 460.

Smilax aspera Peruviana. BLACKW. Herb. t. 393.

Smilax viticulis asperis virginiana, folio hederae leni, Zarza nobilissima. PLUK. Almag. 348. t. III. f. 2.

Pharm. SARSAPARILLÆ Radix.

Locus. Virginia, Mexico. Perennis.

FORMA. sicc. Fibræ radicis longissimæ, plurimum ulnarum, crassitie pennæ anserinæ, teretes, longitudinaliter undique sulcate, flexibiles, cortice tenui rubicundo-cinerascente, fibrillis sparsis, filiformibus, breviusculis, subramosis; parenchymate albo, farinaceo, sicco, subinquinante, intra corticem; tum subligneo: medulla subfarinacea, alba, compacta; post sectionem transversalem notato centro medullari albo, majusculo, obducto annulo ferrugineo undique punctato; circumdato margine albo.

PROPR. Odor vix ullus; sapor debilis, subamaricans; masticata siccata, sub masticatione solvitur substantia farinosa, & submucilaginosa sentitur, remanet lignea pars tenax.

E e e

VIR-

(*) De Anodyna virtute venen. p. 39.

VIRTUS: mundificans, saponacea.

USUS. Siphilis, Rheumatismus.

OBS. 1. *Decoctum* aquosum spissiusculum, saturate rubicundum, odore debilissimo, sapore submucilaginoso, leniter amaricante, vitriolo martis prorsus nil demutatum. Agitatione cum virga paullulum spumeescit decoctum hoc. *Infusum* aquosum, frigide paratum va lida contusione in aqua frigida, spissiusculum, opacum, rubicundum, leniter amaricans; vitriolo martis non mutatum. Quietè ad fundum vasis deponit hoc infusum *amylum album*, insipidum, copiosum, decoctione in aqua gelatinescens: gelatina incarnata, rubicunda, bene glutinante.

OBS. 2. Frequentissimi usus est Sarsaparilla in præxi medica, sub forma Decocti, ut diluens & mundificans in lue venerea, rheumatismis & arthritide. Per se vix curat siphilitidem, nisi adjuta mercurio; attamen in lue venerea ejusque symptomatibus inveteratis re vera multum prodest, sublevando opérationem mercurii. Proinde el. FORDYCE (*) illam valde laudat in doloribus capitis venereis, doloribus nocturnis, scabie ulceribusque venereis, atque emaciatione siphilitica. Vult ille, ut Sarlaparill. unc. 3 coquantur in aqua, ad colat. libr. 2, & quovis die hauriantur. Agit Sarlaparilla principio amylaceo, quod decoctione cum aqua in gelatinam vertitur, in aqua solubilem.

501. SMILAX China. LINN. Sp. pl. 1459. Mat. m. 461.

China-wurzel. GMELIN Reise durch Russl. t. 3. p. 32. t. 6.

Smilax sarmentis spinulosis, sinuosis, foliis 5-nerviis utrinque cordatis. RUMPH. Amb. auctuar. p. 72. t. 30.

Smi-

(*) Medical observat. and. inquir. 1. p. 149.

Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa China dicta I. Sankiva. KÆMPF.

Amæn. 781. t. 782.

Fruticulus Convolvulus spinosus sinicus, floribus parvis umbellatis. PLUK. *Almag. 101.*
t. 408. f. 1.

Pharm. CHINÆ Radix.

Locus. China, Japonia, Persia. **Perennis.**

FORMA. sicc. **Radix** ovato-oblonga, compressiuscula, palmaris vel ultra, nodulosa, ponderosa, obducta cortice tenui rubicundo-brunneo; **parencymate** solidiusculo, pallide rubicundo, post sectionem transversalem æquali.

PROPR. *Odor nullus; sapor vix ullus; mastigata* siccata, duriuscula, comminuitur.

VIRTUS: mundificans.

USUS: Ptisanæ diæticæ.

OBS. 1. *Decoctum* aquosum saturatius rubrum, saturatum, spissiusculum, subgelatinosum, odore & sapore nullo; vitr. martis color non alteratur. *Infusum* aquosum, valida contusione in aqua frigide paratum, spissiusculum, rubicundum, odore & sapore debili, non ingrato, vitriolo martis nil demutatum. Hoc infusum, quieti redditum, ad fundum deponit *amylum*, ut in priore, decoctione in aqua gelatinescens: gelatina fusco-rubicunda, bene glutinante.

OBS. 2. *Tubera teneriora* a pauperibus colliguntur in solo natali, & prout testatur RUMPHIUS, amyllum dant, farinæ Sagu æmulum, quod in escam adhibent incolæ; sed si copiosius eo vescuntur, cacheotici fiunt, sæpe etiam hydropici.

OBS. 3. **Radix Chinæ** frequenter præscribitur ad ptisanas apparandas. Coquitur cum aqua, & fit ptisana rubicunda, insipida. Pars colorans eminet in hac radice, & eo quod saporis expers est, commodus est

potus diæticus, cui imponi potest sapor quilibet pre-
cujusque lubitu; temperans est & involvens gelatino-
so suo, ex amyacea parte orto.

ORDO OCTANDRIA.

502. POPULUS balsamifera. LINN. *Sp. pl. 1464.*

Populus nigra folio maximo, gemmis balsa-
mum odoratissimum fundentibus. CATESB.
Carol. 1. p. 34. t. 34. DUHAM. *Arbr. 2. p.*
178. t. 38. f. 6.

Pharm. POPULI oculi.

Locus. America septentrionalis, Sibiria; co-
piosissime quidem ad lacum Baikal. Facile
perfert nostras hiemes. Propagatur ramulis
dissectis, tempore vernali. *Arbor excelsa.*

FORMA. rec. *Gemmæ majusculæ*, ovato-ob-
longæ, acutæ, spadiceæ, imbricatæ: squamis fir-
mis, oblongis, concavis.

PROPR. *Gemmæ*, tempore vernali tumi-
dæ, simulac inter digitos comprimuntur, balsa-
mum limpidum, spissiusculum, aurei coloris,
largiter fundunt, *odore* fragrante, vere gratio-
re, æstate ingratiore, fere Rhei veri, *sapore* sub-
aromatico, amaricante, calidiusculo.

VIRTUS: vulneraria.

USUS.

OBS. 1. Si gemmæ recentes in prelo calido expri-
muntur, *Balsamum* dant butyraceum, fuscum, rube-
scens, odore & sapore supradicto. E Gemmarum
unc. 4 obtinentur balsami drachmæ 2. Hoc balsamum
accensum flagrat: flamma fragrante, fumante, fuligi-
nota. Solvitur in spiritu vini, non vero in aqua. *Fo-*
lio

Mis erumpentibus undique illinitur hoc balsamum, unde nitida fiunt; hinc ante foliorum eruptionem gemmæ colligendæ.

OBS. 2. Quoniam Populus balsamifera facile nostrum clima perfert, hanc lubenter substituo Populo nigræ, quæ gemmas adeo parum balsamiferas gerit, ut in censum venire nec possit, nec debeat.

503. RHODIOLA rosea. LINN. Sp. pl. 1465. Mat. m. 477. OED. Icon. t. 183. KNIPH. Bot. orig. cent. 2.

Rhodia radix. CLUS. Hist. 2. p. 65.

Pharm. RHODIÆ Radix.

Locus. Europa, in alpibus. Perennis.

FORMA. rec. Radix majuscula, fusiformi-cylindrica, cinerea, glabra, lucidiuscula, undique notata lacunulis depresso-sparsis, sparsis, saepe cicatrisatis; ramosa: ramis tereti-fusiformibus, sparsis, radici conformibus. Parenchyma carnosum, albido, post sectionem transversalem æquale, nebulosum, annulo corticali, conflato e punctis oblongis, approximatis.

PROPR. rec. Odor debilis; sapor stypticus; fuscat. odor rosaceus, gratus.

VIRTUS: adstringens.

USUS.

OBS. 1. Infusum aquosum radic. recent. limpidum, odore nullo, sapore styptico; vitr. martis subito nigrescit; hujus infusi guttæ 10, aquæ unciæ 3 instillatae, addito vitr. martis, mox præcipitantur, colorem cæruleum assumunt, veluti flocculæ aquæ immixtæ, & in fundo manent in quiete; aqua vero ipsa tingitur colore purpureo. Oleum stillat. e radice destillationis ope eduxit cl. F. ZIERVOGEL, & e Radic. libra 1 obtinuit drachm. 1 olei still. lutescentis, odore & sapore Li-

gni Rhodii. *Aquam stillat.* ex hac radice destillavit
Luc. DEBES (*), aquæ Rosarum non absimilem.

ORDO ENNEANDRIA.

504. MERCURIALIS annua. LINN. Sp. pl. 1465.
Mat. m. 464.

Mercurialis mas & femina. ZANNICH. *Venez.*
t. 296. DOD. *Pempt.* 647. LOBEL. *Hist.* 131.
BLACKW. *Herb.* t. 162.

Pharm. MERCURIALIS Herba.

Locus. Europa, in umbrosis. *Annua.*

FORMA. *reg.* *Radix* alba, cylindrica, fibro-
sa, descendens. *Caulis* erectus, pedalis, glaber,
geniculatus: internodiis compressis, alternis; late-
ribus 2 oppositis compressiusculis; 2 aliis oppo-
sitis planis, angulatis, carina longitudinali. *Rami*
ad genicula, striato-sulcati, oppositi, superne fo-
liosi. *Folia* opposita, petiolata, ovata, obtusiu-
scula, margine obtuse serrata, minutim ciliata,
utrinque glabra, lucidiuscula, nervosa, vix bi-
pollicaria, patentia. *Petioli* semiteretes, supra
canaliculati, glabri. *Stipulæ* 4 ad genicula, utrin-
que binæ, oppositæ, parvæ, lanceolatæ, con-
caviusculæ, erectæ, submembranaceæ. *Pedunculi*
axillares, oppositi, foliis longiores, nudi, filiformes,
striato-tetragoni, erecti, superne proferentes
amenta globosa, nuda, sessilia; quorum
inferiora remota, alterna; suprema conglomera-
ta. *CAL.* *Perianth.* tripartitum: foliolis ovatis,
acutis, subdiaphanis, atomis punctatis, plano-pa-
tentibus. *COR.* nulla. *STAM.* *Filam.* plurima,
setacea, alba, longitudine calycis. *Antb.* subro-
tu-

(*) Færoæ & Færon referata, p. 113.

tundæ. *PIST.* nullum. *Fæminei* flores in distin-
cta planta. *Pedunculi* axillares, biflori, nudi, e-
recti. *Bracteæ* suboppositæ, ovatæ, obtusæ, al-
bidæ, in pedicello. *CAL.* Perianth. triphyllum:
squamis subrotundis, albidis, planis, subæquali-
bus. *COR.* nulla. *STAM.* nulla. *Squamæ* 2, su-
bulatæ, acutæ, utrinque ad latus germinis soli-
tariae, germine paullo longiores. *PIST.* Germen
subrotundum, didymum, hispidum. *Stylus* vix
ullus. *Stigmata* 2, subulata, patentia, longitudi-
naliter superne hispida. *PERIC.* Capsula didyma,
echinata, trilocularis. *Semina* solitaria, globosa,
in singulo loculamento.

PROPR. rec. *Odor* graveolens, foetidus; *sa-*
por ingratus, amaricans, subsalsus.

VIRTUS: suspecta.

USUS.

OBS. Quandoquidem planta hæc tricocca est, jüdi-
cat botanicus sine hæsitatione, eam pro suspecta haben-
dam. Adhibetur quidem subinde ad clysmata; sed vis
emollientis nondum rite nobis constitit.

ORDO DODECANDRIA.

505. MENISPERMUM *Coccus*. LINN. *Sp. pl.*

1468. *Mat. m.* 175.

Arbor aristolochiæ foliis, maderaspatana, fru-
ctu parvo medicæ ad instar convoluto. PLUK.

Almag. 43. *t. 13. f. 2.*

Coccus officinarum. PLUK. *Mant.* 52. *t. 345.*
f. 2.

Cocci officinales. BAUH. *Hist.* 1. *p. 348.*

Cocculus piscatorius levanticus. CAMELL. *Philos. transact.* vol. 24. p. 1809. *

Natsiatam. RHEED. *Malab.* 7. t. 1. f. 1.

Tuba baccifera, *Cocculi indici & Tuba Bidji.* RUMPH. *Amboin.* 5. p. 35. t. 22.

Cuculi de Levante. DALECH. *Hist.* 1722.

Pharm. *COCCULI INDICI* Fructus.

Locus. India orientalis. *Frutex.*

FORMA. sicc. *Nux* subrotunda, latere altero sinulo subreniformis, nigricans, superficie subrugosa, magnitudine semenis Pisii majoris, unilocularis; nucleo globoſo-reniformi, intra *Testam* cartilagineam.

PROPR. *Sapor* intense amarus, diutissime inhærens; *odor* nullus.

VIRTUS: venenata.

USUS. Pediculi; Pisces captandi.

OBS. 1. *Infusum aquos.* saturate rubrum, intense amarum; cum vitr. martis fuscescit.

OBS. 2. Indi hisce nucibus ad pisces, immo etiam Crocodylos, captandos communiter utuntur; formant ex iisdem pastam, admixto subinde stercore humano, quam in aquam injiciunt, sive saltam seu dulcem; cum pisces eam delibant, tanta vertigine corripiuntur, ut manibus capi possint, non ideo tamen infalubres esui, quod hoc veneno perculsi fuere.

OBS. 3. *Radix* hujus fruticis apud Indos in tanta est aestimatione, ut *Radix omnia sanans* vulgo appellatur. Exhibere solent radicis vel sarmenti drachm. ȝ, interne, in diarrhoeis, concoctione læsa, indigestione, flatibus, colica, febribus malignis & intermittentibus. Externe adhibent pulverem radicis, in vulneribus recentibus, in ulceribus torpidis & putridis, ubi desiccat, detergit, consolidat. CAMELLI,

ORDO

MONADELPHIA.

506. JUNIPERUS communis. LINN. *Sp. pl.* 1470.

Mat. m. 465. KNIPH. Bot. orig. cent. 1.

Juniperus vulgaris fruticosa. DUHAM. Arbr. 1.

p. 321. t. 127.

Juniperus minor. DALECH. Hist. 67.

Juniperus. BLACKW. Herb. t. 187. DODON.

Pempt. 804.

Pharm. JUNIPERI Lignum, Summitates, Baccæ, Rob.

Locus. Europa frigidior, solo sterili. Arbuscula.

FORMA. Caulis fruticosus, diffusus. Frutex
altitudine plurium pedum, saepe arborescens,
caule crassitie brachii vel ultra. Rami teretes,
patuli, cortice tecti subolivaceo, laeviusculo,
squamoso. Ramuli ad angulum rectum fere pa-
tentes, sparsi, vix determinati, inæquales, squa-
mosi; Surculi tenelli viridescentes, glabri, arti-
culati; internodiis triquetris; angulis subsuccosis,
glabris, rotundatis, superne attenuatis. Folia
in ramulis tenellis & surculis ad articulos sita,
acerosa, terna, verticillata, sessilia, linearia, gla-
bra, supra plano-concava, glauca, subitus convexa,
carinata, laeviuscula, apice mucronata, pungen-
tia, undique patentia, 3 vel 4 lineas longa. Flo-
res masculi & foeminei in diversis fruticibus. Bac-
cæ laterales in ramulis, solitariæ, subsessiles s.
brevissime pedunculatae: pedicello crasso, undi-
que imbricato squamis ovato-acutis, adpressiu-
sculis; magnitudine seminis Pisii, nigro-violaceæ,
globosæ, glabræ, lucidiusculæ, apice instructæ
macula subrotunda, subrugosa, sulcis tribus, tri-
fari-
E e s

fariam spectantibus; parenzymate constante e pulpa spongioso - subsucculenta, ferruginea, tenuiuscula, intra corticem papyraceum. Semina 3 majuscula, hinc plana, inde convexa, in hemisphaerium conniventia, intra pulpam.

PROPR. *Summit.* rec. *Odor* gratus, balsamicus; *sapor* balsamicus, vix amaricans. *Bacc.* pulpa *odor* aromaticus, satis gratus; *sapor* dulcis, aromaticus, calidiusculus, odori contentaneus. *Semin.* *odor* debilis; *sapor* aromaticus, non dulcis; *masticata*, fragiliuscula, siccuseula. *Baccæ* non maturantur nisi biennii spatio, tota prima æstate virides sunt.

VIRTUS: *Ligni & summitat.* diuretica, sudorifera, mundificans. *Bacc.* diuretica, nutriendis, diaphoretica.

USUS: Ligni: Hydrops.

OBS. 1. *Infusum aquosum summitatum Juniperi* colore aureo, limpidum, odore aromatico, sapore debiliore, odori congruente; vitriolo martis fuscescit; *Baccarum* leniter contusarum limpidum, lutelcens, dulce, aromaticum; pulveratarum vero saturatius tintum, resinousum. *Decoctum* seminum pulveratorum turbidum, minus dulce, resinousum.

OBS. 2. *Rob Juniperi* paratur e baccis recentibus Juniperi, leviuscule contusis & aqua subtepida extractis. Baccarum semina non debent contundi, ne calidum oleosum simul extrahatur. Si infusum baccarum ad consistentiam mellis inspissatur, fit Rob Juniperi, & continentur e Baccar. libr. 20 Rob circiter libr. 3, plus vel minus, prout diverse maturæ fuere bacca & earum maceratio protracta. Hoc rob dulce est & gratus aromaticum. In Smolandia aliisque Sveciæ provinciis cerevisiæ loco utuntur infuso Baccarum Juniperi per totam æstatem & autumnum. Infusum hoc, saturatus

ratius l. a. fermentatum, *spiritum* ardente dat, larga quantitate, sc. cong. 6 vel 8 ex baccar. tonna 1, cum seminibus contusa, *Oleum still.* baccar. Juniperi luteum est, odore subterebinthinato, sapore acuto, calido, juniperino, natans. Ætate ad fundum vitri resinosa fæculas, instar Terebinthinae, deponit, colore brunneo. E baccar. Junip. libr. 10 obtinuit cl. BAUMÉ unc. 3 olei still. leviter citrini. Cl. CARTHEUSER e baccis Juniperi olei $\frac{1}{45}$ extraxit, & extracti aquosí pariter ac spirituosi dimidiam ponderis partem.

OBS. 3. Si frutex Juniperi integer, cum caule, ramis foliisque, in aqua elixetur, & Baccæ insuper leniter contusæ saporis gratia addantur, decoctum id bonum effectum præstat in hydrope, curamque interdum perficit. Rob Juniperi diureticum & edulcorans est lene, quare etiam in Svecia hinc atque illinc in usum diæticum adhibetur.

OBS. 4. De Junipero scripsit B. SCHAREFFIUS (*), & quidem compilando, nec nisi paucas proprias observationes immiscendo. Dum morbos recenset, quibus medetur Juniperus, ætiologias & differentias eorum juxta tradit.

β. Juniperus vulgaris arborea. BAUH. Pin. 488.

Pharm. SANDARACÆ Gummi.

Locus. Africa. Arbuscula.

FORMA. Resina pallide lutescens, homogenea, facie vitri, fere Mastiches, solida, diaphana, in lacrymis oblongis, subpollicaribus, subcylindricis, compressiusculis, lævibus, saepe rugosis; fragilis, subfriabilis: fracturis planis, instar vitri pellucidis, nitentibus.

PROPR. Odor balsamicus, gratus, fere Mastiches, sed paullo fortior; sapor debilis; masticata inter

(*) *Arkeuthologia s. Juniperi descriptio.* Francof. & Lips. 1679.

inter dentes friabilis, comminuitur in pulverem tenuissimum, & masticatione non coit. Ignis flammæ admota subito accenditur, emollitur, subdestillat, flagrat: flamma vivida, alta, fumante, valde fuliginosa. In vase ferreo super ignem lente emollitur, subfunditur initio, spargit odorem fortem & gratum, tenax fit, in fila ductilis, tandem fere funditur, accenditur a flamma admota, deflagrat, remanente carbone nigrante, subsplendente, sicco, vix inquinante. Solvitur in spiritu vini; sed non in aqua. In oleo still. digesta, non solvitur, verum emollietur pauxillum, & tingitur oleum colore dilute lutescente; in oleo expresso solvitur imperfecte, valde tenax fit, & inficitur oleum colore lutescenti subviridescente. Resina hæc, pulverata, abit in pulverem album.

VIRTUS: balsamica.

USUS: mechanicus; Suffimenta.

OBS. Hæc resina opportuna est iis, qui vernices apparabunt. Scribæ solent pulvere Sandaracæ charram rasam fricare, ne atramentum penetreret.

507. JUNIPERUS lycia. LINN. *Sp. pl.* 1471. *Mat. m. 466.*

Cedrus phœnicea altera Plinii & Theophrasti. Lob. Icon. 221.

Pharm. OLIBANI Gummi.

Locus. Arabia utraque. Arbor.

FORMA. *Gummi - Resina* pallide lutescens s. rubicunda, in lacrymis majoribus, ovato-oblongis, utrinque obtusis, magnitudine seminis Fabæ vel ovi columbini, solitariis vel geminis, sape pluribus aggregatis, laevibus, subopacis; fragilis:

gilis: fracturis planiusculis. Vilior *varietas* occurrit in massâ majuscula, marmorea.

PROPR. Odor balsamicus, resinosus. *Sapor* balsamicus, subamaricans; *masticata* comminuitur, emollitur, dentibus adglutinatur, alba fit, solvitur lente: solutione lactescente. Solvitur trituratione in aqua: solutione lactea; digestione solvitur secundum partem in spiritu vini rectificato: tinctura lutescente, transparente. In *oleo stillatit*. digesta non solvitur perfecte, verum emollitur, & oleum pauxillum inficit; cum *oleo expresso* emollitur, non solvitur, nec id oleum tingit. Ignis flammæ admota accenditur, non liqueficit, nec emollitur, flagrat candelæ instar, & lente consumitur: flamma vivida, fumante, fuliginosa, odore fere linteui accensi, sub deflagratione vertitur in carbonem siccum, nigricantem. In vase ferreo supra ignem sudat, spargit odo rem balsamicum; resinosa pars undique liqueficit, ebullit in superficie, fumat, non funditur, tandem undique vertitur in carbonem ignitum, absque flamma, qui ignem diutissime foveat; postremo, ab igne remota, tandem fatiscit in favillam cinereum, copiosam.

VIRTUS: vulneraria.

USUS: Suffimenta, Vulnera.

OBS. Maxima vis G. Olibani pro suffimentis in ecclesiis Romano-catholicis & Moscoviticis quotannis consumitur.

508. JUNIPERUS Sabina. LINN. *Sp. pl. 1472. Mat.*

m. 467. KNIPH. Bot orig. cent. 5.

Sabina folio Cupressi. DUHAM. *Arbr. 2. p. 242. t. 63.*

Sabina. DOD. *Pempt. 852.*

Pharm.

Pharm. SABINÆ Herba.

Locus. Europa australis, Oriens, Sibiria. Arbuscula.

FORMA. rec. *Frutex ramosus, diffusus, 3 - vel 4 - pedalis, vel ultra. Rami fuscescetes, teretes, sparsi, valde ramulosi: ramulis tectis squamis emarcidis, e foliis emortuis, subimbricatis; teneri ramulosi, distiche patentes, virides, tecti foliis acerosis, alternatim oppositis, linearibus, acutis, 2 lineas longis, convexis, medio dorso obsolete sulcatis, glabris, sessilibus, longitudinaliter adpresso - adnatis, apicibus liberis, verum latere utrinque adpressiusculis; tenerrimi vero ramuli imbricati foliolis consimilibus, sed duplo minoribus.*

PROPR. rec. Odor foetidus, gravis, fortis; sapor amaricans, gravis.

VIRTUS: emmenagoga, abortiens, diuretica, sanguinem movens.

USUS. Scabies, Ulcera fungosa, Porri venerei.

OBS. 1. *Oleum still.* limpidum instar aquæ, odore & sapore Sabinæ. Ex herbæ Sabinæ rec. libr. 23 obtinuit cl. BAUMÉ olei still. unc. 4 ½, & HOFFMANNUS ex herbæ Sabinæ unc. 32 accepit olei still. unc. 5.

OBS. 2. Quamvis potens emmenagogum sit Sabinæ, raro tamen præscribitur ad obstructionem mensurum; est enim remedium nimis violentum, nimisque sanguinem movens, eamque ob caussam semper periculosem, ubi temperie mulieris calida est. Equis Sabinam oppido convenire, eosque alacres & gestientes reddere, putant aurigæ nostri, qui eam ideo studiose querunt. Fulvis Sabinæ laudatur in carie ossium, ubi inspergendas; pariter etiam ad porros venereo tollendos.

509. CISSAMPELOS Pareira. LINN. *Sp. pl.* 1473.

Mat. m. 459.

Butua radix. ZANON. *Hist. p. 60. t. 41.*

Coapeba. MARCGR. *Brafil. 24. Pis. Bras. 94.*

Clematis baccifera glabra & villosa, rotundo
& umbilicato folio. PLUM. *Americ. p. 78. t.*
93. Filic. 1. t. 183.

Pharm. PAREIRÆ BRAVÆ Radix.

Locus. America meridionalis. Perennis.

FORMA. sicc. Radix magna, crassitie pollica-
ri vel ultra, laeviuscula, cylindrica, subincurva-
ta, extus cinerea, subrugosa; parenchymate ligneo,
lutescente, post sectionem longitudinalem nota-
to fibris longitudinalibus distinctis, approxima-
tis, parallelis, crassiusculis, plano-lamellatis, ver-
ticalibus, serie concentrica, latere utrinque tenui
epidermide obductis; post transversalem autem
disco undique abrupte radiata, punctulato: pun-
ctis excavatis; centro medullari parviusculo, sub-
rotundo; annulis 3 vel 4, pluribusve, pro di-
versa crassitudine radicis, concentricis, remotis.

PROPR. Odor nullus; sapor amarus; masti-
cata tenax, saliva lutescente.

VIRTUS: diuretica.

USUS. Arthritis.

OBS. 1. Infusum aquosum in balneo, luteum, odo-
re vix ullo, sapore amaro, acutiusculo, inhærente; vi-
triolo martis levissime fuscescit.

OBS. 2. Nmeo non novit, quantum fama Pareiræ
bravæ non ita pridem increbuerit, at quo jure, in me-
dium relinqu. Certe vidi ego calculosos, arthriticos
& rheumaticos plures, qui satis diu usum ejus abs-
que successu continuarunt.

OBS. 3.

OBS. 3. De hac radice scripsit M. F. LOCHNERUS (*), compilando, ita tamen, ut proprias etiam adjunxerit observationes.

ORDO SYNGENESIA.

510. RUSCUS Hypoglossum. LINN. *Sp. pl.* 1474.
Mat. m. 469.

Hypoglossum Dioscoridis, Lautotaxa Plinii.

COLUMN. *Ecpbr. 1. p. 166. t. 165. f. 2.*

Ruscus angustifolius fructu folio innascente.

DUHAM. *Arbr. 2. p. 236. t. 59.*

Hippoglossum. DOD. *Pempt. 733.*

Pharm. *UVULARIÆ* Herba.

Locus. Europa australis. Suffrutex.

FORMA. rec. *Caules* plures ex una radice, erecti, teretes, glabri, striati. *Folia* sparsa, saepe gemina, ovato-oblonga, acuta, in petiolos breves desinentia, viridescentia, venulolo-reticulata, integerrima, bipinnicaria, patentia, utrinque glabra, nitidiuscula. *Stipulæ* lineares, acutæ, membranaceæ, sub petiolo. *Flores* subtus sub foliis, sessiles, solitarii, in medio folii siti. *Bractea* lanceolata, acuta, sub flore, eodemque longior.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* amaricans, acriusculus.

VIRTUS: leniter roborans.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum lutescenti-rubicundum; vitriolo iunctus fuscescit.

511.

(*) *Schediasma de Pareira Brava*, Norimb. 1719. Cfr. VALENTINI *Ind. liter. p. 509.*

511. RUSCUS aculeatus. LINN. *Sp. pl.* 1474. *Mat. m. 468.*

Ruscus. DODON. *Pempt.* 732.

Ruscus myrtifolius aculeatus. DUHAM. *Arbr.* 2. p. 236. t. 57.

Bruscus. BLACKW. *Herb.* t. 155.

Myrtacantha murina spina, sive Myrtus sylvestris. LOB. *Icon.* 637.

Pharm. RUSCI Radix.

Locus. Europa australis. *Suffrutex.*

FORMA. sicc. Radix facie radic. asparagi, cylindrica, subtorulosa, cinerascens, fibris pluribus cylindricis, descendantibus, elongatis, frequentibus, cinerascentibus.

PROPR. sicc. Odor nullus; sapor graviusculus, subamaricans.

VIRTUS:

USUS.

OBS. Infusum aquosum lutescens tanquam potus Theæ, odore gravi, acuto, ingratu; sapore consimili; vitriolo martis vix obscurascit,

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.
ORDO
MONOECIA.

512. **V**ERATRUM album. LINN. *Sp. pl.* 1479.
Mat. m. 471. GUNN. *Fl. Norv.* 2. *p. 1. t. 1.*
f. 1 - 6.

Veratrum racemo supradecomposito, corollis erectis. MILL. *Figur.* *t. 271.*

Helleborus albus exalbido flore. CLUS. *Hist.*
1. p. 274.

Helleborum s. Veratrum album. DOD. *Pempt.*
379.

Helleborus albus s. Veratrum. BLACKW. *Herb.*
t. 74. LOBEL. *Hist.* 167.

Pharm. HELLEBORI ALBI Radix.

Locus. Europa, Oriens, Sibiria, in montosis.
Perenne.

FORMA. rec. *Radix* carnosa, fusiformis, digitalis, albedo-sublutescens, undique instructa fibris teretibus, longis; *sicc.* occurrit fibris resectis undique scabra, cinerea; *parenchymate* solidō, pallide cinereo, post sectionem transversalem undique punctato.

PROPR. *Odor* rec. ingratus; *Sapor* recent. & *sicc.* nauseosus, acerrimus, diu inhærens; *masticata* fauces adurit,

VIR-

VIRTUS: venenata, emetica, draistica, sternutatoria.

USUS: externus; Scabies, Pediculi, Tinea.

OBS. 1. *Infusum aquolum rad. sicc. rubicundum, odore subhircino, sapore acri, amaricante, fauces acri- monia sua rodente, diu inhærente; vitriolo martis color sibi constat.* Adeo acre mihi erat hoc infusum, ut, postquam id degustasse, & insuper aquam bibisse, ardorem faucium, cum sequente sensatione corro- dente cardialgica, atque etiam oppressione pectoris, diu deinde sustinerem. Post sumtum cochlear aceti paul- lulum quidem remisit cardialgia, sed exorti sunt dolo- res lancingantes infimi ventris, & usque in horam pran- dii posteri diei partim tormenta ventris sensi, partim dolores lancingantes vagos, cum quodam veluti *Piperis* sensu in fauibus. Inter pulverandum radicem con- furgunt pulvisciuli, qui nares incense vellicant & ster- nutationem cident. *CONR. GESNERUS* (*) hausit drach- mas 2 ex infuso, parato ex Helleb. alb. drachm. 3 & aquæ bullientis unc. 2, unde percepit ardorem circa scapulas & in facie capiteque, fervorem insuper lingvæ & gutturis cum subsequente singultu, quo per semi- horam perseverante, non aliud ipsi relinquebatur, quam, penna digitisque in fauces insertis, vomitum aliquo- ties provocare.

OBS. 2. Herba pecoribus omnino noxia est, quod quidem in vulgus notum, quamobrem etiam cujusque ruricole interest, ut mature extirpetur, cum e pa- leuis, tum vero e pratæ. Ergo igitur, prout observat *Cel. PALLAS* (**), in quibusdam Russiæ tractibus hu- midis, ubi haec planta copiosius provenit, necessitas est colonis, fœnacia administrantibus, omnes obvias stirpes, exquisite edecumatas, submoveare. Equi autem

Fff 2

ab

(*) *Epist. medic. fol. 69. a.*

(**) *Reise durch verschied. Prov. d. Russ. reichs, vol. 1. p. 49.*

ab esu Veratri, feno immixti, quod esurientes devorant, non pereunt, sed tamen gravibus intestinorum terminibus arripiuntur, ita ut sudore disfluant (*). At minus male res iis vertit, ubi tempore verno hacce planta vescuntur adhuc tenera & ante ejus florescentiam, tunc enim apud illos tantummodo alvus movetur; neque vero juniorem istam herbam respunt, quin potius enixe appetunt, prout in equis Sibiricis observavit idem PALLAS (**). Alias quoque mulos folia avide decerpssisse, in Helvetia animadvertis ill. v. HALLER, qui hanc plantam nulli praeterea animali vescam esse asserit (***) . Observatum in Russia, semina ejusdem avibus domesticis omnis generis deleteria fuisse (†); atque in Norvegia, nuda foliorum frustula, tantillum a pluribus gallinis vorata, eas omnes mox enecasse (††).

OBS. 3. *Usus internus* Hellebori albi, a medicinae patribus tantopere celebratus, apud nos jam prius obsolevit. Quoniam acerrima est haec radix, non facile commendari poterit, nisi maxima cum restrictione. Attamen non defuere hujus pharmaci patroni. CONR. GESNERUS, medicus quondam candidus pariter ac doctus, Helleborum album Antimonio longe antehabuit, & passim in epistolis suis ampliter eum laudavit. Sumsit ipse aliisque propinavit Helleborum, & dicit se nunquam usus ejus penitusuisse. Addit, semet creberime Helleboro usum esse „non ad purgandum, „sed ad referandos meatus & crassos humores attenuandum, eosque a centro & interioribus corporis ad superficiem & vias excretionum variarum educendum. - - - Recreat & roboret, & hilariorem facit, & ,acuis

(*) L. cit. (***) L. c. vol. 2. p. 190.

(***) Hist. stirp. Helvet. tom. 2. p. 96.

(†) PALLAS l. c. vol. 1. p. 49.

(††) GUNNERI Flor. Norveg. pars. 2. p. 2.

„acuit ingenium: quod in me & aliis s̄apissime exper-
 „rus scribo. Sed tenendus est modus“ (*). Semper in
 forma liquida adhibuit Helleborum, sc. Rr. Hellebor.
 alb. drachm. 2, Vini cretici unc. 6; stent in macera-
 tione per mensem, additis, si placet, aromatibus. Hu-
 jus vini helleborati drachma 3, nihil movebit (ait),
 „augebis scrupulatim, 2, 3, 4, 5 scrupuli nihil mo-
 „vebunt; sextus forte teneriorem aliquem moverit;
 „robustiorem ne septimus quidem, sed octavus aut no-
 „nus demum scrupulus, maxima admiratione: cum
 „sex septemve scrupuli nihil prorsus moveant, sed ex-
 „hilarent, ut dixi, & roborent, phlegmaticos præser-
 „tim: unum alterumve solum additum movere, &
 „quidem vehementer plerumque.“ (**). Sed frequen-
 tius utebatur oxymelle suo, ex Helleboro aromatibus-
 que parato, de quo utraque pagina præclara enunciat.
 Hujus compositionem in alio libello (***) descripsit. Ha-
 bebat bina oxymella; quorum unum majus, alterum
 minus vocabat. Certe igitur nemo jam dubitare pote-
 rit, quin maxime Helleboro suo consilus fit bonus ille
GESNERUS, quare etiam in hæc verba erumpit (†):
 „Ego, si vixerø, in Ellebori historia multa proferam,
 „quæ medici admirantur.“ Non nunc vacat plura an-
 tiquiorum medicorum de hoc pharmaco adducere te-
 stimonia atque encomia. Ego vix a memet impetrare
 potero, ut radicis, ita intense venenatæ, usum inter-
 num cuiquam svalurus sim, nisi summa adhibita cir-
 cumpscientia; etenim constat, eam, in satis parca dosi
 propinatam, s̄æpe horrenda symptomata excitasse, ut
 sitim, cardialgiam, tortina, singultum, suffocationes,
 convulsiones, tremores, inflammationem primarum via-
 rum, lipothymias, sudorem frigidum, immo & mor-
 tem.

F f f 3

513.

(*) Epist. med. fol. 13. b. (**) l. c.

(***) De Aconito & Oxymelle Hellebor. &c. p. 21.

(†) l. c.

513. VERATRUM, quod Mexicanum Sabadilli
semen. VAN DER BECK *Act. phys. med. A.*
N. C. vol. 1. app. p. 120.

Pharm. SABIDILLI Semen.

Locus. Mexico.

FORMA. sicc. Capsule tres æquales, teretisculæ, acutæ, semiungviculares, glabræ, bivalves, latere interiore longitudinaliter dehiscentes, uniloculares, subdispermæ. *Semina* oblonga, subcylindrica, propria tunica obvelata.

PROPR. Odor vix ullus; *Sapor* capsulae ipsius nullus, sed seminum amarissimus & acerrimus: acrimonia diu inhærente. Inter masticanum lingva & fauces subito afficiuntur acrimonia caustica & valde pungente, sed sub masticationis fine aliquid etiam subdulcis inter amarum prominet. Acerrimus stimulus durat postea satis diu, etiamsi fauces aqua frigida probe eliduntur, cum sensu intermixto subdulcis saporis. Mihi maculam excoriatam in lingua fecerunt semina, ubi paullo diutius illa retinui.

VIRTUS: venenata, draistica, emetica, phthiriaca.

USUS. Pediculi,

OBS. 1. *Infusum* aquosum capsulae & seminum colore cerevisiae tenuis, sapore amaro, nauseoso; cum vitr. martis vix fuscelcit. *Decoctum* aquosum sapore peramaro, colore rubro; e vitriolo martis nil alteratur. Inter pulverandum semina, commoventur nares, ut prioritetur sternutatio.

OBS. 2. Adeo specifica sunt hæc semina aduersus Pediculos, ut pulverata illos arceant, sive sint capillis capitis inspersa, seu vestibus insuta. Usus seminum externus nihil unquam noxæ, quod sciám, secum habuit.

514. ANDROPOGON Schœnanthus. LINN. Sp.
pl. 1481. Mat. m. 31.

Gramen dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevibus tomento candidantibus ex eodem pediculo binis. PLUK. Almag. 175. t. 190. f. 1.

Gramen dactylon maderaspatense, cum plurimis spicarum paribus ad summum caulem velut in verticilos positis. PLUK. Alm. 175. t. 119. f. 2.

Gramen ad junceum accedens aromaticum, majus syriacum. MORIS. Hist. 3. J. 8. p. 229. t. 9. f. 25.

Comachee pillee. BROWN. Phil. transact. v. 23. p. 1251. *

Codipulu. RHEED. Malab. 12. p. 107. t. 57.

Pharm. SCHOENANTHI Herba.

Locus. India, Arabia. Perenne.

FORMA. sicc. Culmus spithameus, erectus, teres, stramineus, subscabriuscus, obsolete striatus, inferne geniculatus, vestitus vagina folii cylindrica, arcta, striata, glabra, culmo concollore. Folia linearia, angusta, subspithamea, concavo - canaliculata, minutim undique striata, glabra, marginibus scabriuscua, erecta; tenella subulata, scabrida.

PROPR. Odor aromaticus, cephalicus; sapor aromaticus, odori consentaneus, in Origanum creticum incidens, amaricans.

VIRTUS: stomachica, emmenagoga.
USUS.

OBS. Aqua still. fragrans; oleum still. paucum, fragrans, lutescens, pungens; LEWIS.

515. ANDROPOGON Nardus. LINN. *Sp. pl. 1482.*

Mat. m. 32.

Calamus odoratus Matthioli. BAUH. *Pin. 17.*

Theatr. 263.

Pharm. SPICÆ NARDI Radix.

Locus. India. Perenne.

FORMA. sicc. Radix subdigitalis, fusco-ferruginea, subcylindrica, crassitie digitii, undique vestita retibus fibrillaribus, numerosis, siccis, tenaciusculis, ortis e vaginis annotinis; intra quas latitat truncus radicalis, cylindricus, geniculatus, albidus, fragilis.

PROPR. Odor fragrans, gratus; sapor subdulcescens, aromaticus, odori congruens, tum amaricans. Masticata calida, oris halitu fragrante.

VIRTUS: quæ in præcedente.

USUS.

516. PARIETARIA officinalis. LINN. *Sp. pl. 1492.*

Mat. m. 472. KNIPH. Bot. orig. cent. 4.

Parietaria officinarum & Dioscoridis. ZANNICH.

Venez. t. 272.

Helxine. CAMER. *Epit. 849. LOB. Hist. 130.*

Pharm. PARIETARIÆ Herba.

Locus. Europa australis, in ruderatis. Perennis.

FORMA. rec. Caulis teres, pedalis vel supra, undique striatus, pubescens, inferne ramosus. Rami alterni, erecti, simplices. Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, utrinque attenuata, integerrima, supra saturate viridia, lucida, rugosæ, subtus venis pubescentia, luci exposita undique punctata, bipinnicaria vel ultra, patentia. Petioli pallidi, striati, supra canaliculati, minutim pubescentes. Verticilli florum axillares e foliis, subamplexicaules, conglomerati e

pes.

pedunculis geminis, dichotomis, axillis omnibus floriferis. *Bracteæ solitariæ*, lineares vel ovatæ, obtusæ, punctatæ, ciliatæ, ad divisiones singulas verticilli, atque ad pedicellos. *CAL. Involucr.* diphyllum: foliolis ovalibus, bracteis similibus. *COR.* monopetala, quadrifida: laciniis ovatis, acutis, concavis, villosis, erectis. *STAM. Filam.* 4, linearis-subulata, corolla longiora, instante, anthesi elastice resistentia. *Antheræ* ovatæ, obtusæ, didymæ. *PIST.* Germen ovatum, obtusum, dia-phylum, glabrum. *Stylus* nullus. *Stigma* sim-plex. Flores fæminei axillares intra verticillum, calyce nullo, corolla hermaphroditi simili.

PROPR. rec. Odor nullus; sapor herbaceus, in Urticam incidens.

VIRTUS:

USUS.

517. ATRIPLEX hortensis. LINN. *Sp. pl.* 1493.
Mat. m. 473. DODON. *Pempt.* 604.

Atriplex hortensis alba s. pallide virens. BAUH.
Pin. 119.

Atriplex sativa. LOBEL. *Hist.* 127.

Atriplex. BLACKW. *Herb.* t. 99.

Culinis ATRIPLICIS SATIVÆ Herba virens.

Locus. Tartaria. Colitur in hortis. *Annua.*

FORMA. *rec.* Radix ramosa. Caulis pallide viridescens, bi- vel tripedalis, erectus, inferne obsolete tetragonus, superne teretiusculus, grosse substriatus, glaber, geniculatus: geniculis utrinque compressis, planis; ramosus, diffusus. Ramæ teretes, glabri, grosse striati, brachiati, erecti; inferiores oppositi; superiores alterni; tenui apice densius adspersi farina crystallina, albi-da, abrasili. Folia petiolata, lutescenti-viridia,

F f f;

sub-

subsucculenta, venosa, utrinque glabra, subtus rarius adspersa pulvere tenuissimo; inferiora sub-bipollucaria, deltoideo-hastata, obtusa, margine dentata; superiora ovato-oblonga s. lanceolata, basi rotundata, integerrima. *Racemus* terminalis, nudus, compositus, erectus, floribus sessilibus. *Braetæ* lineares, solitariæ, ramis racemi subjetæ. *Hermapbroditi* flores: *CAL.* Periantb. 5-partitum: laciniis linear-i-ovalibus, obtusis, concavis, patentibus. *COR.* nulla. *STAM.* Filam. 5, subulata, calycis laciniis singulis singula respondentia, patentia, calyce paullo longiora. *Antb.* didymæ: lobis globosis. *PIST.* Germen parvum, ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* simplex. *Fæminei* flores in eadem planta. *CAL.* diphyllus, majuscus; foliolis ovatis, æqualibus, planis, parallelis, conniventibus. *STAM.* nulla. *PIST.* Germen stipitatum, ovatum, glabrum. *Styli* 2, subulati, albi, erecti, calyce longiores. *Stigm.* acuta. *Sem.* hermaphrod. parviuscula, orbicularia, nigricantia; fœminea compressa, intra valvulas calycis majores factas.

PROPR. rec. Odor nullus; sapor debilis, herbaceus; *masticata* folia subsucculenta, tenera, saliva lutescenti-viridula.

VIRTUS: oleracea.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Infusum* aquosum herbæ recentis dilute citrimum, odore debilissimo, sapore debili, in Portulacæ infusum incidente; vitriolo martis nigro-fuscescit.

OBS. 2. In culinis coquuntur folia tempore æstivo cum Cerefolio, Allio fistulofo, carnibus, in juseulum oleraceum spissum.

518. ACER platanoides. LINN. *Sp. pl.* 1496. TREW.
Ebret. t. 91. KNIPH. *Bot. orig. cent.* 12. MILL.
Fig. p. 6. t. 8. f. 1. MUNT. *Aardgew.* t. 57.

Acer montanum. DALECH. *Hist.* 83.

Acer major. CAMER. *Epit.* 63.

Culinis ACERIS lympham.

Locus. Europa borealis. Arbor.

FORMA & PROPR. Truncus arboris, hie-
 me anni post brumam, cælo temperato, pro-
 pe radicem terebra incilus, *lympham* stillat lim-
 pidissimam, aquæ fontavæ simillimam, *sapore*
 dulci, melligineo, debiliore.

VIRTUS: mundificans.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Lymphæ* congius 1, pondere libr. 9 β , ad
 consistentiam mellis, h. e. ad pond. unc. 2 β , evapora-
 tus, refrigeratione abit in *Extractum* tenax, in fila
 ductile, colore rubescente, *sapore* dulci, fere infusi
 Maltae inspissati. Hoc *extractum* loco sacchari in culi-
 nis adhibent œconomi providi ac frugales.

OBS. 2. Plurimæ species ex Aceris genere, tempo-
 re hiemali, *lympham* stillant, dulcem, saccharatam,
 ex qua verum saccharum confici potest. Cl. GRUNER (*)
 ex Acere Pseudoplatano LINN. saccharum eduxit. In-
 spissavit *lympham*, forti ebullitione, ad quartæ partis
 remanentiam, quam, filtratam, denuo ad consistentiam
 syrapi spissioris evaporavit. Ab igne remoto vase, con-
 tinue agitavit liquorem inspissatum, usquedum penitus
 refriguit, & sic obtinuit magma saccharinum, colore
 & *sapore* Sacchari Thomæi. Acer rubrum & saccha-
 rinum Pensylvaniæ incolis materiem sacchari præbent;
 & vero processus idem est. Inspissatio peragitur deco-
 quendo per horas 16, & sub refrigeratione pariter
 continue agitando, ne saccharum nimis durum fiat.

Ex

(*) *Fränckische Sammlungen*, vol. 4. p. 36.

Ex 10 eongiis lymphæ habetur sic libra i sacchari. & quævis arbor procera dat 20 cong. lymphæ; DUDLEY (*). De Acero americano sequentes observationes communicat DUHAMEL (**). Scil. hujus lymphæ congii 50 dant libras 10 Sacchari, duri, rubicundi, subdiaphani, odoris svavis, saporis dulcissimi. Præstat lymphæ sub hieme distillans, quam quæ vernali tempore habetur, postquam gemmæ intumescere cœperunt, quia hæc saporem habet herbaceum, vix gratum, & saccharum, quod ex hac paratur, in aëre pronum est ad deliquescendum. Saccharum, quod ex lymphæ Aceris inspissata in Canada paravit L. HENNEPIN (***) , rubrum fuit & sapidissimum.

519. MIMOSA nilotica. LINN. *Sp. pl.* 1506. *Mat.* m. 261.

Acacia vera. BAUH. *Hist.* 1. p. 429. VESLING. *Ægypt.* t. 8.

Acacia ægyptiaca. HERNAND. *Mexic.* 866. t. 866.

Acacia vera s. spina ægyptiaca, subrotundis foliis, flore luteo, siliqua paucioribus isthmis glabris nigricantibus. PLUK. *Almag.* t. 123. f. 1.

Acacia. ALPIN. *Ægypt.* p. 4. *

Pharm. ARABICUM Gummi.

Locus. Libyæ deserta. Arbor.

FORMA. Gummi in frustulis subrotundis vel hemisphæricis, magnitudine ovi columbini vel nucis Juglandis, extus subrugosum, rufescens, diaphanum; parenchymate pellucido, lutescente, fa-

(*) *Pbilof transact.* vol. 31. p. 27.

(**) *Traité des Arbres*, tom. 1, p. 32. sequ.

(***) *Nouveau voyage d'un pays plus grand que l'Europe*, p. 325.

facie vltrei colorati, splendente, fragili: fracturis planis.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* nullus; *masticatum* inter dentes primo duriusculum, fragile; dein subemollitur, dentibus adhæret, tandem solvitur. In aqua pura solvitur: solutione mucilaginosa, limpidissima, insipida; sed non solvitur in spiritu vini, nec in oleis. G. arabici unciæ 8, in aquæ libr. 2 solutæ, aquam in consistentiam syrapi reducunt. Ignis flammæ admotum hoc Gummi, non liquefit, sed tumet, fremit, sæpe aërem explodit, nigrescit, fumat, odore ferre linte accensi, ignem fovet ut pruna, & postea in favillam fatiscit cinereum. In vase ferreo super ignem non funditur, sed nigrescit, fumat, ignescit absque flamma; admota flamma accenditur, flagrat: flamma exigua, remanente favilla atque carbone nigrescente, splendente. Gummi arabicum acidum Sacchari continet; etenim G. Arabici 100 partes, cum 900 partibus acidis Nitri tractatæ, acidi Sacchari partes 21 porrigitur (*).

OBS. 1. Ex trunco arboris sauciato distillat succus gummosus, initio liquidus, tenax, sed, postquam in aëre exsiccatus est, in gummi abiens; hinc subinde mucas inclusas deprehendis. G. Arabicum a Mauris in desertis Libyæ colligitur, & ab iis postinde apportatur in Senegal, ubi commutatur cum panno & linteo cæruleo ferroque; LE MAIRE (*).

OBS. 2. Solutio G. Arabici in aqua pura, sive calide seu frigide parata, bene glutinat. Statuunt multi, hoc gummi nutrire; quare caravana, ex Abyssinia

Cai-

(*) TOBB. BERGMAN *dissert. de Acido Sacchari*, p. 4.

(**) *Voyages aux îles Canaries, Cap-verd, Sénégal & Gambie.* Paris 1695. p. 75.

Cairum quotannis proficiscens, G. arabicum, ut succedaneum cibi, identidem adhibere solet; F. HASSELQUIST (*). Sic etiam Mauri Libyci G. arabicum e solo natali, itinere 500 leucarum, in oram Senegal exportantes, sub isto cursu nullo alio alimenio fruuntur, quam G. arabico, in lacte soluto; LE MAIRE (**). Sic alii quoque Mauri, juxta Senegal habitantes, saepe viuentant solo lacte & G. arabico, ut narrat cl. ADANSON (***) . Sic etiam Arabes Beduini, in deserto Sinai passim vagantes, satis avide G. arabico vescuntur (†). Interim tamen nondum satis evictum arbitror, gummosa revera nurriendi virtute pollere. Istud quidem arguere quodammodo videtur vis illa, quae in G. Arabicco inest, glutinandi; sed tamen controversiosa res est, ideo praesertim, quod hoc gummi fermentationem spirituofam non subit, tanquam frumenta radicesque tuberosæ & dulcescentes. Fortassis probabiliter dicere possumus, gummosam substantiam minus nutrire, quam involvere sangvinem, ab esurie acrem.

OBS. 3. G. arabicum, in mucilaginem redactum, & cum oleis tritum, illa in aqua suspendunt, sub forma Emulsionis. E.g. arab. parte I & olei express. p. 4, addita aqua, emulsionem habebis. Balsama liquida resinaque solidas pariter in aqua suspendit G. arabicum: solutione imperfecta.

OBS. 4. Planta aphylla, *Odja* dicta, exstillat Gummi album, dulce, adhuc recens molle, summe tenax, edule; quod, ubi obduruit, ab Arabibus venditur nomine Gummi arabici; PET. FORSKÅL (††).

520.

(*) *It. palæstin.* p. 533.

(**) *I. c.* p. 76.

(***) *Histoire natur. du Senegal*, p. 38.

(†) G. C. v. NEITZSCHITZ *Weltbeschauung durch Europa, Asia und Africa*. Budiss. 1673. p. 187.

(††) *Flor. Ægyptiaco-arabic.* p. 94.

520. MIMOSA Senegal. LINN. *Sp. pl.* 1506.

Acacia. ALPIN. *Ægypt.* 9. t. 15.

Acacia altera vera, siliqua longa villosa, cortice candicante donata. PLUK. *Alm.* 3. p. 251. f. 1.

Arbor foliis pinnatis, spica pendula, sericea.

CATESB. *Carol.* 2. p. 44. t. 44.

Pharm. SENEGAL Gummi.

Locus. Arabia, Senegal. *Arbor.*

FORMA. Gummi in fructis majoribus, saepe magnitudine pomis minoris, subrotundis vel hemisphaericis, praecedenti magis pallidum, colore albido, subcitrino, superficie rugosa; parenchymate facie vitri, diaphano, fragili: fracturis pariter planis.

VIRTUS: ut in praecedenti.

USUS: ut in praecedenti.

OBS. G. Senegal communiter in officinis nostris substitui solet G. arabico, quod quidem perinde fuerit.

ORDO

D I O E C I A.

521. FRAXINUS excelsior. LINN. *Sp. pl.* 1509. *Mat.*

m. 475. DUHAM. *Arbr.* 1 p. 247. t. 101.

Fraxinus. DALECH. *Hist.* 83. BLACKW. *Herb.* t. 328. DOD. *Pempt.* 821.

Pharm. FRAXINI Cortex, Folia.

Locus. Europa, Carolina, Virginia, in pratis. *Arbor.*

FORMA. rec. *Cortex* ramulorum extus oliveaceus s. brunneus, laevis, punctis elevatis pallidioribus; sparsis, intus pallide cinereus. *Folia* brachiatim opposita, petiolata, pinnata, quadrijuga

ga cum impari: foliolis oppositis, vix spithamæis, sessilibus, lanceolatis, serratis, utrinque attenuatis, apice producto, lanceolato; utrinque glabra, supra saturate viridia, subtus cinerea. Petioli glabri, supra plano-concavi, subtus convexi, basi clavati. Rachis intra folia teretiuncula, utrinque compressa, supra carinata. Axillæ foliorum instructæ Gemmis futuri anni, subrotundis, convexis, atris, glabriusculis, magnitudine hemisphærii seminis Pisii.

PROPR. rec. corticis: Odor nū'lus; sapor acerbus; *foliorum:* Odor nullus; sapor acerbo-americans.

VIRTUS: adstringens.

USUS.

OBS. 1. Infusum aquosum folior. rec. luteum, americanus; vitriolo martis nigrescit.

OBS. 2. Adversus *Serpentum morsum* cum successu adhibuit cl. L. MONTIN (*) folia Fraxini recensia. Contudit illa cum vino gallico, succumque expressit, cuius uncias 2 propinavit bis in hora per diem, sicque continuavit, quoad omnia symptomata prorsus remiserunt. Externe folia contusa loco læso applicuit. Sic unum Colubri Chersæ, & plures Colubri Beri iectu correptos se persanasse refert. Sunt qui multum sperant de Cortice Fraxini, in læte vel aqua cocto, adversus vermes, atque etiam contendunt, hunc corticem læpe vermes pepulisse, ubi alia fefellerunt.

522. FRAXINUS Ornus. LINN. Sp. pl. 1510. Mat. m. 476.

Ornus. DALECH. Hist. 83.

Fraxinus tenuiore & minore folio. BAUH. Hist. 1. p. 177.

Pharm.

(*) Kongl. Vetensk. Acad. handl. vol. 26. p. 151.

Pharm. MANNA CALABRINA, TABULATA.
Locus. Europa australis, Calabria, Sicilia,
mons Garganus. Arbor.

FORMA. Succus melligenus, exsiccatus, facie mellis crystallisati, subfriabilis, albido-lutescens, occurrens vel in frustulis solidis, oblongis, subtubulosis, molliusculis, fragilibus: fracturis granulatis, albidioribus; vel in frustulis laxe conglomeratis, mollibus, plasticis, fragiliusculis.

PROPR. Odor nullus; sapor melligenus, dulcis, subaceſcens; masticata primum subfarinosæ ſentitur: inter dentes molliter subarenulosum quid mentitur, mox solvitur, acuteque sapidus evadit. Solvitur Manna in aqua pura, citius in calida: ſolutione limpida, colore aqueo, ſublutescente, dulci, quæ cum vitriolo martis invaria- ta perſiſtit, & cum alcoh. vini non præcipitatur. Ad ſui ſolutionem requirit anaticam partem aquæ calidæ, ſalva limpiditate colaturæ; ſed ut hæc ſolutio refiguit, ſponte crystallifatur, & plurimum mannae ſub forma crystallina ad fundum deponit. Solvitur etiam in Spiritu vini, ſub di-geſtione: ſolutione limpida; quæ, refige- rata, floccos ad fundum demittit albissimos, ſac- charinos. Manna cannulata in ſpiritu vini recti- ficato, in calore balnei digeſta, ſolvitur. Scil. Spir. vini rectif. drachm. 5 ſolvunt Mannae gran. 40: ſolutione limpida; quæ, per chartam calide filtrata, adhuc limpidior fit; ſed inter refri- gerandum abit in maſſam mollem, butyraceam, albissimam, axungiæ porcinae ſimilem, dulcem, ſed ſapore inſimul ſpiritus vini. Hæc maſſa, in calore leni exſiccata, ſicca evadit, ſubmollis ta- men, albidior, & longe facilius ſolvitur in aqua frigida, quam ipla Manna; quæ ſolutio, dum

vitro infunditur & in calore sicco evaporatur, super latera vitti crystallisatur, sub forma vegetativa, muscosa. Manna solvitur præterea in acetato vini, fero lactis, decocto Tamarindorum, jusculis. Sed non solvitur in oleo expreso, si-
ve digestione seu trituratione, nec obtinetur Emulso ex manna, oleo expreso & aqua. Ignis flaminæ admota Manna, funditur, fremit, non accenditur, sed destillat, odore Sacchari tosti, & si in charta excipitur, refert saccharum fusum, verum mollior est, tenaciuscula, subdiaphana, & masticata dentibus adhæret, sapore sacchari tosti. In vase ferreo supra ignem funditur, ebullit, spumescit, fulcescit, & admota flamma tarde accenditur, tumet, & flagrat tandem cum strepitu: flamma perbelle cærulea, planiuscula, vix fumante, non fuliginosa, odore fragrante sacchari accensi, remanente carbone conico, atro, rugoso, molliusculo, levissimo, inquinante. Manna fermentationem subit vinosa & spirituosa, ubi l. a. tractatur.

VIRTUS: edulcorans, eccoprotica, obtundens, pectoralis.

USUS. Laxans infantibus, Colica nephritica.

OBS. I. Manna triplici modo in Calabria colligitur. A medio Jūnii ad finem Julii, cælo sereno, calore solis extrahitur, e trunko & ramis arboris, liquor clarissimus, qui sponte in grumos spissescit albidos, postero die mane colligendos, abradendos cultris ligneis, & in sole postea siccandos, atque hic *Manna in lacrymis* vocatur. Sed ab initio Augusti, cum liquor cessat sponte transudare, rustici incisuras in cortice faciunt, unde a calore solis liquor quidam elicetur, qui post in grandes grumos sponte inspissatur, colore magis rubente, & hæc *Manna pinguis l. vulgaris* dicitur.

tur. Porro rustici, mense Junii & Julii, fragmenta ligni seu straminis in arbores illigant, quibus Manna, sub stabilitatis forma, se adfigit, atque illa ideo *Manna cannulata* audit; & haec quidem Manna, ut optima est, ita quoque carius aestimatur (*).

OBS. 2. Laxandi leopo Manna frequentissime prescribitur, dosi unc. 1 vel 2. Raro per se datur, sed solvit plerumque in decocto Tamarind. c. Senni, vel in sero laetis. Mitigat tormenta, quae excitare Senna solet apud sensibiores.

OBS. 3. Manna, quae apud nos officinalis est, in Fraxino Orno colligitur. Sed haec arbor non unica est, quae Mannam producere potest. Observavit ill. DUHAMEL (**), *Salicem* in intenso solis ardore Mannam transudare. Manna Persica ex *Hedysaro Albagi* desumitur, ut notavit RAUWOLF (***) & obvenit in gratis parvis, subrotundis, lutescentibus, seminibus Coriandri paullo majoribus; atque cognita est sub nomine *Transchibil* vel *Tarandsjubin*. Omnino consimilem Mannam in *Pinu Larice* collegit idem RAUWOLF. In *Quercubus* ad Merdinum Turciæ, ad Khounsar Persiae, & in Arabia, aliam Mannæ speciem observarunt el. NIEBUHR (†) & OTTER (††). Haec Manna sub dupli forma occurrit, & mensibus Julii & Augusti supra arbores proventit. Communiter secca est, & ante solis ortum colligi debet, arbores quaiendo dum decidat; ex solis calore liqueficit & destillat, inepta iunc collectioni. Hanc Mannam sicciam *Kiezenguioui* vocant Kiurd; quæ vero sub au-

G g g 2 tum-

(*) Cfr. DUHAM. *tr. des Arbres*, vol. 1. p. 250; DOMIN. CYRILLO in *Philos. transact.* vol. 60 p. 235. Cfr. etiam *Philos. transact.* vol. 46 p. 470.

(**) *Physique des Arbres*, part. 1. p. 152.

(***) *Raiss in die Morgenländer*, p. 94.

(†) *Beschreib. von Arabien*, p. 145.

(††) *Voyag. en Turqu. & en Perse*, tom 1. p. 197. t. 2. p. 268.

tumno defluit, liquida est, & *Dgezek* ab illis nuncupatur.

OBS. 4. De Manna scripsere plures, inter quos eminent GEOFFROY (*) & E. A. NICOLAI (**). N. CLEUBERG (***) satis quidem operose scripsit de Manna, sed hypothesis induxit, & varia ex auctoribus compilavit. Differentiam Mannæ officinalis & Israëliticæ fusius exhibet.

ORDO TRIOECIA.

523. CERATONIA Siliqua. LINN. *Sp. pl. 1573.*

Mat. m. 455. HASSELQ. It. palestin. 492.

Siliqua edulis. DUHAMEL *Arbr. 2. p. 262. t. 69.*

Carobe. BLACKW. *Herb. t. 209.*

Ceratonia. DALECH. *Hist. 112.*

Siliqua. CAMER. *Epit. 139.*

Pbarm. SILIQUA DULCIS.

Locus. Europa australis, Oriens. Arbor.

FORMA. sicc. Legumen palmare vel ultra, unidique fusco-brunneum, glabrum, nitiduscum, lineare, latitudine apicis digiti, obtusum cum puncto convexo, multiloculare; parencymate leguminis pulposo: pulpa siccata rufa. *Semina* solitaria in singulo loculamento, ovata, obtusa, glabra.

PROPR. Odor nullus; sapor dulcis, melligenus; masticata siliqua sicc. fragiliscula, comminuitur, extrahitur pulposum: saliva rubicunda. *Siccatæ* siliquæ sapidiores, quam recentes.

VIRTUS: edulcorans.

USUS. Tuflis.

OBS. 1.

(*) *Traité de la Mariere med. t. 4. f. 1. p. 125*

(**) *Syst. Mat. medicæ p. 319.*

(***) *Diss. de Manna, Præf. P. HOFFWENIO, Upsal. 1681.*

OBS. 1. Si Siliqua dulcis in aqua, balnei calore, digesta fuerit, *infusum* dat rubrum, odore ungventario, sapore dulci, in infusum Maltae incidente, & vitriolo martis statim nigro-fuscescente. Si hoc infusum caute inspissatur, abit in *Extractum* obscure rubrum, subdiaphanum, tenax, in fila ductile, dulce; quod, chartæ illinitum, adhæret, non vero glutinat.

OBS. 2. Gentes orientales succum melleigenum ex hisce siliquis exprimunt, quo Condita sua sæpe præparant; BOECLERUS.

524. FICUS Carica. LINN. Sp. pl. 1513. Mat. m.

478. KNIPH. Bot. orig. cent. 2. TREW. Ebret. 73, 74.

Ficus. DALECH. Hist. 336. DODON. Pempt. 780.

BLACKW. Herb. t. 125. MERIAN. Surin. p. 33. t. 33.

α.) Ficus sativa fructu globoſo, albo, mellifluo.

DUHAM. Fruit. 1. p. 210. t. 1.

β.) Ficus sativa fructu violaceo longo, intus rubenti. DUHAM. Arbr. 1. p. 236. t. 99. Fruit.

p. 213. t. 2. f. 2.

γ.) Ficus sativa fructu parvo, globoſo, violaceo, intus rubente. DUHAM. Fruit. p. 212. t. 2. f. 1.

Pharm. CARICÆ PINGVES.

Locus. Europa australis, Oriens, Asia. Arbor.

FORMA. rec. Pedunculi laterales, breviusculi, uniflori, subangulati. Bracteæ: squamæ 3, subcarnosæ, planæ, ovatae, acutiusculæ, adpressæ, baccam calycis instar basi fulcientes, virides. Baccæ magna, turbinata, e receptaculo carnosæ orta, magnitudine fructus Pyri vel supra, colore viridi-lutescente vel violaceo, pro ingenio cuiusque varietatis, nitidiuscula, apice obtuso-rotundata, undique striata, umbilicata: umbilico orb-

biculato, vix prominente, perforato, sed simul subclauso: squamis plurimis, ovatis, acutis, subcarnosis, glabriusculis, subæqualibus, imbricatis, adpressis; in bene vero matura bacca umbilicus hiat. *Parencyma* rite maturæ baccæ carnosò succulentum, molle, rubicundum, centro cavo, intus undique vestito seminibus; siccatae vero baccæ turgidum pulpa melligena, rubicunda, subdiaphana, tenaci, digitis se adglutinante, & referta seminibus numerosis, parviusculis, ovatis, obtusis, lutescentibus, dorso convexis, antice margine acutiusculo, compressiusculis, glabris, hilo marginali, prope apicem, puncto parvo.

PROPR. rec. Odor vix ullus; *sapor* dulcis, in cucumerinum leniter incidens; *masticata* bacca recens mucilaginosa, solvitur qua majorem partem. *Sicc. odor* subunguentarius; *sapor* dulcis, melligenus, odori consentaneus, gratus; *Caricæ masticatae* glutinosæ; solvitur pulpa melligena, corticali parte molli, subpulposa, comminuenda.

VIRTUS: nutriendis, emolliens, maturans, pectoralis.

USUS: Tussis, Furunculus, Abscessus, Angina.

OBS. 1. Fructus *Ficus* est bacca, ex receptaculo carnosò succulento orta, uti fructus *Fragariæ*, sed modo contrario; nam in *Ficus* semina latent intra receptaculum, dum in *Fragaria* externe sita sunt.

OBS. 2. *Caricæ pinguis officinarum* sunt fructus *Ficus arboris*, bene maturi & probe siccati. In Europa australi, ubi rite maturuerunt, & in sole siccatae sunt, in cistulas immittuntur, postque per Europam dividenduntur. Sub frigidiori cælo semina maturitatem non sequuntur. Apud nos frigidaria per hiemem tinentur arbores, quare etiam æstivo tempore fructus ad quendam

dam maturatis gradum pervenient, satque sapidi fiunt, sine tamen seminibus perfectis, sed tantummodo eorum rudimentis. Hi fructus, dum resecantur, internam superficiem scabram e floribus persistentibus monstrant; & in sole siccati extus nigrescunt, siccii evadunt & parum pulposi, attamen dulcescentes. Atqui Caricæ, quæ ab Europa australi afferuntur, præstantissimæ sunt, & non caprificatæ; ex apice ad basin compressæ occurunt, orbiculos referentes, eosque molles, luci expositæ subdiaphanæ. Hæ Caricæ diu quidem se fastinere possunt, ast post aliquod tempus ex illis efflorescit pulvis saccharatus, quo undique obreguntur, & ut ille pulvis maxime efflorescit, ita maxime effœtæ evadunt ipsæ Caricæ, saporem dulcem perdunt, vappidæ fiunt s. amaricantes, & tandem putrescunt, cum quodam fætore. Hinc præstant caricæ non saccharatæ.

OBS. 3. Solvitur pulpa Caricarum secundum partem in aqua frigida, perfectius vero in fervida: *infuso* rubicundo, turbiduscculo, subopaco, dulci, odore & sapore Caricarum, a vitriolo martis nil demutato. In sole collocatum hoc infusum perfecte fermentescit; quod etiam valet de decocto Caricarum. Pulvis saccharatus Caricarum pariter solvitur in aqua pura, & solutio collata nullas crystallos mihi dedit, ob glutinosum prædominans.

OBS. 4. Ficus fructus immaturus, sauciatus, lac stillat acre, sicut etiam tota arbor.

OBS. 5. *Caprificatio* Ficuum in Europam superiorem nondum introducta, sed in Melita & Archipelagi insulis frequentissima est. Ad florum fœcundationem nihil confert Caprificatio, quod quidem plures putarunt, si quidem Caricæ europææ semina perfecta perficiunt, quæ, ubi seruntur, rite progerminant. Huc accedit, quod Cynipes ipsa germina corrodunt, prout obser-

vavit F. HASSELQUIST (*). Nec bonitati fructus hac encheiresi consulitur. Econtra Caricæ caprificatæ dexteriores evadunt; nam quod ad partem substantia mel-ligena a vermiculis consumitur, quare etiam semper sicciores deprehenduntur quæ caprificatæ fuere, ad quod id quoque confert, quod in furno siccandæ erunt, ut verminosa nidisicia destruantur. Itaque prudenter agunt, qui a caprificatione abstinent. Verisimile est, Caprificationem nihil aliud efficere, quam ut citius infrescat atque maturetur fructus,

CLAS-

(*) *It. palestin.* p. 425.

CLASSIS XXIV.
CRYPTOGAMIA.
ORDO
FILICES.

525. **EQUISETUM** hyemale. LINN. *Sp. pl. 1517.*

Equisetum. CAMER. Epit. 770. f. A.

Pharm. EQUISETI MAJORIS Herba.

Locus. Europa, in sylvis asperis, uliginosis.

Perenne.

FORMA. rec. *Radix* subcylindrica, nigricans, geniculata, scabrida, descendens, fibris laterali- bus, capillaribus. *Caulis* pedalis, pallidus, er- ectus, simplicissimus, teres, undique striatus: striis elevatis, scabris: punctulis parvis, elevatis, du- ris, serie longitudinali dispositis; geniculatus: geniculis coarctatis, cinctis *Vaginis* pyxidatis, cy- lindricis, undique striatis, truncatis, margine minutim crenulatis, duas lineas longis, cauli concoloribus, sed apice & basi nigris, saepe etiam omnino nigris, pariter scabris. *Spica* terminalis, solitaria, ovata, acuta, basi cincta *vagina* serra- ta, sessilis, albida.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* debilis.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. I. *Infusum* aquos. lutescens velut potus theæ, odore fere infusi Theæ sinefisis; sapore in eandem Theam incidente; vitriolo martis fuscescit.

G g g s

OBS.

OBS. 2. *Equisetum arvense* LINN. *Sp. pl.* 1516. apud nos etiam officinale est, & *Equisetum minus* in officinis vocatur. In omnibus cum Equiseto hyemali convenit, & perinde fuerit, quænam species sumatur.

526. ASPLENIUM Scolopendrium. LINN. *Sp. pl.* 1537. *Mat. m.* 481.

Lingva cervina officinarum. PLUM. *Filic.* 34.
t. A. f. 4. BLACKW. *Herb. t.* 138.

Phyllitis. CAMER. *Ep.* 579. DOD. *Pempt.* 464.
Pharm. *SCOLOPENDRII* Herba.

Locus. Europa australis. *Perenne.*

FORMA. *Filix* stipite cylindrico, crassitie vix culni fecalini, palmari, glabro, hinc convexo, inde planiusculo, erecto, apice scabro: squamis plurimis linearibus, acutis, ferrugineis. *Frons* integririma, spithamæa, lanceolata, acuta, utrinque glabra, instructa nervis tenuibus, furcatis, subtransversalibus, parallelis; versus basin paululum angustior, basi excavata. *Fructificationes* in aversa pagina, lineares, subtransversales, parallelæ, frequentes.

PROPR. *rec.* Odor ingratus; sapor acerbus; *siccatione* odor prorsus perit.

VIRTUS: adstringens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum colore infusi Theæ; sapore validiusculo; vitriolo martis fusco-nigrescit.

527. ASPLENIUM Ceterach. LINN. *Sp. pl.* 1538.

Mat. m. 482. BLACKW. *Herb. t.* 216. PLUM.
Filic. 33. *t. B. f. 3.* BARREL. *Icon.* 1043. 1044.
Pharm. *CETERACH* Herba.

Locus. Europa australis, Oriens. *Perenne.*

FOR-

FORMA. *Filix* stipitibus aggregatis, filiformibus, pollicaribus, compressiusculis, ancipitibus, glabris. *Frons* semidigitalis vel ultra, supra glabra, runcinata: lobis ovatis, obtusis, integris, alternis, confluentibus. *Fructificatio* totam paginam inferiorem tegens, squamuosa: squamuolis linearibus, acutis, viridibus, imbricatis, adpresso-sculis.

PROPR. *Odor* debilis; *sapor* herbaceus, sub-adstringens, submucilaginosus.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum rubicundum, subaromaticum, leniter substypticum; vitriolo martis fusco-nigrescit.

528. ASPLENIUM Trichomanes. LINN. Sp. pl.

1540. Mat. m. 483.

Trichomanes seu Polytrichum officinarum.

PLUM. Fil. 26. t. V. f. 1.

Trichomanes. CAMER. Epit. 925. DOD. Pempt.

468. BLACKW. Herb. t. 370.

Pbarm. TRICHOMANIS Herba.

Locus. Europa, Oriens. Perenne.

FORMA. *Filix* stipitibus aggregatis, filiformibus, nigricantibus, laevibus, nitidiusculis, subflexuosis, erectis, hinc convexis, inde planiusculis, biangulatis. *Frons* stipite longior, rachi nigricante e stipite continuato orta; pinnata: pinnae suboppositis, subsessilibus, ovatis, obtuso-roundatis, supra glabris, sublineatis, crenatis, patentibus, basi sursum lationibus. *Fructificiones* sitæ in squamis oblongis, paginæ inferiori adnatis, sparsis.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* subdulcescenti-adstringens.

VIR-

VIRTUS: leniter adstringens.
USUS.

529. ASPLENIUM *Ruta muraria*. LINN. *Sp. pl.* 1541. *Mat. m.* 484. BREYN. *Centur.* t. 97.

Paronychia. CAMER. *Epit.* 785.

Ruta muraria. DOD. *Pempt.* 467.

Pharm. *RUTÆ MURARIÆ* Herba.

Locus. Europa, e rupium fissuris. Perenne.

FORMA. *Filix* stipitibus aggregatis, filiformibus, subangulatis, erectis, inferne nigricantibus, superne viridibus, glabris. *Frons* longitudo stipitis, rachi e stipite continuato, compressa, disticha, viridi; pinnata: pinnis alternis, petiolatis, cuneiformibus, nervosis, glabris, apice obtuso-rotundatis, crenatis, sublobatis, remotiusculis, erecto-patentibus. *Fructificationes* sitæ in squamis linearibus, sparsis, paginæ inferiori longitudinaliter adnatis.

PROPR. *Odor* nullus; *sapor* subdulcescens, acerbiosculus, subadstringens.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

OBS. *Infusum* aquosum lutescens, limpidum, subdulcescens, substypticum; vitriolo martis fusco-nigrescit.

530. POLYPODIUM *vulgare*. LINN. *Sp. pl.* 1544.

Mat. m. 485. PLUM. *Fil.* 27. t. A. f. 2.

Polypodium majus. DOD. *Pempt.* 461.

Polypodium quercinum. BLACKW. *Herb.* t. 215.

Polypodium. LUDW. *Ectyp.* p. 9. t. 18.

Pharm. *POLYPODII* Radix.

Locus. Europa, e rimis rupium. Perenne.

FORMA. *rec.* *Radix* horizontalis, repens, cylindrica, crassitie pennæ anserinæ, undique tuber-

tuberculata: tuberculis elevatis, truncatis, sparsis, remotis; undique vestita tegmine e squamis ferrugineis, emarcidis, lanceolatis, acutis, imbricatis; radicans fibris plurimis elongatis, filiformibus, ramosis, tomentosis, ferrugineis, descendenteribus, longitudinaliter dispositis. *Parencyma carnosum*, albidum, subrubescens, post sectio- nem transversalem æquale, punctis sparsis.

PROPR. rec. *Odor* ipsius radicis nullus; tegminis vero muscosus. *Sapor* prædulcis, remissior quam Liquiritiae; *masticata* comminuitur, dulcis sentitur, sed insimul subamaricans.

VIRTUS: edulcorans, pectoralis; *rec.* ecco-
protica.

USUS. Tussis, Arthritis.

OBS. *Infusum* aquosum radic. rec. limpidum, sub-
citrinum, dulcissimum, odore debilissimo; cum vitr.
martis fuscescit.

531. POLYPODIUM *Felix mas.* LINN. *Sp. pl. 1551.*

Mat. m. 486. KNIPH. *Bot. or. cent. 6.* GUNN.

Fl. norv. 4.

Felix mas. FUCHS. *Hist. 594.* DOD. *Pempt. 459.*

BLACKW. *Herb. t. 323.*

Fougère mâle. *Traité contre le Ténia, tab. 3.*

fig. A — P.

Pharm. *FILICIS Radix.*

Locus. Europa, in sylvis sterilibus. *Perenne.*

FORMA. rec. *Radix* oblonga, crassa, subhorizontalis, undique extus conflata e bulbis parallelis, approximatis, ovato-oblongis, acutis, nigricantibus, laeviusculis, sive obtectis squamis paleaceis emarcidis, ferrugineis, oblongis, nudis sive in stipites frondium se exserentibus, ex ipsa radice protrusis. *Parencyma subcarnosum*, albi-
do-

do-lutescens, post sectionem transversalem notatum disco æquali, margine lobato.

PROPR. rec. Odor debilis, subnauseosus; sapor substypticus, non ingratus; masticata comminuitur, lingvæ imprimit saporem peculiarem, debiliter subaromaticum, vix dulcescentem, acrisculum.

VIRTUS: anthelminthica, emmenagoga, abortiva, lac promovens.

USUS. Tænia.

OBS. 1. *Infusum aquosum rad. rec. limpidum, lutescens, odore fungoso, sapore radicis; vitriolo martis nigrescit.*

OBS. 2. Cl. OLIVIER observationem AETIÆ de vi abortiva hujus radicis experimento confirmavit (*).

OBS. 3. Vis hujus radicis specifica ad pellendas Tænias inde ab antiquissimis temporibus nota fuit. Non GALENUS solum, sed & DIOSCORIDES, jusserunt, ut hujus radicis drachmæ 4 ex aqua mulsa pro dosi propinarentur, ad enecandos lumbricos longos & latos. AVICENNA de Tæniis prædicat, quod resistit absynthio, & vix pellenda, nisi Filice. Per seriem temporum a plurimis medicis laudata est hæc radix contra Tæniam, &c, ut observat VALER. CORDUS, germanice dicta est *Faren-Kraut*, h. e. herba ad Tænias, quia specifica facultate infesta deprehensa est lumbricis lati. Nostro ævo FREDR. HOFFMANNUS de hac radice enunciat, quod est lumbricorum longorum & latorum præsentissima pestis. NIC. ANDRY, medicus Parisiensis (**), initio hujus seculi, vim hanc specificam exploravit, exploratamque cum publico communicavit.

Do-

(*) *Journal de medecine de VANDERMONDE*, tom. 12, 1760.

p. 129.

(**) *De la generat. des vers dans le corps de l'homme*. Amsterd. 1701. p. 170. seq.

Docet is, radicem Filicis, dosi drachm. 2 vel 3, cum melle tritam, vel in poculo vini commixtam, Tæniām quidem enecare, sed non expellere, cum per se minime purget hæc radix, eamque ob caussam fvatet, ut purgans postero die propinetur, ad expurgandum vermem mortuum, qui alias putresceret, atque ita nocere posset. Monet insimul, hanc dosin, quandoquidem non semper juvat prima vice, repetendam ter quaterve, singulis alternis diebus, sed assidue purgandum diebus intercalaribus. Infantibus teneris & latenteribus injungit dosin drachmæ $\frac{1}{2}$ in laete, distribuendam bipartito, nempe grana 15 una hora, & 15 iterum altera, & postmodo laxans die sequenti. Observat generatim, expedire illis, quibus alvus laxa sit, ut anthelminthica ista restringentibus maritentur, ne justo citius per tubum intestinalem decurrant. Addit denique, hanc radicem, nimirum Filicis fœminæ quam plerumque usus fuit, convenire omnibus subiectis, tam infantibus quam adultis, etiam febre laborantibus, semperque symptomata mitigare. Cl. MARCHANT (*) testatur, constare innumeris experimentis, radicem Filicis esse mire bonum & certum remedium ad expellendos vermes. Post tam lucidam prælatam facem, medici tamen sequentis intervalli circa curam Tæniæ cæcutierunt, nimis parca dosi peccantes, quo ipso locum reliquerunt arcanariis rem notam inter arcana sua antidota referendi & ultro citroque venditandi. Inter hos eminuerunt ipse ille ANDRY ejusque gener DIONIS, qui potionem quandam, cuius basis erat radix Filicis, adornarunt, & ut eximium contra Tæniām specificum præconiaverunt. Prodiit post deinde cl. HERRENSCHWAND cum suo specifico adversus Tæniām, quod quidem ita se habet: Rr. Rad. Filicis gr. 15-30, G. Gutt. gr. 1-5, herb.

(*) Hist. de l'Academie des sciences, 1714. p. 49.

herb. Gratiol. gr. 5 - 12; Mr. f. pulvis, dosi ad eum jusque subiecti ætatem aptata. Jussit tres tales doses esse ad manus. Ordiendum svasit a purgante quodam ex Mercurio dulci & Diagryd. sulphur. ana gr. 10; sequenti die mane sumendum esse primum pulverem e tribus illis supradictis, qui etiam communiter vomitum movit cum purgatione alvi; porro post duas horas propinandum pulverem secundum, qui valide purgavit, & plerumque Tæniam expulit; tandem vero, si Tænia non secederet, sumendum præcepit pulverem tertium post alias binas horas. Tamen sœpe accidit, ut Tænia non ante posterum diem abierit (*). Ad extremum vidua cuiusdam Chirurgi in Helvetia, nomine NOUFFER, specificum contra Tæniam venditavit, bonoque cum successu adhibuit, partim ipsa, partim per emissarium cl. MEURICOFFRE, qui ejus rei caussa Europam fere totam peragravit. Atque ab hac denique vidua Rex Galliae nuper, amore ductus scientiae ut & pietate erga miseris, dictum arcana magno satiis pretio mercatus est, moxque ut publici juris fieret clementissime jussit. Ipsius etiam nutu ac mandato experimenta indubia super vera ratione & efficacia memorati remedii instituta fuere, atque postmodum formula totumque regimen typis divulgata (**). Basis hujus remedii est radix Filicis maris, sat larga dosi propinata. Sumendum laxans quoddam, si opus fuerit, & cœna sit brevis, juseulum duntaxat panis. Postero die mane æger deglutiat pulveris rad. Filic. drachmas 3, cum aqua still. Filicis vel flor. Tiliæ commixtas. Infantes dosi parciore pulverem radieis sumant. Si mixtura hæc nau-

(*) Cfr. ill. b. m. Nic. Rosén von ROSENSTEINS under-rättelse om barns sjukdomar, edit. 3. p. 377

(**) Précis du traitement contre le Ténia ou Ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné & approuvé à Paris. Publié par ordre du Roi. Paris 1775

nauseam moverit, corticem citri masticare licebit, vel fauces eius poterunt grato quadam liquore. Sed si vomitu rejiciatur pulvis, integra dosis denuo propinanda. Bihorii spatio post sumtam radicem, propinetur bolus purgans, ex panaceæ mercurialis & resinæ Scammoniæ ana gran. 12, atque gummi Guttæ gr. 5; quæ dosis respectu ætatis & constitutionis ægrorum moderanda erit. Post sumtum bolum, hauriantur infusi Theæ viridis vascula bina, quæ repetenda sub in sequente purgatione. Sub toto hoc decursu æger supra sellam perforatam continue sedere debet, usque dum Tænia exclusa fuerit, quo facto juscum carnis porrigeret licebit. Si bolus purgans alvum sufficienter non solverit, post 4 horas salis Anglic. unciam ½ vel 1, in aqua solutam, dare oportet, præsertim si Tænia secedere nolit, vel etiam si ex ano dependeat, quo quidem in casu dissuadenda tæniæ extractio, ut ne aliquo loco abrumpatur. Si Tænia primo die non abierit, proximo die manœ repetenda est dosis integra radicis, sed sufficit tunc dedisse purgans salinum. Atque hocce modo pluries repeti potest hæc cura, dum sanitatem integrum recuperet æger. Ceterum hæc omnia fusius legi poterunt in posteriore libello, regio jussu typis vulgato (*). Nos hac via særissime Tænias expulimus, & vidimus ægros, qui pluries cursum hunc peregerunt, quavis vice exclusis Tæniis, unde patet, plures Tænias apud unum idemque subjectum simul & semel esse posse, quod etiam ex eo evincitur, quod 2 vel 3 Tæniæ cum tenui extremitate unica vice propulsæ observatae sint.

532. ADIANTHUM pedatum. LINN. Sp. pl. 1557.

Adianthum americanum. CORNUT. Canad. 7.

t. 6.

H h h

Adi-

(*) Traitement contre le Ténia ou Ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné & éprouvé à Paris; publié par ordre du Roi, Paris 1775.

*Adianthum fruticosum americanum, summis
ramulis reflexis & in orbem expansis.* PLUK.

Almag. t. 124. f. 2.

Pharm. ADIANTHI Herba.

Locus. Canada, Virginia. Perenne.

FORMA. *Filix* stipite filiformi-cylindrico, nigricante, lucido, lœvi, erecto, longitudine frondis. *Frons* pedata. *Rachis* e stipite continuato, compressa, ramis alternis, erectis, stipiti conformis. *Folia* alterna, breviter petiolata, distiche patentia, viridia, nervoso-lineata: nervis obsoletis, parallelis, unde subrugosa apparent; semirhombea, basi recta, margine inferiore integro, superiore inciso, crenato, apice obtuso-rotundato, pariter crenato; terminalia cuneiformia. *Fructificationes* marginales, terminales, margini folii reflexo & adpressoculo insidentes.

PROPR. *Odor* debilis; *sapor* acerbiusculus.

VIRTUS: leniter adstringens.

USUS.

533. ADIANTHUM Capillus veneris. LINN. Sp.

pl. 1558. Mat. m 480.

Adianthum. CAM. Epit. 924. DOD. Pempt. 466.

Pharm. CAPILLI VENERIS Herba.

Locus. Europa australis. Perenne.

FORMA. *Filix* magnitudine varia, palmaris, spithamæa, pedalis. *Stipes* longitudine frondis, niger, glaber, lucidus, filiformis, subangulatus, erectus. *Frons* decomposita. *Rachis* e stipite continuato, ramosa, stipiti coneolor. *Folia* alterna, erecta, petiolata, cuneiformia, ovato-rotundata, instructa nervis parallelis, tenuibus, glabra, inferne longius producta, sensim angustiora, integra, superne inciso-lobata: lobis parallelis,

lelis, apice crenatis. Petioli capillares, fuscæ, læves. Fructificationes lunulatæ, marginales, in apice foliorum sitæ, reflexæ, adpressiæ, fuscæ.

PROPR. Odor debilis; sapor sub dulcescens, subadstringens, leniter amaricans, non ingratus.

VIRTUS.

USUS.

OBS. Infusum aquosum lutescens, vix dulcescens, leniter substypticum, vitriolo martis fulco-nigrescit.

ORDO MUSCI.

534. LYCOPODIUM clavatum. LINN. Sp. pl. 1564.

Mat. m. 488.

Lycopodium vulgare pilosum anfragosum &
repens. DILL. *Musc.* 441. t. 58. f. 1.

Muscus terrestris clavatus. PLUK. *Phyt.* t. 47.
f. 8.

Muscus terrestris s. Lycopodium. DOD. *Pempt.*
469.

Pbarm. MUSCI CLAVATI Herba, Farina.

Locus. Europa, in sylvis muscosis. Perenne.

FORMA. *Caulis* filiformis, teretiusculus, repens, pedalis vel ultra, ramulosus, undique imbricatus *foliis* linear-i-lanceolatis, glabriusculis, linea paullo longioribus, subciliatis, terminatis seta tenui, inferne adpressis, superne patentibus. *Rami* sparsi, cauli conformes, erecti, simplices & ramulosi. *Pedunculi* in ramis terminales, solitarii, erecti, biplicares, vestiti *foliis* subimbricatis, caulin's conformibus, verum paullo latioribus, erecto-patientibus. *Spicæ* geminæ, cylindricæ, erectæ, imbricatae. *Pollen* (*farina*) fa-

H h h 2 rina-

rinaceum, sublutescens, tenue, inter digitos molliuscum.

PROPR. herbæ: Odor vix ullus; sapor debilis. Farinæ: odor nullus; sapor nullus. Cum aqua difficillime subigitur pollen hoc, non coit in pastam, sed extenditur supra aquæ frigidæ superficiem in pelliculam sicciam, mollissimam, & sub agitatione globulos format sphæricos, currentes, qui tamen ex pressione digitii franguntur, exeunte aqua. Diutina agitatio cum aqua miscetur quidem, sed quiete secedit partim ad fundum, partim in pellem superindutam. Idem ferre accedit cum aqua calida. In candelæflammam immisum accenditur cum fulguratione & fremitu, perinde ac pulvis pyrius; sed in vase quodam in acervum cumulatum, ex admota ignis flamma primum nigrescit, ubi a flamma tangitur, deinde tranquille accenditur, flagrat: flamma vivida, basi cœrulea, nidorosa, non fuman- te, nec fuliginosa. Carbonibus ignitis adspersum non accenditur, nec fulgurat, sed fumat. Vasi immisum supra ignem non accenditur, sed valde fumat: fumo spisso; & validum spargit nidorem, fere ut oleum ceræ; brevi nigrescit & abit in pulverem atrum, fuliginosum, inquinantem, qui, ignis flammæ, antequam desinit fumare, inspersus, accenditur cum fremitu, minori tamen fulguratione. Sic pollen Lycopodii valde inflammabile est. Quamvis ab ignis flamma semper accendatur, non tamen fulgurat & fremit, nisi in aëre libero, quo undique circumdata erit. Inflammabile autem hoc, quo scatet pollen Lycopodii, est vera Cera cruda. In veritatem hujus rei inquirens, farinæ Lycopodii uncias 2 per retortam caute destillavi. Ex

sup-

supposito igne sensim nigrescebat pollen, inque recipiente tandem deprehendebantur drachmæ 3 pblegmatis lutei, odore & sapore empyreumatico, falso-acidulato; & drachmæ 3 *Olei liquidi*, nigricantis, odore & sapore olei ceræ. In collo retortæ mansit oleum *butyraceum*, tale omnino, quale haberi solet dum cera citrina destillatur, consistentia ungventi mollis, colore fusco-luteo, odore & sapore prioris olei, pondere drachmæ unius. In fundo retortæ remanebat *Carbo* ater, splendens, solidus, fragilis, debiliter inquinans, levis. Dum oleum liquidum rectificatur, verum oleum ceræ accipitur. Paria consecaria obtinui ex polline antherarum aliarum plantarum destillato. Sic præexistit cera in omnibus floribus, & quidem in omni polline antherarum deprehenditur; sed melliferæ apes, exstruentes fayos, ipsam ceram extrahunt, concoquunt, a fodiibus liberant, & in ceram perfectam vertunt, instinctu naturæ, ab arte inimitabili.

*VIRTUS:**USUS: farinæ: Excoriatio.*

OBS. In ignibus artificiosis hoc pollen adhibetur, etiam a Persis, qui illud a Moscovitis emunt. Colligitur in Russia fine mensis Augusti & per totum Septembrem, resectis & in furno siccatis spicis, quæ deinde farinam largiuntur; OLEARIUS (*). Colligitur etiam in Finlandia nostra.

535. LYCOPODIUM Selago. LINN. Sp. pl. 1565.

Mat. m. 487. CED. Icon. t. 104.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. DILL. Musc.

435. t. 56. f. 1.

H h h 3

Pbarm.

(*) Orientalische Reise-beschreibung, p. 331.

Pharm. MUSCI ERECTI Herba.

Locus. Europa borealis, Virginia, in juniperetis. Perenne.

FORMA. Caulis erectus, vel inferne procumbens, teretiulus, vix spithameus, dichotomus, octofarium undique imbricatus foliis linear-lanceolatis, acutis, glabris, vix semiunguicularibus, erecto-patentibus. Flores sparsi, solitarii, in axillis foliorum, sessiles.

PROPR. Odor vix ullus; sapor debilis.

VIRTUS: purgans, draistica.

USUS.

536. POLYTRICHUM commune. LINN. Sp. pl.

1573. Mat. m. 489.

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ferratis. DILL. Musc. 420. t. 54. f. 1.

Polytrichum aureum. BLACKW. Herb. t. 375.

Muscus capillaris. DOD. Pempt. 472.

Pharm. ADIANTHI AUREI Herba.

Locus. Europa, in humidis & uliginosis. Perenne.

FORMA. Caulis pollicaris, saepe longus, pro ratione soli, erectus, simplicissimus, inferne nudus, superne undique vestitus foliis linearibus, acutis, angustis, supra carinatis, undique patentibus. Pedunculus terminalis, setaceus, caule longior, erectus. Antera cernua, ovata, basi innixa apophysi, apice ore orbiculato, ciliato. Calyptra villosa.

PROPR. Odor vix ullus, neque sapor.

VIRTUS:

USUS.

OBS. Infusum aquosum rubescens, sapore fatuo; eum vitriolo martis obscurascit.

OR-

ORDO

ALGÆ.

537. LICHEN islandicus. LINN. *Sp. pl. 1611. Mat. m. 493.* OED. *Icon. t. 155.* SCOPOL. *Ann. 2. p. 107.* *

Lichen terrestris, foliis Eryngii, BUXB. *Centur. 2. p. 11. t. 6. f. 1. 2.*

Lichenoides rigidum, Eryngii folia referens. DILLEN. *Musc. 209. t. 28. f. 111.*

Lichen pulmonarius minor angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus. MICH. *Gen. 85. t. 44. f. 4.*

Muscus catharticus. BORRICH. in BARTHOLIM. *Aet. Hafn. vol. 1. p. 126.*

Pharm. MUSCI ISLANDICI Herba.

Locus. Europa, in alpinis & saxetis aridis. *Perennis.*

FORMA. Lichen foliaceus, subcoriaceus, erectus, pallidus, subolivaceus, glaber, lacunulosus, circiter palmaris, levis, laciniatus: laciniis sublinearibus, obtusis, marginibus omnibus ciliatis; apice fusco-olivaceus. *Scutella* orbiculata, integerrima, supra folium posita, plana, solitaria.

PROPR. Odor nullus; sapor leniter amaricans; masticatus emollitur, comminuitur, vix acris.

VIRTUS: rec. eccoprotica; sicc. nutriens, pectoralis.

USUS. Phthisis, Tussis, Hæmoptysis.

OBS. 1. Infusum aquos. limpidiuleulum, sapore amaro; vitriolo martis rubrum evadit. Si Lichen hic, infusione in aqua calida temperatus, coquitur in aqua pura, fit *Decoctum* spissum, gelatinosum; quod refrigeratione ulterius spissescit in *Gelatinam* spissam,

rubicundam, amaricantem, in ore solubilem. Hæc gelatina, chartæ illinita, imperfecte glutinat. Solvitur lente in calore, præsertim si agitetur; & cum vitr. martis fuscescit. Si Gelatina hæc lacte, saccharo, amygdalis, pauxilloque aromatis conditum, satis grata sapidaque fit. Ex Lichene island. infusione in aqua temperato, & deinde in lacte cocto, fit pulmentum leniter americanum, non ingratum.

OBS. 2. In Islandia Lichen hic diuturne alimentum pariter ac medicina incolis existit, de qua re O. BORRICHUS (*): „Eo (Musco cathartico) insulæ coloni primi, mo vere utuntur ad expurgandos humores corporis noxios, reliquo æstatis siccatum in farinam comminunt, & pulmentariis admiscent, exspirante demum vi purgatrice, & succedente alimentaria.“ In hoc quidem puncto, quod Lichen hic purgandi facultate polleat, BORRICHIO minime adstipulatur cl. EGG. OLAFSEN (**), qui potius experientiam Islandorum quotidianam testatur, eum nonnisi moderate ac lenissime alvum solvere, nec quemquam eorum de vi ejusdem purgante unquam fuisse questum. Quinimmo exemplo fœminæ cuiusdam monstrat, profuisse eum ad pertinacem diarrhœam per tempus aliquod cohibendam. Alioqui vim ejus bene & solide nutriendi prædicat, quam tantam esse inquit, ut operarii, tenuem alias vietum aspernantes, hoc satis sint contenti. Juxta vero adeo facilis esse digestionis, asserit, ut etiam adprime conveniat debili stomacho langventibus, phthisique arreptis, atque eapropter frugum loco in communem, per insulam, & quotidianum abiisse vietum. Estur autem Lichen hic communiter in pultem coctus, ad quod requiritur, ut primum frigida per diem maceretur, amaritudinis extrahendæ caussa, & deinde in sero lactis elixe-

(*) In T. BARTHOLINI *Act. med. Hafn.* 1671. p. 126.

(**) *Reise igienenm Island*, tom. 1. p. 159. seq.

elixetur in gelatinam, quam denique una eum admixto lacte manducare moris est. Alii eundem ita apparatus malunt, ut postquam modo jam dicto temperatus fuit, igne vel ardore solis torrefaciant, tum pulverent, & in lacte puro elixent. Panis inde nonnisi perraro coquitur, rem tamen satis bene procedere posse, adjuncta nimirum farina frumenti, ipse ille OLAFSEN periclitatus novit. Cl. N. HORREBOW (*) asseverat, se hunc Lichenem, modo ordinario apparatus, libenter esitasse, tanquam alimentum non solum salubre, sed etiam sapidum, additque, Islandorum complures farina frumenti non uti, ubi locuplete hujus penu gaudent. Neque id mirum, quandoquidem, testante laudato OLAFSEN, una tonna hujus Lichenis, recte emundata & densata, ab illis æquiparatur duabus frumenti tonnis, & perinde alibilis censetur. Solent Islandi ante fœniscium catervatim laxeta aspera petere, ad hunc Lichenem colligendum, qui, quo vegetior fuerit, eo magis ipsis arridet; istæ autem excursiones potissimum insti-tuuntur statu cæli pluvio, ne folia arida manus laedant; neque vero crebrius loca eadem revisitantur, quam triennii spatio interjecto, quoniam planta hæc tres annos requirit in sui incrementum. Peracta demum collectione, suam quisque penum super ignem arefacit, tum in farinam conterit, & in doliola immittit; atque sic denique dictus Lichen merx bene vendibilis evadit; sed tamen sat parvo pretio, uno nempe imperiali, plerumque ibi loci venditur; OLAFSEN (**). Quod ad usum ejus medicum attinet, non ita pridem is latius invaluit. Cl. Jo. A. SCOPOLI (***) casibus quibusdam clinicis commonstrat illius usum insignem in phthisi macieque inde orta, sive in lacte seu aqua coquatur.

H h h 5

Cl.

(*) *Tilforladelige Efterretninger om Island*, p. 88.

(**) L. c. Cfr. tom. 2. p. 816.

(***) *Annus 2. historicò-naturalis*, p. 114 seq.

Cl. J. H. SCHOENHEYDER (*) ex propriis observationibus hujus Lichenis in phthisi utilitatem adstruit. Præscribit Lich. iſl. unc. 1, cum aquæ font. unc. 16, ad remanentiam unc. 12 coquendam, addito syrup. squillit. unc. 3; cujus decocti una. 1 omni bihorio sumant infirmi. Dicit, hoc decoctum subinde diarrhœam excitare, quæ tamen ex propinato Rheo & emulsione Arabica brevi eessat. Ego Lichenem hunc sæpiſſime infirmis præscripsi, & vidi plures, phthisi pulmonali obnoxios, immo & symptomatibus phthiseos vexatos, ex usu pulmenti, e laetè & Lichene hoc temperato parati, de quo libras 2 quotidie hauserunt, in integrum restitutos, atque etiam pingves factos. Ita facilis digestionis pulmentum hoc deprehendi, ut etiam vomitu frequenti chronico afflitti, quique alia esculenta rejecerunt, illud retinere potuerint. Nutrit plenarie, brevi impingvat, & satis grate sapis. Per præviā in aqua macerationem extrahitur, quæ in Lichene inest, amaritudo, sicque vis purgans evanescit. Refert SCOPOLI (**), se in Carniola offendisse mulieres, ingentes Lichenis hujus sarcinas gestantes, quas suibus suis destinabant, satis gnaræ, hac una planta sues intra breve tempus ita saginari, ut nullo alio cibo pingviores reddi possent. Addit etiam, solere rusticos Carniolæ equos suos ac boves macros ad illa mittere loca, ubi solus hic Lichen copiose provenit, idque tanto cum emolumento, ut intra 3 aut 4 hebdomadas pingvescant, amissasque vires denuo recuperent.

538. LICHEN pulmonarius. LINN. Sp. pl. 1612.
Mat. m. 490.

Li-

(*) Collectan. Socier. med. Havniens. vol. 1. p. 128. seq.

(**) L. c. p. 118.

Lichenoides pulmonareum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. DILL. *Musc.* 212. t. 29. f. 113.

Muscus pulmonarius. BLACKW. *Herb.* t. 335.

Pulmonaria. CAMER. *Epit.* 783. FUCHS. *Hist.* 631.

Pharm. PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

Locus. Europa, in truncis arborum. *Perennis*.

FORMA. *Lichen* toliaceus, coriaceus, supra

lacunosus: lacunis retiformibus; viridis, glaber, saepe exasperatus verrucis parvis, in eminentiis inter lacunas sitis; subitus bullatus, leniter tomentosus, viridecens, sed bullis pallidioribus, albidis, glabriusculis; laciniatus: laciniis lanceolatis, obtusis, sublaciniatis. *Scutella* orbiculata, plana, marginalia.

PROPR. *Odor debilis*; *sapor debilis*, mucidus, subnauseosus, acriusculus; *masticatus emollescit in ore*, difficilius comminuitur, acriusculus sentitur, remanente acri sensu & mordente in faucibus, diu inharente.

VIRTUS:

USUS.

OBS. 1. In monasterio ad fluvium Ussolka in Siberia cerevisiam parant, conditam Lichene pulmonario, loco Lupuli. Hie Lichen ibi crescit supra trunca abietis, & amarissimus est. Cerevisia haec vulgari similis erat, magis tamen inebrians. J. G. GMELIN (*).

OBS. 2. De usu Lichenis hujus medico varia tradunt auctores, valdeque laudant in phthisi morbisque pulmonum; sed periculum ipse nunquam institui.

539. LICHEN Roccella. LINN. Sp. pl. 1622.

Cotalloides corniculatum fasciculare tinctorium,

Fuci teretis facie. DILL. *Musc.* 120. t. 17.

f. 39. A — D.

Mu.

(*) *Reise durch Sibirien*, tom. 3. f. 426.

Muscus ceranoides albus fungosus apicibus nigris. PLUR. *Alm.* 255. t. 205. f. 6.

Muscus ceranoides palmenis, comis digitatis orchilli dictus. PETIV. *Gazophyl.* 7. f. 12.

Fucus verrucosus tinctorius. BAUH. *Hist.* 3. p. 797.

Orseille vulgo.

Pharm. ROCELLÆ Herba.

Locus. Insulæ Archipelagi, Hesperides, Azores, Canariæ, in rupibus altis.

FORMA. *Lichen fruticulosus, cinereus, saepe subpurpurascens, ex ima radice ramosus, erectus, palmaris vel supra, glaber, dichotomus; ramis erectis, solidis, post sectionem transversalem albis. Tubercula lateralia, alterna, obtuso-planiuscula, elevata.*

PROPR. *Odor nullus; sapor subfalsus; masticeatus subacris.*

VIRTUS.

USUS: *tinctorius.*

OBS. Pars colorans hujus Lichenis in resinoso consistit, cum nullo modo extrahatur ex aqua pura. Pulveratus vel grossius comminutus macerari debet per mensum in urina; addito alcali fixo vel calce. Sic color emergit columbinus, quo sericum inficit hujus decoctum; atqui color hic persistens non est, sed non modo ab acidis, verum etiam e radiis solaribus deletur.

ORDÓ F U N G I.

540. *BOLETUS abies Laricis dictæ.* LINN. *Mat.* m. 497.

Aga-

Agaricum sive Fungus Laricis. Mich. *Gener.*
p. 119. t. 61. f. 1.

Polyporus sessilis, convexo-planus, annulis
discoloribus fulvis, poris ochroleucis. HALL,
Helvet. 3. p. 141.*

Pharm. AGARICUS OPTIMUS.

Locus. Europa australis, in alpibus, supra La-
rices.

FORMA. *Boletus* sessilis, subrotundus, con-
vexo-planus, magnitudine pugni, saepe capitis
infantilis, ex annulis albidis, lutescentibus & fu-
scis variegatus, laevis, subitus poris innumeris per-
tusus. In officinis occurrit purgatus & undique
circumsestus, unde albus, laeviusculus. *Parency-
ma* sicc. album, siccum, aequale, spongiosum,
subfarinaceum, friabile, inquinans.

PROPR. *Odor* vix ullus; *sapor* dulcescenti-
amaricans, nauseosus, inhærens.

VIRTUS: laxans.

USUS.

OBS. 1. Extrahitur potissimum menstruo spirituoso.
Tinctura spirituosa rubicunda; in frigore cogitur ad
consistentiam olei; aquæ frigidæ instillata laetescit; e-
metica. *Extractum* aquosum amarum, purgans. *In-
fusum* aquosum in balneo, laetescens, opacum, odo-
re & sapore, dum fervet, intensius nauseoso; vitriolo
martis coagulatur subito in caseum, sed color non al-
teratur; cum alcohole vini turbatur, præcipitatur. I-
pse agaricus, digestus, mollis fit, instar casei recentis.
Ex observatione J. G. GMELINI (*), *Agaricus Larici-*
nus plurimum *Resinæ* continet. Is, cum *Agarici* unc. 12
cum spiritu vini extraheret & destillationi subjiceret,
sub destillatione accepit unc. 4 resinæ, *Jalappæ* resinæ
si.

(*) *Commere. litt. Norimb.* ann. 1733: p. 59.

similis; residuum, cum aqua decoctum, dedit Extr. aquosi drachm. 9.

OBS. 2. Ob particularum levitatem raro in pulvere propinatur Agaricus hic, sed cum G. Tragacanthæ in trochiscos redigitur. Purgat lente, dosi drachm. 3-1, & saepe nauseam torminaque movet difficultia.

OBS. 3. Boletus laricinus anni spatio increscit, colligendus quando siccatus rimas agere incipit, tuncque e cortice trunci avellendus. Postea exterior pellicula subtiliter separanda; quo facto solis calori exponi debet per nonnullas hebdomades, ut albescat, porro ligneis malleis tuditari, usquedum nullæ in eo apparet incisuræ (*). Dum increscit, succulentus est, halitu suo perniciosus. Si justo diutius in trunko arboris relinquitur, cariosus fit, squalidus, & in pulvrem fatiscit. Sub ipsa hieme colligi debet, si bona notæ erit (**).

541. BOLETUS ignarius. LINN. Sp. pl. 1645.

Agaricus pedis equini facie. TOURNEF. Institut.

^{562.}

Pharm. AGARICUS PRÆPARATUS.

Locus. Europa, supra truncos Betularum, Quercum & Fagorum.

FORMA. sicc. & præparat. Fomes coriaceus, mollissimus, lenissimus, viridescens, consistentia coriaceo-tomentosa. Boletus, qui in Fagorum truncis crescit, mollissimus fit dum præparatur.

PROPR. Odor nullus, neque sapor. Igni admotus accenditur absque flamma, idque etiam ex meris scintillis, ignem fovet serpentem, & sic deflagrat odore fere linte accensi, remanente

fa-

(*) Cfr. VALENTINI Hist. simplicium reform. p. 232.

(**) BELLON. Conifer. p. 26.

favilla. Humido applicitum, illud absorbet, longe tamen imperfectius quam Spongia marina.

VIRTUS.

USUS. Hæmorrhagia a vasis resectis.

OBS. Euporiston Fennorum nostrorum ad sanguinem sistendum, ope Boleti igniarri præparati, a chirurgo Gallico cl. BROSSARD ulterius elaboratum est, & præmio a Rege Galliæ remuneratum. Scilicet colligendus est Boletus hic siccatus, & abscindenda ipsa pars corticalis, utpote durior; parenyma coriaceum malleo tamdiu pulsandum est, quoad mollissimum & lenissimum evadat. Hic agaricus vulneri sanguinem fundenti applicandus erit, sive sit sanguinis venosus, seu arteriosus, qui stillat. Sub applicatione Agarici sedulo curandum, ut bene attingat vas læsum, & lumini vasis propemo do intrudatur, ut illud bene obturetur. Sed ut securius res procedat, expedit aliud quoddam frustulum agarici priori superponere, tum denique omnia fascia circumligata bene firmare. Hæc methodus postmodum a plurimis Chirurgis, tam Gallicis, quam Anglicis, experimentis confirmata est; & satis laudatur a cl. viris FAGET, MORAND, ROCHARD, SHARP, WARNER, PARSONS, FORD &c: Monent tamen cl. PARKER & SHARP, illam interdum fecellisse. Sed cl. G. NEALE (*), propriis & aliorum periculis duetus, insufficientiam hujus agarici in operationibus chirurgicis monstrat, sive gallicus seu anglicus sumatur; atque etiam in levioribus casibus eum fecellisse contendit, quare enixe hortatur chirurgos, ut potius fidant acui & ligaturæ. Hoc consilium communiter jam sequuntur Chirurgi prudentes, ita parum Agaricum præparatum curantes, ut etsi eum ad manus habent, tamen illum Spongiæ longe postponant

(*) *Some observations on the use of the Agaric, and its insufficiency in stopping Hæmorrhages after capital Operations.* Lond. 1757.

nant ceratæ, quæ etiam agarico præstabilior est ad sanguinem sistendum. Fuere qui agaricum hoc scopo interne propinare tentarunt, sed mittamus ineptios.

OBS. 2. Recens hic Boletus transversaliter truncus arboris affixus hæret, subrotundus, polymorphos, undique subfuscus, scabriusculus; parencrema carnosofolidiusculo, viridi-lutescente, subsucculento, variegato-marmoreo; odore debili, fungoso, sapore vix ullo; masticatus gelatinoso-cartilagineus sentitur, non solvitur, sed comminuitur. Taleolæ resectæ ad tactum pinguisculæ sunt, flexiles, fragiliusculæ. Hujus Boleti recent, infusum aquosum rubescens est, naufragium, vitriolo martis nil demutatum. Sic nulla qualitas adstringens in hoc fungo inest.

542. AGARICUS campestris. LINN. Sp. pl. 1641.

Fungus campestris albus superne, inferne rubens. MICHEL. Gen. 174. n. 8.

Pradellorum tertia species. STERB. Fung. 29.
t. 1. f. C. D.

Culinis CHAMPIGNON.

Locus. Europa, in terra pingvi, fimetiis. Crēscit vere, vel primo autumno.

FORMA. rec. *Fungus glaber, lœvis, longitudinaliter minutim striatus, stipite cylindrico, albo, volva alba, pileo convexo, albo, subtus lamellatus: lamellis parallelis, approximatis, kermesinis. Parencrema carnosofsucculentum, album.*

PROPR. rec. Odor fungosus; sapor consimilis, subdulcescens; masticatum succolum, in ore non solubile.

VIRTUS:

USUS: culinaris.

OBS. Hic fungus vulgatissimus est in culinis; recens incoquitur variis embammatis, tam pro piscibus, quam car-

carnibus variis. Paratur etiam ferculum ex hoc fungo, absque carne, sapidissimum, pari modo ac ex Agar. delicioso. Conditur acetō vini, & per hiemem fervatur in eosdem usus, salvo sapore grato. Etsi Agaricus hic sponte apud nos provenit, colitur tamen apud hortulanos, qui quidem primo conficiunt stratum ex stramine tritici, simo equino permisto, e stabulis depresso, eique post superponunt terram, in quam postmodum imbræ cæbro irrigant; atque saepius constitit, Agaricos campestres in solo sic apparato late progerminasse.

543. AGARICUS deliciosus. LINN. Sp. pl. 1641.

Agaricus pileo hemisphærico in centro depresso & in margine fornicato, petiolo brevi & crasso. GLED. Fung. 101.

Riska vulgo.

Culinis: *AGARICUS DELICIOSUS.*

Locus. Europa, in monticulis sterilibus sylvosis. Crescit primo autumno.

FORMA. recent. Fungus magnitudine pugni.

Stipes cylindricus, vix bipollicularis, crassus, albicans, glabriusculus, solidus, centro saepe perforatus. *Pileus* convexus, centro depresso-concavus, scabriusculus, colore testaceo, h. e. ex dilute cinereo & viridi variegatus, margine undique reclinato, subtus plano-concaviusculus, lutescens, lamellatus: lamellis simplicibus, parallelis, subæqualibus. *Parencyma* carnosum, luteum, fragile, sicciousculum.

PROPR. rec. Odor fungosus; sapor consimilis, satis gratus; masticatus emollitur in ore, fere solvitur, saliva vix tincta, remanente in fauibus leyi sensu acrimoniae.

VIRTUS: nutriens.

USUS: culinaris.

OBS. Hi fungi recentes conscinduntur, & in aquam frigidam mox conjiciuntur. Postea calide infunduntur in aqua. Tum liquefiat frustum butyri in olla, cui adjiciatur Cepa alba concisa, & Agaricus ex aqua exemptus, qui postea coqui debet in butyro hoe, addito sale, Petroselino, Pipere. Initio decoctionis succum emittit Agaricus; sed coctio tamdiu continuanda, dum embamma ad justum perductum fuerit spissitudinis gradum; tum infertur. Certe sapidum ferculum. In embammatis carnium, pari modo ac praecedens, utiliter adhibetur. Duplici modo per hiemem tueruntur hunc Fungum coqui nostri. Eundem, bene depurgatum, & in frustula concisum, vasculo immittunt vitro cum sale culinari, per strata alterna adjecto. Hoc modo bene servatur usui, & quamvis fuscefcat, sapidus tamen fit. Condiunt illum etiam aceto; sc. Agaricus depurgatus & concisus elixatur in aqua, per horulæ spatium, dum mollescat; postea eximitur ex aqua, & breviter ebullit in aceto, addito Pipere jamaiensi & maci. Hæc collectim immittuntur in vas vitreum bene obturatum, dum refrigeruerint, posteaque servantur in lagunculis vitreis vesica obruratis. Brodium hoc sensim spissificat & revera gelatinificat, quod apud alias fungos conditos non observavi. Hinc concludere licet ad vim nutrientem hujus fungi.

544. AGARICUS Cantharellus. LINN. Sp. pl. 1639.

Fungus flavescens infundibuliformis. VAILL.

Paris. t. 11. f. 9. 10.

Fungus luteus s. pallidus, Chanterelle dictus, se contorquens esculentus. BAUH. Hist. 3. p. 832.

Culinis: CHANTERELLE.

Lo-

Locus. Europa, in pratis sylvaticis. Crescit primo autumno.

FORMA. rec. *Fungus* magnitudine pollicis vel Pyri minoris, dilute lutescens; saepe plures aggregati. *Stipes* cylindricus, pollicaris, solidus, sursum paullulum incrassatus, glaber. *Pileus* turbinatus, glaber, supra planiusculus, margine undique reclinato, repando, saepe sublobato; subitus in stipitem sensim angustatus, lamellatus: lamellis parallelis, inferne simplicibus, superne ramosis. *Parencyma* pilei & stipitis carnosum, siccusculum, dilute lutescens, fragile.

PROPR. rec. *Odor* fungosus; *sapor* consimilis, subsallus; *masticatus* fungus mollis in ore sentitur, comminuitur, emollitur, solvitur, saliva vix tincta, remanente levi sensu acrimoniæ, in ore & faucibus mordente.

VIRTUS:

USUS: culinaris.

545. AGARICUS pileolo integerrimo, vertice elato aut depresso, lamellis angustissimis.

GLED. *Fung.* 110.

Fungi verni, Mouceron dicti, odori & esculent. *BAUH.* *Hist.* 3. p. 823. 824.

Culinis: MOUCERON.

Locus. Europa, in sylvis. Crescit vere & primo autumno.

FORMA. rec. *Fungus Stipite* solidio, cylindrico, elongato, glabriuscule, cinereo, *Pileo* conico-hemisphaericō, incarnato-olivaceo, magnitudine fructus Cerasi, supra glabro, subtus planio, lamellis parallelis, inæqualibus; *parencymate* carnosio, albo, siccusculo.

PROPR. rec. Odor fungosus; sapor consimilis, subsalsus, subaromaticus, gratus; *masticatus tener.*

VIRTUS.

USUS: culinaris.

OBS. In culinis siccatur hic fungus, & sic per hie-mem servatur usui. Recens vel siccatus embammatis incoquitur, ob gratum, quem illis conciliat, saporem.

546. CLAVARIA Coralloides. LINN. *Sp. pl.* 1652.

Corallo-fungus flavus. VAILL. *Parif.* 41. t. 8.
f. 4.

Barba caprina. STERB. *Fung.* 96. t. II. f. A-D.

Culinis BARBA CAPRINA.

Locus. Europa; in sylvis opacis. Crescit au-tumno.

FORMA. rec. *Fungus magnitudine varia, pro ratione ætatis, a magnitudine ovi ad pugnum vel supra. Stipes breviusculus, solidus, teretiusculus, albus, glaber. Pileus nullus, verum stipes continuatus in truncum teretiusculum, sub-lutescentem, ramosissimum. Rami & ramuli solidi, fragiles, subdichotomi, erecti, varie divisi, subfastigiati, albidi vel lutescentes; ramulis ultimi-bus brevibus, obtusis. Parenyma carnosum, sicciusculum, album.* Obs. In Clavaria juniore col-or magis croceus est; in adultioribus magis pal-lescit, albescit.

PROPR. rec. Odor fungosus; sapor debiliter fungosus, in saporem Rapæ recentis incidens; *masticatus* hic fungus molliusculus, solvitur fere, cum sensu acrimoniæ in faucibus, & amarican-tis postea in ore.

VIRTUS.

USUS: culinaris.

. *OBS.*

OBS. Barba caprina in culinis paratur fere ut Agaricus deliciosus. Infunditur primum in aqua, quæ abjicitur. Deinde coquitur in olla cum butyro, sale, petroselino & basilico, per semihoram circiter, postea perficitur cum cremore lactis & ovis recentibus, & infertur. Editur frequenter, sapidus cibus, & forsitan salutaris.

547. PHALLUS esculentus. LINN. *Sp. pl.* 1648.

QED. Icon. t. 53.

Boletus esculentus rugosus. MICH. *Gen.* 230.
t. 85. f. 1. 2.

Fungi esculenti species 3. CLUS. *Hist.* 2. p. 164.
Culinis: PHALLUS ESCULENTUS.

Locus. Europa, Virginia, in sylvis antiquis,
tempore vernali.

FORMA. rec. Fungus Stipite crassiusculo, tenui, perforato, undique minutim rugoso, albidio, cinerascente, nudo. *Pileus* conicus, obtusus, stipite vix longior, erectus, sordide rubicundus, marginibus & apice fuscescens, extus undique fimbriato-reticulatus: fimbriis cellulosis, longitudinalibus; intus cavus. *Siccatione* fuscescit, fragilis fit.

PROPR. rec. & sicc. Odor debilior, non ingratus; sapor odori congruens; sicc. masticatus comminuitur, emollitur, sublubricus sentitur.

VIRTUS:

USUS: culinaris.

OBS. 1. Adhibetur hic fungus in culinis ad perficienda embammata. Siccatur & per totum annum servari potest, stipitibus reiectis. Non comminuitur, sed paratur integer, embammati incoetus. Infunditur primum in aqua, quæ abjicienda, deinde coquitur in butyro, tum additur saccharum & vinum.

OBS. 2. *Infusum aquosum rubrum, odore & sapore ipsius fungi; vitriolo martis vix fusescit, verum turbidum fit, cinereum, opacum.*

548. PHALLUS (Mitra) pileo subconico difformi gyris flexuosis, stipite solido.

Fungus porosus pyramidalis & in metam fastigiatus quadruplex. MENTZ. *Pugill.* 124. t. 6.

Phallo-boletus esculentus. MICHEL. *Gen.* 202. t. 84. f. 1.

Stenmukla *vulgo.*

Culinis PHALLUS MITRA.

Locus. Europa, in sylvis, tempore vernali.

FORMA. rec. Fungus Stipite albo, subcylindrico, glabro, profunde interrupte sulcato, nudo, solido. *Pileus* magnitudine ovi anserini, saepe etiam pugni, subconicus, difformis, in stipitem deflexus, supra glaber, rubro-kermesinus, undique exaratus gyris profundis, flexuosis; subtus, h. e. latere interiori, niveus, glaber, laevis. *Siccatione* fuscescit, fragilis fit.

PROPR. rec. *Odor fungosus; sapor Phalli esculenti; masticatus tener, mollis, facillime communitur.*

VIRTUS.

USUS: culinaris.

OBS. In culinis recens infunditur in aqua calida, quæ abjecitur, tum maceratur cum butyro, & deinde coquitur in aqua parca per semihoram, addito Petroselini & Basilici pauxillo, tandem perficitur cum cremore lactis, unde sapidus fit hic fungus. Siccatur etiam, & adhibetur ut Phallus esculentus.

549. PEZIZA Auricula. LINN. *Syst. nat.* 12. p. 725.

Agaricum auriculæ forma. MICHEL. *Gen.* 124. t. 66. f. 1.

Fun-

Fungorum perniciosorum genus 1. Clus. Hist.

2. p. 276.

Auricula Judæ. BLACKW. Herb. t. 334.

Pharm. AURICULA JUDÆ.

Locus. Europa, supra arbores putridas.

FORMA. rec. *Fungus* sessilis, umbilicatus, concavus, campanulatus, s^epe explanatus, magnitudine circiter ovi gallinacei, basi plicatus, superne margine integro terminatus, extus minutissime tomentosus, intus l^avis, consistentia gelatinoso-cartaginea, undique kermesinus s. purpurascens.

PROPR. rec. Odor vix ullus; sapor nullus; masticatus comminuitur, subcartilagineus sentitur, vix solvitur. Siccatus fit satis tenuis, cinerascens, fragilis, rugosus, qui masticatus gelatinescit. In aquam tepidam immissus brevi emollitur, expanditur, & eandem, quam recens habuerat, resumit formam, consistentiam & colorem.

VIRTUS: refrigerans.

USUS. Ophthalmia.

OBS. 1. *Infusum* aquosum rubicundum, spissum, gelatinescens, odore nullo, neque sapore; viriolo martis non demutatum.

OBS. 2. In ophthalmia, aliisque inflammationibus levioribus, imponitur hic fungus, in aqua primum emollitus. Certe s^epiissime levamen affert, quamvis non agat vi quadam adstrictiva.

550. LYCOPERDON Tuber. LINN. Sp. pl. 1053.

Mat. m. 500.

Tubera brumalia, pulpa obscura, odora.

MICH. Gen. 221. t. 102.

Tubera. MATTH. in *Dioscor.* 544.

Culinis: TUBER siccatum, conditum.

Locus. Europa, Barbaria, Virginia, sub terra.
Effoditur hiemali tempore. In Pedemontio copiosissime.

FORMA. rec. *Fungus* in terra nidulans, absque radice, angulatus, magnitudine nucis Avellanæ, sæpe Pomi, sæpe etiam pugni, undique nigricans, rugoso-muricatus: tuberculis convexo-planiusculis, subdepressis, inæqualibus, angulatis, sæpe tetragonis, sæpe rotundis, supra striato-angulatis, approximatis, totum fungum undique tegentibus. *Parencyma* carnosum, tenerum, sub-succulentum, nigricans, solidiusculum, post sectionem transversalem æquale, pictum venulis reticulatis pallidioribus.

PROPR. rec. *Odor* fragrans, gratus; *sapor* gratus; *masticatus* comminuitur, solvitur, saliva fusca.

VIRTUS: nutriendis.

USUS: culinaris.

OBS. Hic fungus passim in Europa australi, per totam hiemem, effoditur e terra, ubi dimidium pedem alte delitescit. Hinc aut casu reperitur, aut studiose a rusticis exquiritur, qui ea occasione vel sues secum habent, odora sua vi indicium loci facientes, rostro cæspitem suffodiendo, vel etiam canes, ad vestigandum condocefactos. Vulgo ea præstantissima ducuntur Tubera, quæ Barbaria fert, sed vix iis cedunt, si non superant, quæ in Gallo-Provincia, alibique per Europam australiem, obveniunt. Quæ hieme effodiuntur, nigricant; quæ vero tempore æstivo occurunt, pulpam minus obscuram habent, minusque sapida sunt, fragrantia tamen. Imprimis recentia istorum locorum tubera, sub cineribus vel prunis fricta, jucunde fragrantia sunt sapidaque, quare etiam ab omnibus esitantur, præterquam puellis adultis, quibus id indecorum habetur, quod vul-

gus

gus ea vim aphrodisiacam habere credit. Late per Europam divenduntur, sive siccata, seu l. a. condita oleo-que immissa. Siccata tenacia sunt, vixque sapida, nec fragrantia, tamen in magnatum epulis usitata. Condita tenera, siccatis præstantiora, parum tamen sapida, quare raro per se eduntur, verum cibis, tanquam condimentum, adduntur. In regionibus borealibus subinde quidem hæc tubera proveniunt, sed ea parva sunt, vixque perinde sapida, quam australia.

551. LYCOPERDON Bovista. LINN. Sp. pl. 1653.

Mat. m. 499.

Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus germanis Bofist. BAUH. Hist. 3. p. 848.

Pharm. CREPITUS LUPI (Bovista).

Locus. Europa, in campis sterilibus.

FORMA. rec. Fungus subrotundus, stipitatus, læviusculus, magnitudine varia; *parenzymate* spongioso-fucculento, niveo. *Sicc.* levis, siccus, lividus; *parenzymate* spongioso, pulverulento: pulvere brunneo, inquinante, siccissimo, in auras obvolitante, dum fungus comprimitur. Si fungus hic siccatus pedibus calcatur, crepitum edit, & fumum emittit pulverulentum. In solo præpingvi, aëre pluvioso, in enormem perbrevi tempore excrescere potest magnitudinem, ut observavit cl. BENED. BERGIUS (*), qui hujusmodi fungum habuit, cuius ambitus 2 ulnis & 3 digitis respondit, cuiusque gravitas 18 librarum svec. modum excessit.

PROPR. sicc. Odor nullus, neque sapor.

VIRTUS: exsiccans, sanguinem sistens.

USUS. Amputatio.

I i i 5

OBS. 1.

(*) K. Vetenšk, Acad. bandl. vol. 23. p. 324.

OBS. 1. *Infusum* fungi sicc. aqueum, odore est nullo, neque sapore; a vitriolo martis non demutatur.

OBS. 2. Fungus hic siccatus apud antiquiores adhibitus fuit, ut remedium domesticum ad hæmorrhagias sistendas; atque nuperis experimentis, in brutis & hominibus institutis, vis ejus insignis ad sistendum sanguinem inclaruit. Adhibetur eodem modo, ac Agaricus præparatus; scilicet rescinditur frustulum ex hoc fungo, detrahitur cuticula, & sedulo applicatur vasi sangvineo læso; sed frustulum unum alterumve adhuc superponere oportet, & deinde totam massam fascia arte præstringere. Agit obturando vas læsum.

OBS. 3. Si fungus recens aëri libero & soli exporritur, intra paucos dies siccatur & pulverulentus fit; si vero grandior in loco clauso servatur, non siccatur, nec pulverulentus fit, sed collabefit, flavescit, rubescit, tandem fuscescit, humore difflit, atque putrescit.
B. BERGIUS (*).

AP-

(*) L. cit.

APPENDIX.

PALMÆ.

SEGO. ZÜCK. *Mat. alim.* 79.

Sagus, seu Palma farinaria. RUMPHⁱ *Amb.* 1.
p. 72. t. 17. 18.

Arbor Zagoe amboinen sis. SEB. *Thesaur.* 1. p.
39. t. 25. f. 1.

Culinis SAGU granula.

Locus. Malaeca, insulæ Moluccæ, frequentis-
simæ in insula Ceram, locis humidis & a-
quosis. *Arbor, Palma.*

FORMA. *Granula* artificialia, amylacea,
subrotunda, albido-cinerea, læviuscula, magni-
tudine seminis Brassicæ, dura.

PROPR. *Odor nullus, nec sapor; masticata du-*
riuscula, comminuuntur, sed inter dentes tena-
ciuscula; sub masticatione in ore non solvuntur.
Aquæ frigidæ immissa non solvuntur, nec ma-
gnopere mollescunt, quamvis diutius infusa, sed
tantum facilius comminuuntur. Si vero in aqua
coquuntur, bihorii spatio emollescunt, tument,
gelatinescunt, figuram tamen servant, aquam-
que, ut refrigeruit decoctum, in *gelatinam* vertunt
insipidam, mollem, rufam, glutinantem. Hæc
gelatina, frigefacta, in calore rursus non lique-
scit, sed ulterius spissescit. Non solvuntur hæc
grana in oleis, nec in spiritu vini. Si loco ari-
do ea serves, diurne ea tueberis; certe qui-
dem ultra 4 lustra incorrupta illa retinuit SEBA(*);
sed

(*) *Rerum natural. Thesaur.* 1. p. 40.

sed si in cellis humidiusculis colloces, vix ultra paucos annos sapida retinebis, quippe quod fatiscunt in pulverem, nec ad cibum postea grata sunt.

VIRTUS: nutriendis, obtundens.

USUS: culinaris.

OBS. 1. *Decoctum* aquosum limpidiusculum, rufescens, gelatinosum, subinsipidum; cum vitriolo martis non variat.

OBS. 2. Vera granula Sagu, quæ ad nos appontantur, non dat Cycas circinalis, prout vulgo creditur, sed *Sagus RUMPHII*, quod demonstrarunt autoptæ, ut RUMPHIUS (*), C. H. BRAAD (**), VOLQUARD IVERSEN (***) Auctorque descriptionis juratæ arboris saguferæ (†). Vidi ego truncum arboris saguferæ veræ, e solo natali allatum, qui ad Cycadæ vix pertinebat. Postquam arbor eum maturitatis gradum attigit, ut medulla, e trunco, terebra forato, exempta, amyllum det, arbor ista prope radicem exciditur, ablatoque alburno, in frusta longitudinalia fnditur, quæ postea tuditibus in scobem tenuissimam contunduntur. Tum amyllum, cum affusa aqua frigida, pari modo ac de Solano tuberoso supra dictum est, ex hac scobe separatur, quod fundum petit. Ex hoc amylo s. farina Sagu panem p̄f̄sunt incolæ, nihil aliud addentes; farinam tantummodo induit certis quibusdam formis figulinis excalefactis, unde in densitatem coit. Hic panis, apud Ceramenses usitatus, durus est, angulis quasi virreis, sapidus dum recens; in Amboina vero albidus & friabilis. Coquunt etiam farinam Sagu in aqua, unde pulmentum parant, gelatinæ amyli Tritici simile, quod copio-

(*) l. c. (**) K. Vetensk. Acad. handl. vol. 36. p. 142. seq.

(***) Orientalische Reise-beschreib. p. 186.

(†) Vid. VALENTINI Ind. litterat. p. 435.

copiose edunt, præcipue infantes & mulieres, sed vapidum dat nutrimentum, ad cachexiam & hydropeim disponens. Quando *grana* Sagu parant Indiani, amyllum diligenter lavant frigida, & simulac semisiccatum est, inter manus illud volutant, tum cibrum permeare cogunt, unde figuram subrotundam obtinent grana, quæ deinde siccanda, primum in sole, postea supra lenem ignem, usque dum indurecant, ut vendi possint. Ex quavis arbore amyli circiter libr. 300 vel 400 accipiunt. Si truncus vigens sauciatur, stillat succum viscosum s. gelatinosum, tanta quidem copia, ut arbor inde pereat.

553. PHOENIX dactylifera. LINN. *Sp. pl.* 1658.

Mat. m. 501. KNIPH. Bot. orig. cent. 2.

Palma. KÆMPF. Amœn. p. 677. — 716. t. 1. 2.

3. BAUH. Hist. i. p. 351.

Pharm. DACTYLII Fructus.

Locus. India. Arbor, Palma.

FORMA. sicc. Spadix fœmineus ligneus, longissimus, plurium ulnarum, dependens, glaber, colore stramineo, angulatus, ramosus, virgatus: ramis ternis vel quaternis, sparsis, angulatis, subtetragonis, lœvibus, simplicibus, flexuosis, onustis fructibus, sessilibus, sparsis, longitudinaliter dispositis. Perianthium fructus hemisphæricum, concavum, lutescens, magnitudine sem. Pisi majoris, glabrum, imbricatum: squamis sex lato-ovatis, obtuso-rotundatis, rigidis, pergamenis, adpressis; quarum 3 exteriores paulo minores, carinatae, æquales, 3 interiores paulo majores, undique fructui arête adpressæ. *Drupa* cylindrica, sœpe conica, pollicaris, pollicis crassitie, apice obtuso rotundata, tuberculo terminata, rubicunda, subdiaphana, glabra, basi truncata,

cata, sœpe subalbida, (sc. ubi calyce tecta fuit), unilocularis. *Nucleus cylindricus*, osseus, extus cinereo-brunneus, intus plumbeo-subviolaceus, solidus, utrinque obtusus, undique minutim rugosus, lœviusculus tamen, subtuberculatus, dorso convexo - teres, hilo progerminante orbiculato depresso sculo in medio dorsi, antice sulco longitudinali profunde exaratus. *Parencyma drupæ pulposum*, melligenum, crassitie lineæ vel ultra, pariete interiori, nucleus spectante, vestitum *tunica tenera*, nivea, subsplendente, membranacea, sub qua latet substantia alba, minutissime spongiosa, subpulposa.

PROPR. sicc. Drupæ: *Odor nullus*; *sapor melligenus*, dulcissimus; *masticata drupa solvitur in ore*, excepta tunica interiore, quæ emollitur quidem, sed tenax fit & ægre comminuitur.

VIRTUS: nutriend, edulcorans, pectoralis.

USUS. Tussis.

OBS. I. Daëtyli immaturi acerbi sunt, maturi vero dulcissimi. Non tota simul substantia maturescunt & mollescunt, uti nostri fructus, sed successive, incipiendo ab apice drupæ, maturatione versus basin sensim serpente; & illud quod maturatum est dignoscitur ex pelluciditate, quam induit, cum rubidine conjuncta. Sed palmicolæ ante legunt hos fructus, quam maturitatem plenariam attigerunt, ne, ad basin producta mollitie, daëtyli sponte perianthiis excidant, & e cæcum arboris præaltæ delabendo lœdantur. Hinc daëtyli plerumque occurunt basi pallidi, opaci, parenchymate niveo, duriusculo, minutim spongioso. Collectio daëtylorum a palmicola communiter fit adscendendo comam arboris, ubi manu maturos & maturescentes decerpit, crudioribus relictis, postmodo legendis. Collecti mox per nonulos dies in acervos cumulan-tur,

tur, & solis ardori exponuntur, ex quo sit, ut amplius quasi excoquantur atque etiam siccentur, inter quæ druparum quoque bales submaturescunt, dulcesque evadunt, quamvis opacæ. *Recentes* Daëtyli siccatis longe lapidiores sunt, ut narrat KÆMPFERUS, carnosò-pulposi, pinguisculi, sapore vinoso, dulcissimo. Indigenæ syrum ex daëtylis insolatis parant, expressione pulpæ ope torcularis, qui apud illos usitatissimus est in omni fere cibo, butyri loco. Sunt qui daëtylos expressos in aqua coquunt, in pulpæ tenuis s. syrum consistentiam, syrum expresso longe deteriorem. Vinum etiam parari potest ex daëtylis maturis, aqua perfusis, fermentatione. Spiritus etiam valens a daëtylis destillari potest. Variant daëtyli in ipsa patria, colore, forma & sapore. Præstantissimi sunt *regii* dæti, qui omnium quidem dulcissimi, & quasi succinum pellucidi. Quos supra descripsi, Daëtylos, e Tripoli Barbariæ habui; e Mauritania accepi Daëtylos longe maiores, ovato-oblongiusculos, subrugosos, cinereos, apice rubros; nucleo breviore, magis rugoso, pulpa grata acido-dulci.

OBS. 2. *Infusum* aquosum rubicundum, spissiusculum, dulcissimum; melligenum; vitriolo martis nequam demutatum. Residuum, in aqua coctum, dedit decoctum tenué, fere ut serum laetis, subrubicundum, minus dulce. Si vero daëtyli ipsi absque prævia infusione coquuntur, *decoctum* emergit rubicundo-opacum, spissum, perquam dulce. Loco tepido sponte fermentescit; sed leni evaporatione super ignem inspissatur in *Syrupum* rubrum, subdiaphanum, dulcem, non glutinantem.

OBS. 3. Si nuclei ossei in aqua per nonnullas horas coquuntur, adeo emolliuntur, ut cultro facile secari possint. Decoctum dant saturate rubrum, odoris & saporis expers, vitriolo martis leviter fuscescens.

554. ARECA Cathecu. LINN. *Sp. pl.* 1659. *Mat.*
m. 503.

Pinanga. RUMPH. *Amb.* 1. p. 26. t. 4.

Caunga. RHEED. *Malab.* 1. p. 9. t. 5 — 8.

Palma arecifera nucleo vermicolare moschatae
simili. PLUK. *Pbyt.* t. 309. f. 4.

Pharm. TERRA CATECHU (Japonica).

Locus. India. *Arbor, Palma.*

FORMA. Gummi-resina in frustulis majoribus, fusco-nigra, nitidiuscula, dura, fragiliuscula, homogenea, saepe ligni ramentulis conspurcata, fragilis: fracturis irregularibus; in pulvrem facile resolubilis: pulvere brunneo-rubro.

PROPR. Odor nullus; sapor substypticus, dein amaricans, postea subdulcetens; masticata inter dentes dura, fragilis, comminuitur, solvitur: saliva rubra. Solvitur in aqua: solutione rubra; qua magnam partem in spiritu vini: tinctura sangvineo-fusca. Solvitur etiam in aliis liquidis, ut in vino, cerevisia, acidis, at non in oleis. Solutio in aceto vini colore cinerascente est. Sub solutione in liquidis, in superficie cinerascit. In candelæ flamma non accenditur, sed in carbonem ignitum redigitur, sumat, odore non grato. In vase ferreo super ignem emolitur, admota flamma accenditur, flagrat, flamma parca, lutescente, remanente carbone nigro, sicco, fragili, splendente, parum inquinante.

VIRTUS: adstringens, stomachica.

USUS. Scelotyrbe, Diarrhoea.

OBS. I. Solutio aquosa cum vitr. martis derepente nigrescit. Hujus solutionis saturatissimæ guttæ 4, aquæ unciæ 3 instillatae, addito vitr. martis, colorem fusco-ferrugineum stiterunt. *Tinctura* spirituosa saturatissi-

tissimā, fuso-sangvinea est, sapore intensius styptico; cum aqua pura diluta, sangvineo-rubra evadit, sed non lactescit. Tincturæ saturatiss. guttæ 2, cum aquæ unc. ʒ & vitriolo martis, colorem fuso-nigrum efficerunt. Sic tinctura Terræ Catechu spirituosa magis styptica est, quam solutio aquosa.

OBS. 2. De Terra Catechu scripsit E. HAGENDORNIUS (*).

555. PALMA oleosa. HUGHES *Barbad.* p. 111.
BLACKW. *Herb.* t. 363.

Palma foliorum pediculis spinosis, fructu pruiniformi luteo oleoso. SLOAN. *Hist.* 113. t. 214.

Palma dactylifera aculeata, fructu corallino, major. BARRER. *Aequin.* 87.

Pindova. *Pis. Brasil.* 62.

Pharm. PALMÆ Oleum sebaceum.

Locus. Jamaica, Cayenna, Barbados. *Arbor, Palma.*

FORMA. *Oleum coctum ex fructu hujus Palmæ, decoctionis ope elicitum, bytyraceum, colore Cerae flavæ, unguentaceum.*

PROPR. *Odor gratus, fere Iridis florentinæ; sapor pinguis, validus, odori congruens; mastixatum mox in ore liquefcit. Inter digitos tractatum cito liquefcit, & chartæ illinitum illam pellicidam reddit, perinde ut reliqua olea. In leni calore liquefcit, fluit; in frigore rigescit. In vase ferreo super ignem ebullit; admota flamma non succenditur; sed ellychnium oleo immisum facile accenditur, flagrat instar candelæ: flamma vivida, non fuliginosa, odorem Iridis florentinæ spargente. Ætate rancescit, amittit colorem luteum, & albescit, proinde rejiciendum.*

K k k

VIR-

(*) *Tract. de Catechu, seu Terra Japonica.* Jenæ 1679.

VIRTUS: emolliens.

USUS. Durities ventris.

OBS. In duritie abdominis præstantissimum remedium est hoc oleum, sive sit ventor durus infantum, seu adulorum, atque in morbis tam acutis, quam chronicis. Sæpius felici successu oleum Palmæ adhibui. Quandoquidem consistentia est ungventi, facileque liquefcit, venter totus hoc oleo commode illiniri potest, postea integendus panno, qui, oleo hocce densius superunctus est. Usui non obſtit odor, qui gratus est, nec rancidus, uti ex plerisque aliis ungventis. In ora Guineæ, Senegal &c. alia species palmæ provenit, cuius fructus oleum Palmæ dat, nempe Palma altissima non spinosa, fructu pruniformi minore, racemo sparso; SLOAN. *Jam. vol. 2. t. 215.* De hac plura tradunt cl. ADANSON (*), GVILL. SMITH (**) & plures. Nigritæ hoc oleo utuntur non solum ad cibum, verum etiam ad medicinam, totumque corpus illo circumlinunt.

FRUCTUS.

556. MYRISTICA. LINN. *Mat. med. 509.*

Le muscadier. SONNERAT *Nouv. Guin. p. 194.*
t. 116.

Nux moscata fructu rotundo. PLUK. *Alm. 265.*

t. 209. f. 1. BLACKW. *Herb. t. 353.*

Nux myristica. RUMPH. *Amb. 2. p. 14. t. 4. 5.*
CLUS. *Exot. 13. 14.*

Nuez moscada. ACOST. *Drog. p. 36. t. 35.*

Pharm. & Culinis: *NUX MОСCHATА (Myristica), MACIS.*

Lo-

(*) *Histoire nat. du Senegal*, p. 107.

(**) *Nouveau Voyage de Guinée*, part. 2. p. 70.

Locus. Insulæ Moluccæ, præsertim Banda.
Arbor.

FORMA. *Drupa* magnitudine fere ovi gallinacei, pedunculata, axillaris, subsolitaria, subrotunda vel turbinata, glabra, gilva, utrinque longitudinaliter sulcata, tandem bivalvis, sulcis dehiscentibus; *parenchymate* carnosæ, albicante, repleto succo tenui, seroso, sapore austero, styptico, minime eduli. *Nux* subrotunda, decidua, intra valvulas drupæ dehiscentes, magnitudine ovi columbini, vel ultra, fuscæ, scabriuscula, inscripta sulcis longitudinalibus, subreticulatis; *testa* dura, crassitie lineæ dimidiæ, fragilis: fracturis fuscis, nitidiusculis; superne obvelata *tunica* (*Macis* dicta) membranaceo-pulposa, pingviuscula, testæ adpresso adhærente, undique glabra; recente sangvinea, siccata lutescenti-coccinea, fragili; multifida: laciniis linearibus, singulis apice multifidis, acutis, inflexis. *Nucleus* (*Nux moschata*) liber intra testam, brunneo-cinera-scens, subrotundus, magnitudine Pruni minoris, utrinque obtusus, laeviusculus, reticulatus sulcis, quorum longitudinales validiores; *parenchymate recentis* carnosæ, pingvi, oleum plorante ex acu intruso; *siccati* vero solido, duriusculo, subfragili, post sectionem transversalem cinereo, undique pisto venis fuscis, longitudinalibus, inæqualibus.

PROPR. *Nucis Myrist.* *Odor* fragrans, gratus; *sapor* pingviusculus, aromaticus, odori congruens, calidus; *masticata* inter dentes friabilis, facile comminuitur, solvitur fere in ore, calet in fauibus. *Macis:* *odor* nucis Myristicæ, verum fortior; *sapor* nuce fortior, magis aromaticus, magis calidus, vix subamaricans; *masticata* subi-

to emollitur, comminuitur, inter dentes sub-pulposa sentitur, sed non solvit; calet in fau-cibus.

VIRTUS: anodyna, stomachica, restringens, calefaciens.

USUS: culinaris; Diarrhoea.

OBS. 1. *Infusum aquosum nucis Moschatae*, in ba-neo paratum, citrino-limpidum, cum innatantibus gut-tulis oleosis, odore aromatico, sapore consimili, cum vitr. martis vix fuscescit. *Decocatum aquosum saturatum turbidum*, emulsivum, pellicula oleosa innatan-te, odore aromatico, sapore pinguisculo, aromatico; vitriolo martis dilute fuscescit. *Infusum aquosum Macis* aqueum, opalescens, aromaticum; a vitriolo mar-tis non alteratur.

OBS. 2. *Oleum expressum* paratur e nucibus Mo-schatis, in mortario ferreo contusis, sacculo inclusis, & vapore aquæ bullientis penetratis, postea in prelo calefacto expressis; sic obtinetur oleum butyraceum, citrinum, odore atque sapore nucis Moschatae, scil. olei unc. 6 ex nucum libr. 1. Hoc oleum ætate pal-lescit, solidescit in consistentiam sebi; supra ignem subito funditur, admota flamma accenditur, flagrat: flamma vivida, dispersa, non fuliginosa, vix fuman-te. Sæpe adulteratur axungia admixta. Oleum nu-cis Mosch. stillatit. dilute lutescens est, liquidum, odore & sapore ipsius nucis. Oleum still. *Macis* di-lute citrinum, liquidum, odore & sapore Macis, sub-dulcescens, natans. J. BROWN macis largiorem quan-titatem destillavit, & destillationem bis vel ter repetiit, atque sic duplex obtinuit oleum Macis, alterum natans, alterum fundum perens (*). Oleum Macis, eadem en-cheiresi ac de Nuce moschata dictum est, a cl. SPIEL-

MANN

(*) *Philos. transact. vol. 33. p. 365.*

MANN expressum, odoratissimum fuit, colore brunneo, butyraceum; Macis libra ß olei dedit sesquiunciam.

OBS. 3. Postquam fructus Myristicæ maturuere drupis dehiscentibus, incolæ arbores condescendunt, & fructus decerpunt, quos cultro privant drupa adhærente, abicienda. Nuces sic purgatæ domum reportantur, & Macis sangvinea mox separatur, cultello abradenda, quæ per dies aliquot prium in solis calore siccatur, unde obscure rubra fit; postea saccis compingitur, & ne comminuantur, aqua marina conspergitur; transportatur postmodo in Europam, colore aurantio tunc conspicua. Nuces pariter in sole siccantur per dies non nullos, deinde mensis circiter spatio exponuntur fumo ex ligno accenso, post fustibus pulsantur, ut testæ confringantur, nucleique eximi possint. Hi nuclei postmodum immittuntur in calcem extinctam, cum aqua dilutam, ita ut calce undique obducantur, quod ideo fit, ut immunes reddantur a putredine, atque in dis-sicas regiones mitti possint.

OBS. 4. Generis Myristicæ plures sunt species, ex situ florū s. fructuum distingvendae. Non omnes aromaticæ sunt. *Panem-Palka* RHEED. *Malab.* 4. p. 9. t. 5, quæ in sylvis Malabaricis occurrit, fructus gerit magnitudine ovi anserini; sed neque macis illius, neque nucleus, odore vel sapore prædicti sunt conspicuo; quare nullius fere usus est, nisi quod Judæi hac maci vulgarem adulterant, & ex nucleis oleum exprimant, quod demum genuino oleo nucis moschatæ, lueri causta, immilcent. *La fausse Muscade*, SONNERAT Nouv. Guin. p. 196. t. 118. f. 3. huic accedit; gerit fructus magnitudine ovi gallinacei, & nuclei sapore sunt Nucis avellanæ, sed absque aromate. *Palala tertia* RUMPH. *Amboin.* 2. p. 27. t. 7. nucleos gerit vix Pisi feminibus majores, qui non aromatici sunt, neque maci fragrante prædicti. Vera arbor Myristica
K k k 3 obve-

obvenit in Nova Guinea, & colitur in insulis Moluccis, præfertim in Banda. Propagatur nucibus nondum rite maturis, ante decerpēndis quam macis occipit sanguinea evadere. Si enim probe maturatæ fuerint nuces, non bene progerminant. Arbor turget succo viscidō, rubicundo, linea indelebili colore tingente, quem sauciata fundit, plerumque cum suo interitu Collectiōnem fructuum ter de anno instituunt incolæ, propterea quod inæqualiter mātūrēscunt, per novem menses in crescentes in mātūritatem. Amat hæc arbor umbrosa, nec solem facile fert. Nux Myristica fructu subrotundō, mas appellatur, altera vero varietas, fructu turbinato, fœmina nuncupatur; prior Europæis magis arridet, posterior vero Indianis.

OBS. 5. De nuce Moschata integra narratio in extenso legi potest apud VALENTINI (*). Relatio illa, quam jurato dederunt ABR. BOUDENIUS & GOER. HAUPTIUS (**) desuper arboribus Nucum Moschatarum, earumque viridariis in Banda, anno 1682 exhibita, oppido curiosa est & legi meretur. Scripsit etiam de hac nuce C. F. PAULLINI (***) librum crassum, compilatum, ubi casus & formulas a variis Auctōribus mutuatus est, sed vix ullas proprias attulit observationes.

557. ANACARDIUM. DAL. *Pharmac.* 310. * PAR-
KINS. *Theatr.* 1563.

Pharm. *ANACARDII ORIENTALIS* Nux.
Locus. Suratte.

FORMA. Nux fusco-nigricans, glabra, superficie adspersa punctulis excavatis, ovata, obtusa; utrinque compressa, basi crassior, pollicaris; te-
sta

(*) *Ind. literat.* p. 452. seq.

(**) VALENTINI *l. c.* p. 461.

(***) *Moschokaryographia*, seu *Nucis Moschatæ descriptio*.
Francof. & Lips. 1704.

fla crassiuscula, constante e diploë cellulosa, fœcunda succo nigro, nucleo amygdalino.

PROPR. Succus diploës ater, oleosus, acer-rimus, atro colore inficiens. Si diutius servatæ fuerint nuces, hic succus siccatur in bitumen fragile, instar picis nitens, quod, ignis flammæ admotum, accenditur.

VIRTUS succi: caustica.

USUS: mechanicus.

OBS. 1. Succus diploës potissimum usurpatur ad linteas litterarum notis insignienda, quod nigrities ejus ita pertinaciter illis inhæret, ut deleri nequeat, etiam si salibus lixiviosis & sapone diligenter perlaventur. Et utut valde causticus est hic succus, linteas tamen non corrodit. Siccatus nullo menstruo, quantum mihi constat, solvitur, saltē neque in aqua, nec in spiritu vini, oleo expresso, vel spiritu vitrioli, neque vero decoctione protracta, emollitur. Decoctum ipsius testæ cum vitriolo martis nigrescit. Testa, ignis flammæ admota, accenditur, flagrat, flamma vivida, fumo odore olei expressi accensi; sub deflagratione funditur bitumen in cellulis igni proximis; cum id accenditur, ebullit sub deflagratione; ab igne remotum mox iterum indurescit.

OBS. 2. Statuunt quidam, nuces has ad Avicenniam tomentosam LINN. pertinere; sed cl. N. J. JACQUIN, qui Avicenniam in solo natali examinavit, claris verbis id negat. Quoniam itaque autoptæ potissimum fidendum arbitror, relinquitur mihi, ut nuces hasce obscuris etiamnum adnumerem.

G U M M A T A.

558 PERUIFERA. LINN. *Mat. med.* 514.

Terebinthus procera balsamifera rubra. BAR-
BER. *Æquin.* 108.*

Cabureiba. PIS. *Braſil.* 57.

Hoitziloxitl. HERNAND. *Mexic.* 51.

Pbarm. PERUVIANUM BALSAMUM.

Locus. Cayenna, Mexico, Brasilia; copioſe
ad Carthagena; JACQUIN.

FORMA. *Resina* liquida, lente fluida, obſcu-
re rubra, consistentia ſyrupi ſpiſli vel Terebin-
thinæ, in calore ignis fluidior, diaphana ſi vitro
illinita, alias opaca.

PROPR. *Odor* fragrans, exacte ſiliquæ Vanil-
læ; *sapor* balsamicus, pingviusculus, amaricans,
acriusculus, odori congruens. *Frigidum* balaſ-
ſum ab ignis flamma non ſuccenditur, ſed ca-
lefactum accenditur & flagrat, flamma vivida,
lutescente, fumante, fuliginosa. *Hoc balaſum*,
in aquam frigidam immiſſum, ſubito ſubſidit ad
fundum, & non ſolvitur, ſed cum aqua, etiam
fervida, conquaſſatum, odorem aquæ communi-
cat. Cum aqua deſtillatum, dat circiter $\frac{1}{6}$ *olei*
essentialis rubicundi, fragrantis, ſapore pungen-
te, in larga quantitate ſpiritus vini ſolubilis. Su-
per ignem evaporaſum, relinquit crassamentum
nigrum, iñſtar colophonii; ſed ſi ex arena deſtil-
letur, abſque additione aquæ, dat oleum flave-
ſcenti-rubrum, leviter empyreumaticum, natans,
Subsequente oleo crassiore, in aqua ſubſidente.
Cl. LEWIS ſtatuit, Balaſum Peruvianum in de-
ſtillatione etiam dare pauxillum florū ſalinorum,
pari modo ac Gummi Benzoe. Solvitur hoc
balaſum in ſpiritu vini rectificato. In oleo ex-
preſſo non ſolvitur, ſed decomponitur, ita ut
oleum ejus eſſentiale abſorbeatur ab oleo expre-
ſſo, quare ſpiffescit, tenax evadit, & vertitur in
faciem Resinæ Jalappæ nuper præparatae; ſicque
perdit pingvedinem ſuam, quo mediante flu-
dum

dum erat; & agitatione inter digitos, facile in pilulas efformari potest; sub digestione oleum expressum non tingit, sed odorem ei communicat. Neque magis solvitur in oleo stillatitio, verum tingit oleum colore dilute luteo; spissescit aliquantulum, in faciem duntaxat ungventi.

VIRTUS: vulneraria.

USUS. Vulnera, Ulcera.

OBS. Ex trunco arboris Peruiferæ inciso hoc balsamum stillat, adeo fragrans, ut e longinquo sentiatur.

559. RACKASIRA Balsamum. VAN DER BECK
Act. phys. med. A. N. C. vol. 1. app. p. 123,
VOGEL Mat. m. 307. RIGER *Introd. tom. 2.*
part. 1. p. 85.

FORMA & PROPR. *Balsamum* diaphanum, grave, rubro-brunneum, tenax, in fila ductile, odore balsamico; sapore balsamico, amaricante; dum gustatur, labia conglutinat.

VIRTUS: vulneraria.

USUS. Gonorrhœa.

560. AMMONIACUM. LINN. *Mat. m. 516.*

Pharm. AMMONIACUM Gummi.

Locus. Ægyptus.

FORMA. *Gummi-resina* solida, in frustis majoribus, lucidiuscula, molliuscula in calore & plastica, in frigore fragilis; viridescens, variegata: maculis s. glandulis inæqualibus, albidis, homogeneis, lævissimis, nitidiusculis.

PROPR. *Odor* fragrans, gravis, in Galbanum incidens; *sapor* amaricans, graviusculus, acriusculus, inhærens; *masticata* emollitur, dentibus subadhæret, præcipue glandulosa pars, alba evadit, solvitur: *saliva* lactescente. Digitis tractata iis adhæret. Ignis flammæ admota subito

accenditur, emollitur, subdestillat, fremit, diffusus in partibus particulis, flagrat: flamma vividissima, alba, fumante, parum fuliginosa, odore gravi. In vase ferreo super ignem funditur, ebullit, admota flamma subito accenditur, tumet, deflagrat, remanente carbone concavo, atro, lucido, sicco, vix inquinante. Trituratione solvitur in aqua pura, cerevisia, vino & aceto vini: solutione lactescēte. Solvitur digestione in spiritu vini rectificato, qua dimidiam partem: tinctura clara, filtrata limpidissima, debiliter odorata ex ammoniaco; quæ vero, aquæ instillata, subito lactescit, & exaltatur odor ammoniaci, quiete notabiliter se non præcipitat. G. Ammoniacum, cum aqua destillatum, aquam still. parum fragrantem dat, &, ut LEWIS observat, nihil olei essentialis. Si vero in aqua pura absque agitatione digeritur, cum aqua non miscetur, sed manet in fundo vasis, & albissimum fit, molle, instar caseosæ partis posseti. In oleo expresso digestum non solvitur, nec tingit oleum; neque magis cum oleo stillat. solvitur, sed emollitur, & tingit oleum colore saturate luteo.

VIRTUS: aperiens, expectorans, emmenagogue, subeccoprotica. *Externe* emolliens, resolvens.

USUS. Asthma, Hysteria, Tumores duriusculi.

OBS. 1. *Oleum* per descensum obscure rubrum, graveolens, sapore gravi, forti, empypreumaticum.

OBS. 2. G. Ammoniacum *amygdaloides* est glandulosa pars, a substantia viridescente scrupulosius segregata.

561. CARANNA. LINN. *Mat. m. 517.*

Tlahueliloca Quahvitl. HERNAND. *Mex. 56.*

Gomme Caranna. DES MARCH. *Voy. t. 3.*

p. 259.

Pharm. *CARANNÆ* Gummi.

Lo-

Locus. Mexico. Palmæ species.

FORMA. *Gummi-resina* solidæ, in frustis majoribus, grisea, lucidiuscula, facile fragilis: fracturis granulatis; friabilis: pulvere ferrugineo.

PROPR. *Odor* fragrans, resinosus, graviusculus, in Ammoniacum incidens; *sapor* debilis, resinosus; *masticata* inter dentes vaide friabilis, facilime comminuitur in pulverem arenulosum, non emollitur, nec ullo modo inter masticandum coit, verum miscetur cum saliva, ut pulvis duriusculus. *Ignis* flammæ admota accenditur, flagrat: *flamma* vividissima, fumante, fuliginosa, odore balsamico; emollitur, sed non destillat. In vase ferreo super ignem lente funditur, admota *flamma* accenditur & deflagrat, remanente carbone atro, lucido, vix fuliginoso. Solvitur in aqua secundum quartam partem; sed tres quaternæ partes in Spiritu vini sunt solubiles. Destillata cum aqua, oleum essentiale dat fragrans, ut observat GEOFFROY. Solvitur in oleo expresso qua partem: solutione rubescente, clara; in oleo still. pariter solvitur qua partem: solutione rubra.

VIRTUS: resolvens, roborans.

USUS: externus; Hysteria.

OBS. 1. *Gummi Carannæ* est succus gummoso-resinosus, qui ex trunko Palmæ cuiusdam sauciato stillat; DES MARCHAIS.

OBS. 2. In pharmacopoliis obvenit *Caranna nigra*, quæ est Resina atra, solidæ, in frustis majoribus, lœvis, lucidiuscula, instar piçis atræ coctæ, fragilis: fracturis planis, lœvibus, nitidiusculis; subfriabilis, odore fragrante, in Carannam vulgarem incidente, at fortiori; sapore præcedentis; masticatur ut præcedens, sed saliva fusca. Hæc resina, ignis flammæ admota, emollescit, accenditur, non destillat, flagrat; *flamma* pusilla,

la, vividissima, vix fumante, vix fuliginosa. In vase ferreo super ignem difficillime funditur, tenax fit, adglutinatur vasi, splendet, flagrat, odore gravi, acuto, remanente carbone atro, sicco, splendente.

562. MYRRHA. LINN. *Mat. m. 519.*

Pbarm. MYRRHÆ RUBRÆ Gummi.

Locus. Arabia felix, Abyssinia.

FORMA. Gummi-resina solida, in frustulis minoribus, rubicunda, subdiaphana, extus laeviuscula, vel verrucis elevatis scabrida, fragilis: fracturis subrugosis, lucidiusculis; subfriabilis.

PROPR. Odor fragrans, vix ingratus; sapor amarus, odori congruens; masticata primum inter dentes friabilis, dein dentibus adhaeret, solvitur: saliva lactescente, halituoris fragrante. Ignis flammæ admota, subito accenditur, emolititur parum, non destillat, flagrat candelæ instar: flamma vividissima, alta, fumante, fuliginosa, odore fragrante G. myrrhæ. In vase ferreo super ignem non funditur, verum solida & non demutata permanet, sudat paululum, tandem nigrescit, & in carbonem vertitur nigrum, absque flamma; sed si flamma, dum sudat, admoveatur, subito accenditur, deflagrat, remanente carbone nigricante, subsplendente, sicco, vix fuliginoso. Solvitur maximam partem sub digestione in aqua calida, sed refrigeratione sub sidunt partes resinosa; secundum partem solvitur in spiritu vini: tinctura rubicunda, amara, debiliter odorata; sed si aqua frigida affunditur, subito lactescit, & fragrantia Myrrhæ exaltatur. In oleo expresso non solvitur; tingitur oleum parum colore lutescente; cum oleo still, digestum insoluta manet, dura, & oleum tinctum

colore lutescenti - rubro. Cum aqua destillata, dat *aquam still.* fragrantem, & ut HOFFMANNUS docet, etiam *oleum still.* fragrans, ponderosum, subcidens; hujus olei drachm. 2 obtinentur e G. Myrrhæ unc. 16. Inter pulverandum irritat in naso.

VIRTUS: tonica, emmenagoga, antiputredinosa, vulneraria, anthelmintica.

USUS. Hysteria, Obstructio mensium, Ulcera, Gangraena.

OBS. 1. Pulchræ experimenta cum Myrrha instituit cl. ROBINSON (*).

OBS. 2. Arbor Myrrham proferens sponte provenit in orientali regione Arabiæ felicis, ut & in Abyssinia, in' regione illa, quam Græci Troglodytria appellant, prout docet cl. J. BRUCE (**). Atqui præstabilior Myrrha Abyssinica, quæ raro occurrit. Optima ea Myrrha, quæ ex incisuris profundis ramorum grandium extillat, & supra arborem brevi indurescit; & quidem singulis annis per ejusmodi vulnus semel infictum stillare Myrrha solet, tamen quæ primo anno colligitur, omnium præstantissima est; non item quæ posterioribus provenit, quippe quæ plerumque conspurcatur partim heterogeneis terrestribus eo delatis, partim ex putrescentia vulnerum arboris. Deterrima est, quæ prope radicem arboris, vel e truncis antiquis, destillat. Arbor, quæ Myrrham gerit, adhuc obscura est. Sed ex cortice foliisque, quæ in sacculis myrrha plenis, quos appor tarunt incolæ, reperit cl. BRUCE, quæque Acaciæ verræ simillima deprehendit, suspicandi caussam habuit, arborem ad Mimosæ genus pertinere. Quod si ita sit, ruit hypothesis illa nova, quod nimirum Myrrha officinalis non nisi ex meris insectis eorumque nidis constet,

(*) *Le Pharmacien moderne*, p. 47. seq.

(**) *Philos. transact.* vol. 65. p. 408. seq.

stet, pari modo atque Gummi Laccæ, quam quidem hypothesin sibi formavit ill. VON LINNÉ (*), ex occasione ejusdam speciminis Myrrhæ, plurimis pertusi poris transversalibus, infectis plenis, quod F. HASSELQUIST nostras in Ægypto adeptus fuerat.

563. BDELLIUM. LINN. *Mat. med.* 520.

Pharm. BDELLII Gummi.

Locus. Arabia, India.

FORMA. Gummi-resina in frustulis minoribus, magnitudine vix fructus Cerasi, angulatis, extus rugosis; obscure rubicunda, subdiaphana, fragilis: fracturis planis, homogeneis, laevibus, nitidiusculis.

PROPR. Odor gravis, debilior; sapor graviusculus, amaricans, in Terebinthinam venetam incidentis; masticata tardissime emollitur, dentibus adhæret. Ignis flammæ admota non funditur, nec emollitur, sed accenditur & flagrat: flamma vivida, vix fumante, nisi extincta, fuliginosa, persistente, odore balsamico; sed fumi odor fere farinæ tostæ est; sub deflagratione pars quædam resinosæ substantiæ liqueficit, repeilitur a flamma, illaque extincta non solidescit, verum tenax manet in frustulo, digitisque adglutinatur. In vase ferreo super ignem non funditur, sed sudat succum resinosum, tenacem, odoremque spargit balsamicum, subgratum, & admota flamma accenditur, deflagrat, remanente carbone atro, subsplendente, friabili, parum inquinante. In aqua frigida emollitur, & in calida sub digestione solvitur qua dimidiâ partem: solutione glauca s. opalescente; resinosa vero pars

(*) Vid. *Litteras ejus, insertas cl. S. BÆLTHERS Vårs Herres och Frälsares J. C. historia*, lib. 6. p. m. 633.

pars solvitur in spiritu vini: tinctura rubicunda, odore spiritus vini; quæ vero, in aquam frigidam instillata, subito lactescit, odore exaltato. Cum aqua destillata, odorem aquæ communicat. In oleo expresso digesta, non solvitur perfecte, verum emollitur, mollescit, & tingit oleum colore luteo. In oleo still. non solvitur perfecte, sed mollescit, & tingit oleum colore dilute luteo.

VIRTUS: maturans, emmenagoga, vulneraria.

USUS: Hysteria.

564. SAGAPENUM. LINN. *Mat. med.* 521.

Pharm. *SAGAPENI* Gummi.

Locus. Alexandria, Persia.

FORMA. Duplex in nostris officinis reperiatur Sagapenum. *Purius:* Gummi-resina solida, in frustulis minoribus, magnitudine circiter fructus Cerasi vel ultra, rubra, subdiaphana, homogena, læviuscula, facie cornea, lucidiuscula, consistentia ceræ, in moderato calore molliuscula, in frigore duriuscula, fragiliuscula; cultro secta resolvitur in scobem albidam, quasi ex cornu. *Vulgare* Sagapenum occurrit in frustis majoribus, magis opacum, rubicundum, non homogeneum, verum glandulis albidis impastatis, & ligni recrementis, aliisque heterogeneis sœpe onustum.

PROPR. *Odor* fortior, graveolens, fere G. ammoniaci; sed vulgare magis foetidum. *Sapor* gravis, inhærens, in Assam foetidam incidens. *Masticatum* Sagapenum dentibus subadglutinatur, mox album evadit, solvitur sensim: solutione lactescente. *Ignis* flammæ admotum accenditur, non

non destillat, flagrat quasi candela quædam: flamma copiosa, alta, fumante, fuliginosa, odorata. In vase ferreo supra ignem non liquefit; excalafactum spargit odorem Allii, deinde Assæ foetidæ æmulum, tandem igne validiori absque flamma nigrescit, & admota flamma acceditur, deflagrat, remanente carbone nigro, inquinante. Solvitur trituratione in aqua frigida: solutione sordide lutescente. Dimidia circiter pars solvitur in spiritu vini: tinctura rubicunda, odore debili Sagapeni, fere spiritus vini; sed si aquæ frigidæ instillatur, subito lactescit, exaltata fragrantia Sagapeni. Destillatione dat aquam still. fragrantem, & oleum still. parcum, fragrans.

VIRTUS: emmenagoga, resolvens, matutrans, subeccoprotica.

USUS. Hysteria, Obstructio mensium, Tumores duri.

565. COPALIFERA.

Copalli Quahuitl, copallifera prima, HERNAND. Mexic. 45.

Pharm. COPAL Gummi.

Locus. Mexico. Arbor.

FORMA. Resina solida, in frustulis majoribus, irregularibus, ab ovi columbini ad pugni magnitudinem, hyalina s. lutescens, splendens, pellucida instar vitri colorati, fragilis: fracturis planis s. convexiusculis, lucidis; subfriabilis: pulvere albido. Optima colore aqueo est, pellucida & vitrum referens subobscurum, purissima. Deterrima quæ opaca est & albescit. Sæpe sollet resina Anime pro vera resina Copal a mercatoribus vendi, ut observavit BARRERE.

PRO-

PROPR. *Odor balsamicus*, debilior, in balsamum Copaiæ incidens. *Sapor* vix ullus; *masticata* hæc resina inter dentes friabilis, arenacea sentitur, non solvitur, nec emollescit, neque coit, verum comminuitur. Hæc resina, fricata, electrica evadit, sicut plures aliæ resinae. *Ignis* Hammæ admota, emollitur, accenditur, vix subdestillat, flagrat: flamma vivida, fumante, fuliginea: fumo balsamico. In vase ferreo super ignem funditur, admota flamma accenditur, deflagrat, remanente carbone parco, splendente, nigro, parum inquinante. Si G. Copal per se destillatur, absque omni additione, in igne moderato, transcendit, ut docet cl. BLOCH (*), oleum tenuë, lutescens, in alchole vini solubile, una cum phlegmate lutescente, parca quantitate. Aucto igne, adscendit oleum spissum, magna quantitate, in alchole vini non solubile. Nihil salini observavit idem BLOCH. G. Copal non solvitur in aqua simpli- ci. Si in aqua coquitur, non emollitur, nec figuram perdit. In spiritu vini rectificatissimo, digestione calida & frequenti agitatione, si prius bene pulveratum fuerit, pars vertitur in massam albidiā, opacam, tenacem, in fila ductilem; alia autem pars in alchole supernatante penitus soluta deprehenditur: tinctura calida limpida, dilute flavescens; quæ refrigerata opalescit, & sponte præcipitat resinosum solutum. Spiritus vini tartarisatus agit in Copal, simili fere modo, ut alcohol vini. Spiritus vini camphoratus bonam illius partem solvit. Pulchrior & perfectior fit solutio, si camphora una cum Copal in alcohol vini immittatur. Ab oleis expres-

(*) *Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde*, vol. 2, p. 91. seq.

sis G. Copal, quamvis digestum, nihil mutatur, sed si prius in igne fusum fuerit, & oleum ejus stillatitium sic propulsum, perfecte solvitur in omnibus oleis expressis seu stillatitiis. Ab oleo still. Terebinthinæ digestione emollitur in faciem gummi Cerasorum recentis, tenax fit, oleum vero non tingit. Sed oleum Terebinthinæ vetustum & rancidum validius in G. Copal agit, quam recentius oleum. Si olei Terebinth. libr. 4 cum herb. Rosmarini libr. 6 destillantur, atque cum eadem quantitate herbae Rosmarini rursus de-stillantur, obtinetur menstruum potens ad G. Copal solvendum: solutione limpida. Adhuc perfectior fit solutio, si oleum ipsum still. Rosmarini sumitur; in hoc enim oleo frigide solvitur G. Copal, absque omni digestione: solutione limpidissima, si nimirum Copal selectissimum fuerit, alias lenem oportet adhibere digestionem. Idem etiam accedit ab aliis oleis stillatitiis essentialibus, ut Lavandulæ, Benzoës. Ex hoc principio solutionem G. Copal sublevat Camphora. Oleum stillatum ipsius G. Copal illud pariter solvit. Sed oleum Succini & Petroleum nihil agunt in Gummi Copal. In oleo still. Copavæ G. Copal digestum, insolutum permanet; verum supernans oleum tingitur colore luteo, & ipsum Copal in fundo vasis opacum manet, pelluciditate omni amissa. Sed cum ipso balsamo Copavæ, ignis ope, Copal conjunctionem init, miscetur: mixtura pellucida, tenaci, in alcohole vini solubili, mediante digestione: tinctura clara, bonam vernicem efformante. Idem accedit cum Terebinthina veneta, pariter ac cum Terebinthina cocta, uti docet BLOCH. In acidis non parili modo sese habet G. Copal. Ab acido salis, quantum-

tumvis fumante, prorsus nil demutatum permanet. In Spiritu nitti digestione non solvitur; sed si in hoc acido coquatur, solvitur: solutione limpida, dum calet, sed turbida, dum refrigeratur. At in Spiritu Nitri fumante frigide solvitur cum effervescentia. Ex aqua regia idem ferre accidit. In oleo vitrioli solvitur cum spumescientia. In aceto vini parum vel nihil solvitur, sed in succo Citri solvitur sub jugi agitatione. Si cum succo Citri congelato digeritur, solvitur, solutione fuscescente, quæ, in aquam immissa, non præcipitatur, sed commiscetur. Acida mineralia dulcificata, cum G. Copal fervide digesta, illud vertunt in massam albam, opacam, mollem, in oleis stillatitiis solubilem. In Naphtham vitrioli immissum G. Copal, solvitur, tinctura lutescente, sedimentum ad fundum vasis depонente gelatinosum, subdiaphanum; quæ tinctura, si in aquam frigidam guttatum mittitur, concrescit in pelliculam, aquæ supernatantem, vultella elevandam. Hæc tinctura præcipitatur ex affuso Spiritu vini, largiori dosi, sed si aë: i libero in calore æstivo exponitur, sponte siccatur & redintegratur G. Copal, salva pelluciditate; atque sic commoda esse potest ad res pretiosas crusta Copalina superinduendum, ut bene docuit cl. BLOCH. Pictorum arcanum est G. Copal solvere in liquore minerali. Si cum oleo vini digeritur G. Copal, pars insoluta in fundo jacet, alia pars in gelatinæ faciem mutatur, tinctura supernatante limpida instar aquæ, quæ, in aquam frigidam immissa, lactescit. Alcalina fixa & volatilia Copal non solvunt; sed alcalina caustica illud perfecte solvunt: tinctura ab acidis præcipitata. G. Copal, in liquore Terræ fol. tar-

tari digestum, non solvitur; sed si subtilissime pulveretur, & in mortario marmoreo calido diutius teratur cum duplo hujus liquoris, abit in mastam mollem, in aqua calida solubilem: solutione lactescente.

VIRTUS.

USUS: mechanicus.

OBS. 1. G. Copal in medicina non usurpatur; sed artifices inde parant vernicem præstantissimam.

OBS. 2. De hac resina egit cl. LEHMAN (*), sed longe perfectius cl. BLOCH (**), experimentis accuratisimis, quæ instituit, nixus.

566. CAOUTCHOUC. MACQU. *Memoir. de l'Acad. des scienc. Ann. 1768. p. 209.*

L'arbre Seringue. FRESNEAU *Memoir. de l'Acad. des scienc. Ann. 1751. p. 329. t. 20. f. 10.-14.*

Pharm. RESINA ELASTICA.

Locus. Cayenna. Arbor.

FORMA. Resina coriacea, facie Corii præparati, fusca, nitidiuscula, flexibilis, plicatilis, molliuscula, extensiva, elastica, in varia utensilia communiter efformata.

PROPR. Odor nullus; sapor debilis; mastigata inter dentes ut corium sentitur, & nullo modo solvitur; sed si diutius masticatur, saporem debilem aromaticum præbet. Resina hæc valde elastica est, & extensionem admittit summam, salva figura pristina, quam resumit, dum dimititur. Frigori vel siccitati protractæ exposita, minus plicatilis & extensiva est, & ruditer tractata subfragilis; si vero in aquam calidam immittitur, mox flexilis & valde extensiva evadit.

Sub

(*) *Memoires de l'Acad. d. Sc. de Berlin, Ann. 1758. p. 35. seq.*

(**) *L. cit.*

Sub digestione in aqua calida non solvitur, nec aquam imbibit, ad tactum tamen resinosa sentitur, & digitis adpressa leviter adhæret. Id etiam accidit, si aqua calida ejus superficie instillatur, & aliquantum ibi manet. Postquam semel in aqua calida emollita fuit, tardissime iterum rigescit, flexibilitatem servans per integrum septimanam vel ultra, pro temperie aëris. Flammæ ignis admota accenditur, flagrat: flamma vividissima, non fumante, nec fuliginea, odore non ingrato. Sub deflagratione liquefecit, defluit, & si flamma extinguitur, instar balsamiliquidi persistit, & amplius non solidescit. Deflagrat lente, adeo ut segmentum crassitie duorum pollicum & longitudine duorum pedum per integrum nycthemeron flagret. In vase ferreo super ignis flammarum collocata, diu nil demutata persistit, & fortè satis calorem patitur; sed si carbonibus candentibus imponitur, unde calor fortior, incipit pingue quoddam sudare, fuscescit, emollitur, & tandem subito funditur, oleum quoddam referens, penitusque liquida fit; sub qua facie persistit etiam ab igne remota, similis balsamo pingui, nec postea solidescit, quamvis in frigore collocetur; hinc ignis flamma validius in hanc resinam agit, quam ignis clausus; ex utroque tamen vinculum ejus penitus dissolvitur, ut in balsamum abeat, postea in resinam elasticam nunquam renascitura. Non solvitur in aqua, neque in spiritu vini; sed si balnei calore diutius digeritur in oleo expresso, ex. gr. ol. nucum jugland. f. lini, vel in oleo stillat., ex. gr. ol. Terebinthinæ, perfecte dissolvitur; si vero solutio inspissatur, mollis & viscosa permanet, & elasticitatem non recuperat. In Spiritu vini camphora-

to solvitur secundum partem. Ab alcalinis & acidis aut non solvitur, aut solummodo alteratur. In olla Papini digesta, sive cum aqua, sive cum spiritu vini rectificato, nullo modo solvitur, verum persistit, & quasi subcornea fit. Sed in æthere vitrioli, bene præparato, perfectissime solvitur: solutione limpida & pellucida; & vero, quod notabile est, regeneratur in integrum, salva omni proprietate, etiam elasticitate; sic si solutio hæc aquæ frigidæ instillatur, generatur pellicula elastica in superficie aquæ; & si supra corpus quoddam solidum mittitur, superinduitur id mox tegmine elastico, ut egregie docet cel. MACQUER.

VIRTUS.

USUS: mechanicus; instrumenta ad clysmata, injectiones.

OBS. Truncus arboris, per corticem usque ad lignum incilus, succum fundit lacteum, qui, recenter collectus, & formis ex terra argillacea illinitus, spissescit, dum fumo spisso ex vegetabilibus & igni moderato exponitur, unde concrescit in formam corii, & augetur crassitudo pro numero stratorum succi, quæ ex integro repetuntur, ut primum adsiccescere occipiunt priora strata. Hæc denique cuncta coalescunt in unum corpus, quod debitam consistentiam acquirit, dum postremo supra ignem paullo validiorem siccatur. Sub desiccatione varii characteres picturæque facile inscribi possunt. Corium, ex Resina elastica recenter paratum, lutescens est, sed ætate fuscescit, quod citius fit, si superficies cinere vel pulvere terræ adspergatur.

L I G N A.

567. AGALLOCHUM. LINN. *Mat. med.* 523.

RUMPH *Amb.* 2. *p.* 29. *

Sinkoo. KÆMPF. *Amæn.* 903. *

Kis-

Kissina. KÆMPF. *L. c. t. 902. f. 2.*

Agallochum s. lignum Aloës. DAL. *Pharmac.*

347.*

Du Bois d' Aquila ou d'Aloës. DE LA LOUBÈRE du Royaume de Siam, *t. 1. p. 36.**

Du Bois d'Aloës ou Agallochum. GEOFFR. *Mat. med. t. 2. p. 368.**

Pharm. ALOËS (Agallochi veri) Lignum.

Locus. Siam, Tonquin, Cochinchina.

FORMA. *Lignum* non durum, in frustulis vix spithamæis, utrinque planiusculis, obtusis, profunde sulcato-excavatis, saepe tenuiusculis, subponderosis, ex fusco & cinereo variegatis, nitidiusculis, secamentis fragilibus, resinosis.

PROPR. *Odor*, dum fricatur, gratus, debilior tamen; *sapor* gratus, balsamicus, leviter amaricans. *Masticatum* secamentum ligni inter dentes friabile, facile comminuitur, & ubi deglutitur, levis in fauibus remanet acrimonia, cum siccitatis sensatione. *Ignis* flammæ admotum subito accenditur, flagrat: flamma vivida, luminosa, fumante, fuliginea. Sub deflagratione liqueficit resina fusca, ebullit, consumitur, & spargit odorem gratum, balsamicum; remanente carbone atro, inquinante. *Lignum*, vitri pariетi affricatum, vestigia resinola relinquit.

VIRTUS:

USUS. Suffimenta.

OBS. I. *Lignum Aloës* nunquam occurrit in frustis integris trunci s. ramorum, uti alia ligna, sed semper in frustulis excisis & excavatis; etenim, prout recte observarunt Auctores, sunt tantummodo frustula resinosa, quæ e truncis arborum subemarcidis s. semimortuis exciduntur, sparsim reperiunda, neque id sine difficultate. Maximi aestimatur, etiam in ipso solo natali,

ubi in domibus opulentiorum & magnatum usurpatur, præcipue ad suffimenta. Sæpe etiam in medicina adhibetur. Statuunt, illud eximum esse excitans, atque insimul alvum laxam restringere. Ego equidem ad suspicandum ducor, lignum hoc minime esse venenatum. Certe RUMPHIUS negat, arborem, ex qua desumitur, lactescere, & probabile vix est, gentes, per longissimum temporis decursum, illud lignum ut suffimentum adhibuisse in ædibus propriis, in conviviis, in conventibus publicis, sicuti pro venenato habuisserent. Medici priſtini vim hujus ligni excitantem universi laudarunt; dubito tamen fuisse quemquam, qui plus ligno Aloës confisus sit, quam WEDELIUS (*), dum dixit. *Nullum lignum est sub Sole, quantum quidem hucusque noscere est datum, quod hoc asseguatur, nedum supereret, viribus confortativis, ut, si arbor vitæ quædam statuenda est superesse, bæc, si non vera & genuina, tamen succedanca ipsique quam proxima, omni merito suo dici debeat.*

OBS. 2. In nostris officinis Lignum Aloës rarius obvenit. Specimen, quod descripsi, a cel. EDV. SANDIFORT accepi, qui illud in Hollandia comparavit. Inter primarias notas, quibus Lignum Aloës verum dignoscitur, referendum puto, quod vitro affricatum vestigia resinosa post se relinquunt. Scilicet fortius fricandum, quoad frictio tarde procedat, ob vestigium sebum. Hoc vestigium non abluitur aqua, saliva, oleo expresso, vel lixivio alcalino forti, sed duntaxat cum spiritu vini. Cum alcali fixo rubescit.

OBS. 3. De hoc ligno egit J. E. REINBOTH (**), & quidem compilando.

568.

(*) Exercit. medico - philolog. decur. 8. p. 7.

(**) Dissert. de Agallocho, quæ recusa exstat in VALENTINI Hist. Simplic. p. 591.

568. ASPALATHUM. LINN. *Mat. m. 524. DAL.*

*Pharm. 347. **

De l'Aspalathe. GEOFFR. *Mat. m. t. 2. p. 378. **

Pharm. ASPALATHI Lignum.

Locus. India Orientalis.

FORMA. *Lignum* præcedenti simile, sed in frustis majoribus, dodratalibus, utrinque planis, utrinque profunde sulcato-excavatis, ponderosiss; obscure fuscum, subnebulosum, minus durum, venis sparsis, longitudinalibus, obscurioribus; secamentis nitidiusculis, subresinosis.

PROPR. *Odor* vix ullus, etiamsi fricetur; *sapor* debilis, subaromaticus. *Masticata* secamenta difficilius comminuuntur. *Ignis* flammæ admotum lignum accenditur, difficilius flagrat, a flamma remotum extinguitur, fumat, odore ligni semiputridi accensi. Sub deflagratione liquefcit resina fusca, sed in longe minore quantitate, quam in præcedente.

VIRTUS.

USUS.

OBS. Etiamsi hoc lignum in Europa non est officiale, tamen, quoniam nonnisi obscure adhuc cognitum est, & haberi vix potest genuinum, supervacaneum non duxi illud breviter describere, postquam mihi contigit specimen quoddam hujus ligni Aspalathi veri e Manilla nancisci, & quidem ope cl. C. H. WÄNMAN, qui illud a Pharmacopœo ejus loci acceperat. Tantam similitudinem habet cum ligno Aloës vero, ut facile seduceret, & probabile est, illud pari modo e truncis semiputridis excidi. Sed tamen ab eo differt odore non fragrante, fumo minime grato, & frustulis majoribus, in quibus occurrit; præterea magis ponderosum est, color ille obscure fuscus magis æqualis, & si vitri parieti fortiter affricatur, vestigia resinosa non relinquit.

Sic inter bina hæc ligna existans est discrepantia, & desideratur in ligno Aspalatho onine id quod nobile est in ligno Aloës.

569. SANTALUM rubrum. DAL. *Pharmac.* 345.*

RUMPH. *Amb.* 2. p. 47.* GEOFFR. *Mat.* m. t.
2. p. 417.*

Chum-maraum. BROWN. *Pbil. transact.* vol.
23. p. 1057.

Santalum rubrum quibusdam, arbor orientalis Ponnæ facie. PETIV. *Mus.* n. 679. p. 60.

Pbarm. *SANTALI RUBRI* Lignum.

Locus. Java, Coromandel, circa Paliacatto, Caliaturium, in montibus. *Arbor.*

FORMA. Lignum solidum, pulchre rubrum, in frustis majoribus, extus fuscis, ponderosum, subsonorum; longitudinaliter fissum: fissura undulata; post sectionem transversalem nitidiusculum, nebulosum, fasciis longitudinalibus.

PROPR. Odor debilis; sapor debilis, subadstringens; inter masticandum saliva rubra evadit.

VIRTUS: restringens.

USUS.

OBS. 1. *Infusum* aquosum pulchre rubrum; vitriolo martis obscurascit.

OBS. 2. Lignum Santalum rubrum est medullaris pars arboris, ut observat HERB. DE JAGER (*); qui insimul demonstrat, Lignum Caleaturicum nequicquam differre a Santalo rubro vero.

R A D I C E S.

570. CALUMBA. REDI *Experim. natur.* p. 142.

Pbarm. *CALUMBÆ* (*Columbæ*) Radix.

Lo-

(*) *Epist. ad RUMPHIUM*, in VALENTINI *Simplic.* p. 406.

Locus. Habitat in continente Asiae exadversus Ceylonam.

FORMA. sicc. *Radix* secta in taleolas, orbiculatas vel in medio fistulas, pollicares, tectas cortice perquam rugoso, crassiſculo, brunneo; parenchymate solidiusculo; post sectionem transversalem notato disco centrali ampio, subfuscescente, picto striis parallelis fuscis, & punctis luteis, recavis, subcontiguis, per series longitudinales & parallelas dispositis, in junioribus radicibus grandioribus, in adultis vero & magis compactis longe minoribus, parvis; annulo corticali pallido, sublutescente, æquali.

PROPR. *Odor* aromaticus, debilior, non ingratus; *sapor* amaricans, acrisculus; *masticata* radix emollitur, solvitur fere, saliva sublutescente, leniter mordet in lingua & faucibus, cum amaritie quadam subinhærente.

VIRTUS:

USUS:

OBS. 1. *Infusum aquosum rubro-lutescens*, odore debili, sapore amaro; ex addito vitriolo martis non fuscescit, rubescit tamen saturatius.

OBS. 2. Calumba inter recentiora numeranda est officinalia, quorum virtus & usus ulteriori experientia eruendi sunt. Cl. TH. PERCIVAL (*) experimenta instituit cum hac radice, ex quibus didicit, illam minus resistere putredini, quam Chinchinæ corticem, sed tamen bilis putridam corruptionem cito corrigere. Observavit etiam, pulsum non accelerari ab usu hujus radicis. Hinc bonam judicat in diarrhœa, dysenteria, cholera, & phthisi pulmonali, quod etiam expertus loquitur. Generatim laudat hanc radicem, ut egregium roborans, antisepticum, sedativum & antemeticum. In

cho-

(*) *Essays medical and experimental, &c. vol. 2. p. 3. seq.*

cholera utilissime illam a drachma ꝑ ad 2, omni trivel quadrihorio, exhibet, & de prægressio evacuante scrupulosus non est; sed in colica biliosa Ipecacuanham præmittit. In febribus biliosis, hujus radicis gr. 15, cum anatica portione Tartari vitriolati, omni trihorio dedit, unde putrida ventriculi saburra correcta fuit, & salutaris diarrhœa sœpe excitata.

571. CHYNLEN. EKEBERG in Litteris Mscr.

Pharm. CHYNLEN Radix.

Locus. China.

FORMA. sicc. *Radix* cylindrica, subtoruloso-flexuosa, crassitie culmi fecalini, sœpe pennæ anserinæ, in frustulis pollicaribus vel ultra, extus rugosa, subsquamata, luteo-rubra, sœpe setis subulatis frequentibus exasperata, fragilis; *paren-*
cymate colore aureo-luteo, post sectionem transversalem substellato.

PROPR. *Odor nullus; sapor amarissimus, in-*
hærens; masticata comminuitur, saliva luteo-
crocea.

VIRTUS: stomachica, subemetica.

USUS. Colica frigida.

OBS. 1. *Infusum aquosum luteum, amarissimum;*
cum vitriolo martis rubescit, alioqui non demutatur.

OBS. 2. E Cantona Chinæ hanc radicem adduxit cl.
CAR. GUST. EKEBERG, quod eam ibi vidisset magni esse,
tanquam eximum stomachicum, & quamplurimo ve-
nire. Chinenses infundere istam solent in vino, & coch-
learia pauca haurire in colica, indigestione & aliis ejus-
modi affectibus. Ego aliquoties infusum hoc adhibui,
& quidem cum emolumento, sed deprehendi, id non
nunquam emesin movere, subsequente tamen euphoria.

I N D E X I.

Generum.

Acanthus. pag. 550.
Acer. 827.
Achillea. 691, 693.
Aconitum. 481, 484.
Acorus. 273.
Aëtæa. 450.
Adianthum. 849, 850.
Æthusa. 197.
Agallochum. 902.
Agaricus. 864 - 867.
Agrimonia. 386.
Ajuga. 499.
Alcea. 587.
Alchemilla. 74.
Allium. 253 - 262.
Aloë. 271.
Althæa. 585.
Ammoniacum. 889.
Amomum. 1 - 4.
Amygdalus. 409, 413.
Amyris. 294, 296.
Anacardium. 347.
Anacardium. 886.
Anchusa. 79, 80.
Andropogon. 823, 824.
Anemone. 488 - 491.
Anethum. 224, 226.
Angelica. 204.
Anthemis. 694 - 697.
Antirrhinum. 545.
Apium. 233, 235.
Aquilegia. 484.
Arbutus. 362.
Arctium. 652,

Areca. 880.
Aristolochia. 715 - 719.
Arnica. 682.
Artemisia. 665 - 674.
Arum. 721.
Asarum. 380.
Asclepias. 172.
Aspalathum. 905.
Asparagus. 266.
Asperula. 61.
Asplenium. 842 - 844.
Astragalus. 620.
Athamantha. 196.
Atriplex. 825.
Atropa. 126, 127.
Avena. 58.
Bdellium. 894.
Bellis. 686.
Berberis. 276.
Beta. 178, 179.
Betonica. 524.
Betula. 728.
Bixa. 465.
Boletus. 860, 862.
Borago. 86.
Brassica. 566 - 579.
Bryonia. 785.
Bubon. 208, 209.
Buxus. 732.
Cæsalpinia. 343.
Calamus. 274.
Calendula. 704.

Cal-

Index I.

- | | |
|---|--|
| <i>Calla.</i> 724.
<i>Calumba.</i> 906.
<i>Cambogia.</i> 461.
<i>Camphorosma.</i> 74.
<i>Cannabis.</i> 797.
<i>Caoutchouc.</i> 900.
<i>Capparis.</i> 449.
<i>Capsicum.</i> 142.
<i>Caranna.</i> 890.
<i>Cardamine.</i> 560.
<i>Carduus.</i> 654.
<i>Carlina.</i> 659.
<i>Carthamus.</i> 660.
<i>Carum.</i> 228.
<i>Caryophyllus.</i> 472.
<i>Cassia.</i> 337, 339.
<i>Cassine.</i> 238.
<i>Centaurea,</i> 699, 701.
<i>Ceratonia.</i> 836.
<i>Chærophylum.</i> 219.
<i>Cheiranthus.</i> 564.
<i>Chelidonium.</i> 451.
<i>Chenopodium.</i> 174-177.
<i>Chrysanthemum.</i> 686.
<i>Chynlen.</i> 908.
<i>Cicer.</i> 614.
<i>Cichorium.</i> 649, 650.
<i>Cicuta.</i> 212.
<i>Cinchona.</i> 104.
<i>Cissampelos.</i> 813.
<i>Cistus.</i> 476.
<i>Citrus.</i> 630-636.
<i>Clavaria.</i> 868.
<i>Clematis.</i> 492.
<i>Cochlearia.</i> 556, 558. | <i>Coffea.</i> 111.
<i>Colchicum.</i> 289, 292.
<i>Conium.</i> 192.
<i>Convallaria.</i> 268, 270.
<i>Convolvulus.</i> 95-99.
<i>Copaifera.</i> 357.
<i>Copalifera.</i> 896.
<i>Cordia.</i> 148.
<i>Coriandrum.</i> 214.
<i>Coris.</i> 115.
<i>Corylus.</i> 747.
<i>Costus.</i> 7.
<i>Crocus.</i> 35.
<i>Croton.</i> 760-769.
<i>Cucumis.</i> 782, 784.
<i>Cucurbita.</i> 777-779.
<i>Cuminum.</i> 210.
<i>Cupressus.</i> 759.
<i>Curcuma.</i> 5.
<i>Cuscuta.</i> 76.
<i>Cyclamen.</i> 90.
<i>Cynara.</i> 655, 657.
<i>Cynoglossum.</i> 82.
<i>Cynomorium.</i> 726.
<i>Cyperus.</i> 42.
<i>Cytinus.</i> 720.

<i>Daphne.</i> 303, 306.
<i>Datura.</i> 120, 122.
<i>Daucus.</i> 190.
<i>Delphinium.</i> 479, 480.
<i>Dianthus.</i> 372.
<i>Dictamnus.</i> 348.
<i>Dolichos.</i> 605, 606.
<i>Doronicum.</i> 685. |
|---|--|

Dor-

Index I.

Dorstenia. 73.
Dracocephalum. 539.
Drosera. 251.

Epidendrum. 714.
Equisetum. 841.
Ervum. 613.
Eryngium. 188.
Erysimum. 561 - 564.
Euphorbia. 388, 390.
Euphrasia. 543.

Fagara. 71.
Fagus. 745, 746.
Ferula. 198.
Festuca. 47.
Ficus. 837.
Fragaria. 436.
Fraxinus. 831, 832.
Fumaria. 593.

Galium. 62.
Genista. 596, 598.
Gentiana. 185 - 187.
Geum. 445, 447.
Glecoma. 521.
Glycyrrhiza. 615.
Gnaphalium. 676.
Gossypium. 590.
Gratiola. 24.
Guajacum. 345.
Guilandina. 344.

Hæmatoxylon. 351.
Hedera. 159.
Helianthus. 698.

Helleborus. 496, 497.
Herniaria. 173.
Hibiscus. 591.
Hordeum. 55.
Humulus. 799.
Hymenæa. 342.
Hyoscyamus. 123.
Hypericum. 640.
Hyssopus. 509.

Jasminum. 10.
Jatrophæ. 774.
Ilex. 77.
Illicium. 487.
Imperatoria. 220.
Indigofera. 617.
Inula. 681.
Iris. 38 - 41.
Isatis. 583.
Juglans. 743.
Juniperus. 809 - 813.

Laetitia. 646.
Lamium. 523.
Lasperpitium. 201.
Lathyrus. 611.
Lavandula. 512.
Laurus. 314 - 327.
Ledum. 360.
Leontodon. 647.
Leonurus. 527.
Lepidium. 552.
Lichen. 855 - 859.
Ligusticum. 202.
Lilium. 263.
Linnæa. 548.

Li-

Index I.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Linum. 248, 249. | Origanum. 529 - 532. |
| Liquidambar. 749. | Oryza. 278. |
| Lonicera. 101, 104. | Oxalis. 376. |
| Lycoperdon. 871, 873. | Paeonia. 477. |
| Lycopodium. 851, 853. | Palma. 881. |
| Lysimachia. 92. | Papaver. 452, 460. |
| Lythrum. 384. | Parietaria. 824. |
| Malva. 588. | Paris. 311. |
| Maranta. 7. | Parnassia. 246. |
| Marrubium. 526. | Pastinaca. 222, 223. |
| Matricaria. 687, 689. | Penaea. 68. |
| Melaleuca. 639. | Peruifera. 887. |
| Melissa. 537. | Peucedanum. 197. |
| Menispermum. 807. | Peziza. 870. |
| Mentha. 513 - 520. | Phallus. 869, 870. |
| Menyanthes. 90. | Phaseolus. 601 - 604. |
| Mercurialis. 806. | Phellandrium. 211. |
| Melipilus. 417. | Philadelphus. 393. |
| Mimosa. 828, 831. | Phœnix. 877. |
| Mirabilis. 99. | Phytalis. 130. |
| Momordica. 775. | Pimpinella. 229, 231. |
| Morus. 734. | Pinus. 750 - 758. |
| Myrica. 790. | Piper. 26, 28. |
| Myristica. 882. | Pistacia. 791 - 793. |
| Myrrha. 892. | Pisum. 608. |
| Myrtus. 394 - 396. | Plantago. 69, 71. |
| Nepeta. 510. | Poinciana. 341. |
| Nicotiana. 117. | Polygala. 595. |
| Nigella. 486. | Polygonum. 307 - 311. |
| Nymphaea. 463. | Polyodium. 844, 845. |
| Ocymum. 540. | Polytrichum. 854. |
| Olea. 11. | Populus. 804. |
| Ononis. 598. | Portulaca. 382. |
| Orchis. 711, 713. | Potentilla. 440, 442. |

Po-

Index I.

- | | |
|---|---|
| <i>Poterium</i> , 736.
<i>Primula</i> , 88.
<i>Prunella</i> , 541.
<i>Prunus</i> , 399 - 407.
<i>Pulmonaria</i> , 83.
<i>Punica</i> , 397.
<i>Pyrola</i> , 363.
<i>Pyrus</i> , 417 - 421.
<i>Quassia</i> , 353 - 355.
<i>Quercus</i> , 738 - 741.
<i>Rackasira</i> , 839.
<i>Ranunculus</i> , 494.
<i>Raphanus</i> , 532.
<i>Reseda</i> , 387.
<i>Rhamnus</i> , 148 - 151.
<i>Rheum</i> , 328, 330.
<i>Rhodiola</i> , 805.
<i>Rhus</i> , 237.
<i>Ribes</i> , 152 - 157.
<i>Ricinus</i> , 771.
<i>Rosa</i> , 426 - 431.
<i>Rosmarinus</i> , 20.
<i>Rubia</i> , 64.
<i>Rubus</i> , 432 - 435.
<i>Rumex</i> , 280 - 288.
<i>Rulcus</i> , 816, 817.
<i>Ruta</i> , 349.
<i>Saccharum</i> , 43.
<i>Sagapenum</i> , 895.
<i>Salicornia</i> , 8.
<i>Salix</i> , 787.
<i>Salsola</i> , 181.
<i>Salvia</i> , 22, 24.
<i>Sambucus</i> , 240, 242. | <i>Sanicula</i> , 188.
<i>Santalum</i> , 298.
<i>Santalum</i> , 906.
<i>Santolina</i> , 661.
<i>Saponaria</i> , 369.
<i>Satureja</i> , 507, 508.
<i>Saxifraga</i> , 367.
<i>Seabiosa</i> , 59, 60.
<i>Scandix</i> , 215, 217.
<i>Scilla</i> , 264.
<i>Scorzonera</i> , 644.
<i>Serophularia</i> , 546.
<i>Secale</i> , 48.
<i>Sedum</i> , 373 - 375.
<i>Sego</i> , 875.
<i>Sempervivum</i> , 392.
<i>Sinapis</i> , 579.
<i>Sifon</i> , 208.
<i>Sisymbrium</i> , 561.
<i>Sium</i> , 206.
<i>Smilax</i> , 801 - 803.
<i>Solanum</i> , 130 - 140.
<i>Solidago</i> , 680.
<i>Sorbus</i> , 415, 416.
<i>Spigelia</i> , 93.
<i>Spinacia</i> , 795.
<i>Spiraea</i> , 422, 424.
<i>Statice</i> , 247.
<i>Strychnos</i> , 144 - 147.
<i>Styrax</i> , 364.
<i>Symphytum</i> , 84. |
| | <i>Tamarindus</i> , 34.
<i>Tamarix</i> , 245.
<i>Tanacetum</i> , 662, 664. |

M m m

Teu-

Index I.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Teucrium. 500-506. | Ulmus. 182, 184. |
| Thea. 469, 471. | Urtica. 733. |
| Theobroma. 626. | Vaccinium. 299-302. |
| Thlaspi. 554, 555. | Valeriana. 30-33. |
| Thymus. 534, 536. | Veratrum. 818-822. |
| Tilia. 467. | Verbascum. 115. |
| Toluifera. 350. | Veronica. 17-19. |
| Tordylium. 189. | Vicia. 611. |
| Torrentilla. 443. | Vinea. 170. |
| Tragopogon. 643. | Viola. 705-710. |
| Trapa. 72. | Viscum. 788. |
| Trifolium. 622, 623. | Vitex. 550. |
| Trigonella. 624. | Vitis. 160, 170. |
| Triticum. 49, 54. | Winterania. 381. |
| Tropaeolum. 293. | |
| Tussilago. 677, 679. | |

IN-

INDEX II.

Officinalium & Culinarium.

- | | |
|--|--|
| <p>Abelmoschus. 591.
 Abies. 758.
 Abrotanum. 665.
 <i>Absinthium ponticum</i>. 668.
 - - - <i>vulgare</i>. 669.
 <i>Acacia nostras</i>. 408.
 <i>Acer</i>. 827.
 <i>Acetosa</i>. 286.
 - - - <i>rotundifolia</i>. 288.
 <i>Acetosella</i>. 376.
 <i>Acetum</i>. 160.
 <i>Aconitum</i>. 481.
 <i>Acorus palustris</i>. 39.
 <i>Aëtæa</i>. 450.
 <i>Adianthum</i>. 850.
 - - - <i>aureum</i>. 854.
 <i>Agallochum verum</i>. 903.
 <i>Agaricus deliciosus</i>. 865.
 - - - <i>optimus</i>. 861.
 - - - <i>præparatus</i>. 862.
 <i>Agnus castus</i>. 550.
 <i>Agrimonia</i>. 386.
 <i>Alcanna</i>. 80.
 <i>Alchemilla</i>. 75.
 <i>Alkekengi</i>. 130.
 <i>Alliaria</i>. 564.
 <i>Allium</i>. 254.
 <i>Aloës lignum</i>. 903.
 - - - <i>succus</i>. 271.
 <i>Althæa</i>. 585.
 <i>Ammi verum</i>. 208.</p> | <p><i>Ammoniacum</i>. 889.
 <i>Amygdala dulcis</i>. 409.
 - - - <i>amara</i>. 410.
 <i>Amylum</i>. 49.
 <i>Anacampteros</i>. 374.
 <i>Anacardium occident</i>. 347.
 - - - <i>orientale</i>. 886.
 <i>Anethum</i>. 224.
 <i>Angelica sativa</i>. 204.
 - - - <i>sylvestris</i>. 206.
 <i>Anime</i>. 342.
 <i>Anisum</i>. 232.
 - - - <i>stellatum</i>. 487.
 <i>Anserina</i>. 440.
 <i>Anthophyllus</i>. 472.
 <i>Anthora</i>. 484.
 <i>Anthos</i>. 20.
 <i>Apium</i>. 235.
 <i>Aquilegia</i>. 485.
 <i>Arabicum gummi</i>. 828.
 <i>Aristolochia fabacea</i>. 593.
 - - - <i>longa</i>. 718.
 - - - <i>rotunda</i>. 718.
 - - - <i>trilobata</i>. 715.
 - - - <i>vulgaris</i>. 719.
 <i>Armeniaca</i>. 407.
 <i>Armoracia</i>. 558.
 <i>Arnica</i>. 682.
 <i>Artemisia rubra</i>. 671.
 <i>Arum</i>. 721.
 <i>Asarum</i>. 380.
 <i>Aspalathum</i>. 905.</p> |
|--|--|

M m m 2

Alpa-

Index II.

- | | |
|---|--|
| <i>Asparagus.</i> 266.
<i>Affa fetida.</i> 193.
<i>Atriplex sativa.</i> 825.
<i>- - - sylvestris.</i> 175.
<i>Avellana.</i> 748.
<i>Avena.</i> 58.
<i>Aurantium.</i> 636.
<i>Auricula Judæ.</i> 871.

<i>Balaustiorum flores.</i> 397.
<i>Balsamita.</i> 664.
<i>Barba hirci.</i> 643.
<i>- - - caprina.</i> 868.
<i>Barbarea.</i> 563.
<i>Bardana.</i> 652.
<i>Basilicum.</i> 540.
<i>Bdellium.</i> 894.
<i>Beccabunga.</i> 19.
<i>Bedeguar.</i> 429.
<i>Behen oleum.</i> 344.
<i>- - - rubrum.</i> 248.
<i>Belladonna.</i> 127.
<i>Bellis minor.</i> 686.
<i>- - - pratensis.</i> 687.
<i>Benzoë.</i> 760.
<i>Berberis.</i> 277.
<i>Bergamot.</i> 639.
<i>Beta alba.</i> 179.
<i>- - - rubra.</i> 178.
<i>Betonica.</i> 524.
<i>Betula.</i> 728.
<i>Bistorta.</i> 308.
<i>Bonus Henricus.</i> 174.
<i>Borago.</i> 86.
<i>Botrys.</i> 176. | <i>Bovista.</i> 873.
<i>Branca ursi.</i> 551.
<i>Brasilianum lignum.</i> 343.
<i>Brassica alba.</i> 568.
<i>- - - Botrytis.</i> 572.
<i>- - - Brocoli.</i> 574.
<i>- - - gongylodes.</i> 578.
<i>- - - rubra.</i> 571.
<i>- - - sabauda.</i> 570.
<i>- - - sabellica.</i> 575.
<i>- - - sefilis.</i> 576.

<i>Britannica radix.</i> 283.
<i>Bryonia.</i> 785.
<i>Buglossa.</i> 79.
<i>Burta pastoris.</i> 555.
<i>Buxus.</i> 732.

<i>Cacao.</i> 626.
<i>Caffé.</i> 111.
<i>Cajeput.</i> 639.
<i>Calamus vulgaris.</i> 274.
<i>Calendula.</i> 704.
<i>Calla palustris.</i> 724.
<i>Calumba.</i> 906.
<i>Cambogia.</i> 461.
<i>Campescanum lign.</i> 351.
<i>Camphora.</i> 318.
<i>Camphorata.</i> 74.
<i>Canadense balsam.</i> 750.
<i>Canella alba.</i> 381.
<i>Cannabis.</i> 797.
<i>Capillus veneris.</i> 850.
<i>Capparis.</i> 449.
<i>Caprifolium.</i> 104.
<i>Caranna.</i> 890.
<i>- - - nigra.</i> 891. |
|---|--|

Car.

Index II.

- | | |
|---|--|
| <i>Cardamomum minus.</i> 3.
<i>Cardiaca.</i> 528.
<i>Cardopatia.</i> 659.
<i>Cardunculus.</i> 657.
<i>Carduus benedictus.</i> 701.
- - - <i>Mariæ.</i> 654.
<i>Caricæ pingves.</i> 837.
<i>Carlina.</i> 659.
<i>Carthamus.</i> 660.
<i>Caryophyllata.</i> 445.
<i>Caryophyllus aromat.</i> 472.
<i>Carvi.</i> 228.
<i>Cascarilla.</i> 765.
<i>Cassia caryophyllata.</i> 395.
- - - <i>Fistula.</i> 339.
- - - <i>ligneæ.</i> 318.
<i>Castanea.</i> 745.
<i>Cataputia minor.</i> 390.
<i>Catechu.</i> 880.
<i>Centaurium minus.</i> 186.
<i>Centumnodia.</i> 310.
<i>Cepa.</i> 256.
- - - <i>ascalonica.</i> 258.
- - - <i>oleracea.</i> 259.
- - - <i>septilis.</i> 262.
<i>Cerasus autumnalis.</i> 403.
- - - <i>nigra.</i> 402.
- - - <i>rubra.</i> 402.
<i>Cerefolium.</i> 217.
- - - <i>hispanicum.</i> 215.
<i>Ceterach.</i> 842.
<i>Chamædrys.</i> 506.
<i>Chamæmorus.</i> 435.
<i>Chamæpitys.</i> 500.
<i>Chamomilla noſtras.</i> 689. | - - - <i>romana.</i> 694.
<i>Champignon.</i> 864.
<i>Chanterelle.</i> 866.
<i>Cheiri.</i> 565.
<i>Chelidonium majus.</i> 451.
- - - <i>minus.</i> 494.
<i>Chenopodium anthelminthicum.</i> 177.
<i>China.</i> 803.
<i>Chinchina.</i> 105.
<i>Chynlen.</i> 908.
<i>Cicer.</i> 614.
<i>Cichorium.</i> 650.
<i>Cicuta aquatica.</i> 212.
<i>Cicutaria.</i> 219.
<i>Cina.</i> 666.
<i>Cinnamomum indic.</i> 316.
- - - <i>verum.</i> 314.
<i>Citrullus.</i> 779.
<i>Citrus.</i> 630.
<i>Cocculi indici.</i> 808.
<i>Coccumgnidium.</i> 306.
<i>Cochlearia.</i> 556.
<i>Colchicum.</i> 289.
<i>Colocynthis.</i> 780.
<i>Colubrinum lignum.</i> 147.
<i>Columbo.</i> 906.
<i>Conium.</i> 193.
<i>Consolida major.</i> 85.
- - - <i>media.</i> 499.
- - - <i>regalis.</i> 479.
<i>Contrajerva.</i> 73.
<i>Copaiva.</i> 357.
<i>Copal.</i> 896.
<i>Coriandrum.</i> 214. |
|---|--|

Index II.

- | | |
|---|--|
| <p>Coris. 115.
 Corylus. 748.
 Costus arabicus. 8.
 Cotula fœtida. 696.
 Crepitus lupi. 873.
 Crocus. 36.
 Cubeba. 28.
 Cucumis. 784.
 Cucurbita. 778.
 Culilavan. 326.
 Cupressus. 760.
 Curcumæ. 6.
 Cuscuta. 76.
 Cyanus. 700.
 Cyclamen. 90.
 Cydonia. 421.
 Cymimum. 211.
 Cynara. 656.
 Cynoglossum. 82.
 Cynosbatus. 429.
 Cyperus longus. 42.
 - - - rotundus. 43.

 Dactylus. 877.
 Datura. 123.
 Daucus creticus. 196.
 - - - sativus. 190.
 Dictamnus albus. 348.
 - - - creticus. 529.
 Dolichos urens. 605.
 Doronicum. 685.
 Draconis sangvis. 274.
 Dracunculus. 674.
 Dulcamara. 130.</p> | <p>Ebulus. 240.
 Elaterium. 775.
 Elemi. 294.
 Endivia. 651.
 Enula. 681.
 Epithymum. 77.
 Equisetum. 841.
 Eruca. 579.
 Eryngium. 188.
 Erysimum. 562.
 Esula. 390.
 Euphorbii gummi. 388.
 Euphrasia. 543.
 Faba. 611.
 - - - S. Ignatii. 146.
 Fagopyrum. 311.
 Fagus. 746.
 Farfara. 677.
 Filipendula. 422.
 Filix. 845.
 Flammula Jovis. 492.
 Fœniculum. 226.
 Fœnum græcum. 624.
 Fragaria. 437.
 Frangula. 150.
 Fraxinus. 831.
 Fumaria. 594.
 Fungus melitensis. 726.

 Galanga. 7.
 Galbanum. 209.
 Galla turcica. 739.
 Gallium. 62.
 Genista. 598.</p> |
|---|--|

Gen-

Index II.

- | | |
|--|--|
| <p><i>Gentiana alba.</i> 201.
 <i>-- - rubra.</i> 185.
 <i>Gentianella.</i> 187.
 <i>Geum rivale.</i> 447.
 <i>Glans terræ.</i> 611.
 <i>Gnaphalium.</i> 676.
 <i>Gossypium.</i> 590.
 <i>Gramen.</i> 54.
 <i>Grana avenionensis.</i> 151.
 <i>Granatus.</i> 397.
 <i>Gratiola.</i> 24.
 <i>Grossularia.</i> 157.
 <i>Gvajacum.</i> 345.
 <i>Gutta gummi.</i> 461.

 <i>Hedera arborea.</i> 159.
 <i>-- - - terrestris.</i> 521.
 <i>Helianthus tuberosus.</i> 699.
 <i>Helleborus albus.</i> 818.
 <i>-- - - fætidus.</i> 497.
 <i>-- - - niger.</i> 496.
 <i>Hepatica alba.</i> 246.
 <i>-- - - nobilis.</i> 488.
 <i>Herba britannica.</i> 283.
 <i>Hermodactylus.</i> 292.
 <i>Herniaria.</i> 174.
 <i>Hirundinaria.</i> 172.
 <i>Hordeum.</i> 55.
 <i>Horminum.</i> 24.
 <i>Hyoscyamus.</i> 123.
 <i>Hypericum.</i> 640.
 <i>Hypocistis.</i> 720.
 <i>Hyssopus.</i> 509.

 <i>Jalapa.</i> 100.
 <i>Japonica terra.</i> 880.</p> | <p><i>Jasminum.</i> 10.
 <i>Ignatii faba.</i> 146.
 <i>Imperatoria.</i> 220.
 <i>Indigo.</i> 617.
 <i>Ipecacuanha.</i> 102.
 <i>-- - - alba.</i> 710.
 <i>Iris florentina.</i> 39.
 <i>-- - - nostras.</i> 38.
 <i>-- - - violacea.</i> 41.
 <i>Isatis.</i> 583.
 <i>Juglans.</i> 743.
 <i>Jujuba.</i> 151.
 <i>Juniperus.</i> 809.

 <i>Lacca.</i> 769.
 <i>Lacmus.</i> 767.
 <i>Laetula.</i> 646.
 <i>Ladanum.</i> 476.
 <i>Lamium album.</i> 523.
 <i>Lapathum acutum.</i> 285.
 <i>Lavandula.</i> 512.
 <i>Laurocerasus.</i> 399.
 <i>Laurus.</i> 323.
 <i>Lens.</i> 613.
 <i>Lenticus.</i> 794.
 <i>Levisticum.</i> 202.
 <i>Libidibi.</i> 341.
 <i>Lilium album.</i> 263.
 <i>-- - - convallium.</i> 269.
 <i>Limonium.</i> 635.
 <i>Linaria.</i> 545.
 <i>Linnæa.</i> 548.
 <i>Linum catharticum.</i> 249.
 <i>-- - - sativum.</i> 248.
 <i>Liquiritia.</i> 615.</p> |
|--|--|

Index H.

- | | |
|---|---|
| <i>Locusta.</i> 33.
<i>Lupulus.</i> 800.
<i>Luteola.</i> 388.
<i>Macis.</i> 882.
Majorana. 532.
<i>Malabathrum.</i> 316.
<i>Malicorium.</i> 397.
<i>Malva arborea.</i> 587.
- - - <i>vulgaris.</i> 588.
<i>Malta.</i> 55, 56.
<i>Mandragora.</i> 126.
<i>Mangold.</i> 179.
<i>Manna.</i> 833.
<i>Mannoë grana.</i> 47.
<i>Marrubium album.</i> 526.
<i>Marum verum.</i> 502.
<i>Mastix.</i> 794.
<i>Matricaria.</i> 688.
<i>Matrisylva.</i> 61.
<i>Mecca balsamum.</i> 296.
<i>Mechoacanna.</i> 99.
<i>Melilotus.</i> 622.
<i>Melissa citrina.</i> 537.
- - - <i>turcica.</i> 539.
<i>Melitensis fungus.</i> 726.
<i>Melo.</i> 783.
<i>Melongena.</i> 138.
<i>Mentha balsamina.</i> 520.
- - - <i>crispa.</i> 513.
- - - <i>longifolia.</i> 515.
- - - <i>piperitis.</i> 516.
<i>Mercurialis.</i> 806.
<i>Mespilus.</i> 417.
<i>Meum.</i> 197.
<i>Mezereum.</i> 303. | <i>Millefolium.</i> 693.
<i>Morus diaboli.</i> 59.
<i>Morus.</i> 735.
<i>Moschata nux.</i> 882.
<i>Moscovitic.</i> oleum. 731.
<i>Mouceron.</i> 867.
<i>Moxa.</i> 672.
<i>Muscus clavatus.</i> 851.
- - - <i>erectus.</i> 854.
- - - <i>islandicus.</i> 855.
<i>Myristica.</i> 882.
<i>Myrrha rubra.</i> 892.
<i>Myrtillus.</i> 299.
<i>Myrtus.</i> 394.
- - - <i>brabantica.</i> 790.
<i>Napha.</i> 636.
<i>Napobrassica.</i> 577.
<i>Napus.</i> 566.
<i>Nardi spica.</i> 824.
<i>Nasturtium aquaticum.</i> 560.
- - - <i>crispum.</i> 553.
- - - <i>hortense.</i> 452.
- - - <i>indicum.</i> 293.
<i>Nepeta.</i> 510.
<i>Nephriticum lignum.</i> 344.
<i>Nicotiana.</i> 117.
<i>Nigella.</i> 486.
<i>Nummularia.</i> 92.
<i>Nux aquatica.</i> 72.
- - - <i>moschata.</i> 882.
- - - <i>vomica.</i> 144.
<i>Nymphaea.</i> 463.
<i>Olibanum.</i> 812.
<i>Oliva.</i> 11.
<i>Ononis.</i> 599. |
|---|---|

Op.

Index II.

- | | |
|---|--|
| Opium. 453.
Opopanax. 223.
Origanum creticum. 530.
- - - vulgare. 531.
Orleana. 466.
Oryza. 279.
Oxycoccus. 302.
Padus. 401.
Paeonia. 477.
Palmæ oleum liquidum. 771.
- - - sebaceum. 881.
Panis. 48, 49.
Papaver. 453.
- - - Rhœas. 460.
Paradisi grana. 4.
Pareira brava. 815.
Parietaria. 824.
Paris. 311.
Passulæ corinthiacæ. 170.
- - - majores. 160.
Pastinaca. 222.
Patientia. 280.
Pavanæ lignum. 769.
Pentaphyllum. 442.
Pepo. 777.
Peragua. 238.
Persica. 413.
Persicaria. 308.
Peruvianum balsam. 888.
Peruvianus cortex. 105.
Petasites. 679.
Petroselinum. 233.
- - - macedonicum. 209.
Peucedanum. 198.
Phallus cibulentus. 869. | - - - Mitra. 870.
Phaseolus. 601.
- - - floralis. 602.
- - - nanus. 604.
- - - saccharatus. 603.
Phellandrium. 211.
Philadelphus. 393.
Phu. 31.
Pichurim. 327.
Pimpinella alba. 229.
- - - italicica. 737.
- - - nigra. 231.
Pinus. 753.
Piper album, nigrum. 27.
- - - jamaicense. 396.
- - - indicum. 142.
- - - longum. 28.
Pisum. 608.
Pistacia. 791.
Plantago. 69.
Polium creticum. 502.
Polypodium. 844.
Pomum borsdorffian. 418.
- - - renetum. 418.
Populus. 804.
Porrum. 253.
Portulaca. 382.
Potatoë. 132.
Primula veris. 88.
Pruna brignolensis. 405.
- - - Catharinæ. 405.
- - - damascena. 405.
- - - gallica. 405.
Prunella. 541.
Pruneola. 405. |
|---|--|

Index II.

- | | |
|---|--|
| <i>Psyllium.</i> 71.
<i>Ptarmica.</i> 691.
<i>Pulegium.</i> 518.
<i>Pulmonaria.</i> 83.
- - - <i>arborea.</i> 859.
<i>Pulsatilla nigricans.</i> 489.
<i>Pyrethrum verum.</i> 697.
<i>Pyrola.</i> 364.
<i>Pyrus.</i> 419.

<i>Quassia.</i> 353.
<i>Quercus.</i> 741.

<i>Rackafira balsamifera.</i> 889.
<i>Radix omnia sanans.</i> 808.
<i>Ranunculus albus.</i> 491.
<i>Rapa.</i> 567.
<i>Raphanus.</i> 582.
- - - <i>niger.</i> 582.
- - - <i>rusticanus.</i> 558.
<i>Resina elastica.</i> 900.
<i>Rhabarbarum verum.</i> 330.
- - - <i>monachorum.</i> 282.
<i>Rhaponticum.</i> 328.
<i>Rheum.</i> 330.
<i>Rhodia.</i> 805.
<i>Rhodium.</i> 597.
<i>Rhoeas.</i> 460.
<i>Ribes nigrum.</i> 154.
- - - <i>rubrum.</i> 152.
<i>Ricinus vulgaris.</i> 771.
- - - <i>major.</i> 774.
<i>Roccella.</i> 860.
<i>Rosa alba.</i> 431.
- - - <i>damascena.</i> 426.
- - - <i>rubra.</i> 428.
- - - <i>sylvestris.</i> 429. | <i>Rosmarinus.</i> 20.
- - - <i>sylvestris.</i> 360.
<i>Ros solis.</i> 251.
<i>Rubia tinctorum.</i> 64.
<i>Rubus arcticus.</i> 434.
- - - <i>idaeus.</i> 432.
<i>Ruscus.</i> 817.
<i>Ruta hortensis.</i> 349.
- - - <i>muraria.</i> 844.

<i>Sabadilla.</i> 822.
<i>Sabina.</i> 814.
<i>Saccharum.</i> 43.
<i>Sagapenum.</i> 895.
<i>Sagu.</i> 875.
<i>Salep.</i> 711.
<i>Salicaria.</i> 384.
<i>Salicornia.</i> 8.
<i>Salix.</i> 787.
<i>Salvia.</i> 22.
<i>Sambucus.</i> 242.
<i>Sancti Ignatii faba.</i> 146.
<i>Sanctum lignum.</i> 299.
<i>Sandaraca.</i> 811.
<i>Sangvis draconis.</i> 274.
<i>Sanicula.</i> 189.
<i>Santalum.</i> 299.
- - - <i>rubrum.</i> 906.
<i>Santolina.</i> 661.
<i>Santonicum.</i> 666.
<i>Sapo.</i> 11.
<i>Saponaria.</i> 369.
<i>Sarcocolla.</i> 68.
<i>Sarsaparilla.</i> 801.
<i>Sassafras.</i> 325. |
|---|--|

Index II.

- Satureja. 507.
Satyrium. 713.
Saxifraga alba. 367.
- - - rubra. 422.
Scabiosa. 60.
Scammonium. 96.
Scilla. 265.
Schœnanthus. 823.
Schœnoprasum. 261.
Scolopendrium. 842.
Scordium. 504.
Scorodoprasum. 257.
Scorzonera. 644.
Scrophularia foetida. 547.
Sebesten. 148.
Secale. 48.
Sedum minus. 375.
Sempervivum. 392.
Senega. 595.
Senegal gummi. 831.
Senna. 337.
Serpentaria virginiana. 716.
Serpulum. 534.
Seseli creticum. 189.
Sigillum Salomonis. 270.
Siler montanum. 202.
Siliqua dulcis. 836.
Simarouba. 355.
Sinapi. 579.
Sisarum. 206.
Soja. 606.
Solanum. 140.
- - - tuberosum. 132.
Soldanella. 98.
Sophia. 561.
- Sorbus aucuparia. 415.
- - - domestica. 416.
Souda. 181.
Spica celtica. 32.
- - - nardi. 824.
Spigelia. 94.
Spina cervina. 148.
Spinacia. 796.
Spiritus vini. 160.
Staphisagria. 480.
Stœchas citrina. 676.
Storax vulgaris. 365.
- - - liquida. 750.
Stramonium. 120.
Suber. 738.
Sumach. 237.
- Tabacum. 117.
Tacamahacæ gummi. 71.
- - - in testa. 72.
Tamarindus. 34.
Tamariscus. 245.
Tanacetum. 662.
Taraxacum. 647.
Tartarus. 160.
Telephium. 373.
Terebinthina argentoratensis. 752.
- - - communis. 754.
- - - cypria. 792.
- - - veneta. 752.
Terra Catechu. 880.
- - - japonica. 880.
Thea bohea. 469.
- - - viridis. 471.

Thlaspi.

Index II.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Thlaspi</i> . 554. | <i>Victorialis</i> . 254. |
| <i>Thymus creticus</i> . 508. | <i>Vinca pervinea</i> . 170. |
| - - - <i>vulgaris</i> . 536. | <i>Vinum</i> . 160. |
| <i>Tilia</i> . 467. | <i>Viola</i> . 705. |
| <i>Tilli grana</i> . 768. | - - - <i>tricolor</i> . 708. |
| <i>Tolu</i> . 350. | <i>Virga aurea</i> . 680. |
| <i>Tomentilla</i> . 444. | <i>Viscum</i> . 788. |
| <i>Tragacantha</i> . 620. | - - - <i>aucuparium</i> . 77. |
| <i>Trichomanes</i> . 843. | <i>Vitis</i> . 160. |
| <i>Trifolium album</i> . 623. | - - - <i>idaea</i> . 301. |
| - - - <i>aquaticum</i> . 90. | <i>Ulmaria</i> . 424. |
| - - - <i>fibrinum</i> . 90. | <i>Ulmus</i> . 184. |
| <i>Triticum</i> . 49. | <i>Unguentarius cortex</i> . 183. |
| <i>Tuber</i> . 871. | <i>Vomica nux</i> . 144. |
| <i>Tunica</i> . 372. | <i>Urtica major</i> . 733. |
| <i>Turpethum</i> . 97. | <i>Uva ursi</i> . 362. |
| <i>Tussilago</i> . 677. | <i>Uvularia</i> . 816. |
| <i>Valeriana major</i> . 31. | <i>Winteranus cortex</i> . 381. |
| - - - <i>sylvestris</i> . 30. | <i>Zedoaria</i> . 4. |
| <i>Vanilla</i> . 714. | <i>Zingiber</i> . 1. |
| <i>Verbascum</i> . 116. | |
| <i>Veronica</i> . 17. | |
-

ADDENDA & EMENDANDA.

Pag. 5. post lin. 9. adde: *VIRTUS*: calefaciens, stomachica.

p. 55. lin. 8. mellago lege melligo.

p. 74. post lin. 23. adde: *USUS*.

p. 102. l. 21. post uteri, adde: Tussis convulsiva.

p. 103. l. 6. deleatur ita.

p. 128. l. 23. Lombergen leg. Lambergæ.

p. 148. l. 1. seq. deleatur *Cordia Sebestena* cum synonymis,
et reponatur:

91. *CORDIA Myxa*. LINN. *Sp. pl.* 273. *Mat. m.*

171. *HASSELQU. It. palest.* 458. *

Sebestena domestica l. *Myxa*. *COMMEL. Hort.*

Amst. l. p. 139. t. 72.

Pharm. SEBESTEN Fruſtus.

Locus. *Barbaria*, *Ægyptus*.

ibid. l. 22. leg. *OBS.* 1.

ibid. post l. 24. adde: OBS. 2. Visis speciminibus arboris,
quæ fructum Sebesten gerit, ad Tripolim Barbariæ a cl.

G. ROTHMAN lectis, non amplius dubito, quod *Cordiam*
Myxam L. ponere oporteat loco *Cordiæ Sebestenæ*. De-
scriptio cl. HASSELQUIST *Cordiam Myxam* respicit.

p. 153. l. 12. leg. rubicundæ, spissæ.

ibid. l. 27. leg. melliginem.

p. 166. l. 24. calcareum leg. tartareum.

p. 177. l. 15. post consimiles adde: *Semina fragrantia*.

ibid. l. 17. fragrantia leg. anthelininthica.

p. 192. l. 14. leg. operatum est.

p. 401. l. 1. dulcium leg. amararum.

p. 564. post lin. 6. adde: *Pharm. ALLIARIÆ Herba*.

p. 573. l. 26. Botryits leg. Botrytis.

p. 624. l. 20. leg. melligenus.

p. 797. post lin. 33. adde: *Pharm. CANNABIS* Se-
mina.

p. 815. l. 29. Nmeo leg. Nemo.

p. 857. l. 15. duabus frumenti tonnis leg. dimidiæ frumen-
ti tonnæ.

